

广西壮族自治区南宁市
中草药展览交易会资料选编

广西壮族自治区医药公司
南宁市医药公司
南宁市南湖公园

一九七五年二月

在毛泽东思想的光辉照耀下，全国各族人民团结一致，奋发图强，建设社会主义，发展生产，取得了举世瞩目的成就。

当前园林工作的前一段时期小结

“批林批孔运动”在全国范围内广泛地开展起来，“抓大放小，抓苗头，抓普遍”的方针，正在逐步地落实。

当前“风清气正，飞雪迎春到”。在毛泽东思想的阳光雨露哺育下，春满大地，百花盛开，中草药鲜花烂漫，分外娇娆。在毛主席的教导下，园林工作正在蓬勃地发展起来。

正当全国各族人民沿着毛主席的无产阶级革命路线胜利跨入一九七五年，热烈欢呼四届人大胜利召开的时候，各条战线在批林批孔运动的推动下，掀起了“抓革命，促生产”的新高潮。广西壮族自治区医药公司、南宁市医药公司、南宁市南湖公园联合举办《中草药展览交易会》，体现了园林建设和商业工作为无产阶级政治服务，为毛主席的革命外交路线服务，为社会主义建设服务和为劳动人民生活服务的方针。

通过展览，便于医疗卫生部门更好地推广使用中草药防治疾病，增进人民健康，巩固合作医疗制度，巩固和发展卫生革命的伟大成果；同时便于医药工业部门筛选提炼和改革剂型，组织生产，提高疗效；有利于科研单位发现新苗头，创造祖国新医药学，独立于世界医药之林。通过展览，必然推动农村进一步发展中草药生产，逐步将疗效好的野生中草药进行人工培植，扩大中草药资源。在工农业带动下，商业部门进一步加强中草药产、供、销工作，现场开展购销业务，并为外贸出口提供货源；使园林工作和社会主义生产建设紧密结合。总之，这个展览象一条纽带一样，把医疗卫

生部门、医药工业部门、科研单位、农副业的中草药生产、商业部门和园林部门等各方面工作联系起来，加快社会主义建设的步伐。

展览会在春节期间展出，便于广大工农兵群众假日参观，欢度佳节，同时使大家借此增进使用中草药防病治病常识，这对于进一步落实毛主席关于“备战、备荒、为人民”的伟大方针以及做好群防群治工作都有深邃意义。欢迎革命群众对展览会提供样品资料和提出改进意见，共同为挖掘祖国医药遗产，创造中国统一的新医学新药学而奋斗，从而做到“抓革命，促生产，促工作，促战备”并举，鼓足干劲，力争上游，多快好省地建设社会主义，并为世界无产阶级的革命事业和人类的进步事业作出应有的贡献！”

（注：此段文字系对原稿中有关“备战、备荒、为人民”的部分进行修改，将“群防群治”改为“群防群治工作”，将“并举”改为“并举，鼓足干劲，力争上游，多快好省地建设社会主义”，将“为世界无产阶级的革命事业和人类的进步事业作出应有的贡献”改为“并为世界无产阶级的革命事业和人类的进步事业作出应有的贡献”。）

目前我国中草药资源利用情况十分复杂，譬如大青叶除全草供作蔬菜外，尚有以下用途：1.作为农药，防治蚜虫、潜叶蛾、跳甲、飞虱、红蜘蛛等害虫；2.作为兽药，防治各种寄生虫病；3.作为饲料，防治牲畜各种疾病；4.作为食品，如中草药茶、蜜饯、果脯、糕点等；5.作为药品，治疗各种疾病；6.作为化妆品，如中草药香料、香精、香油等；7.作为染料，如中草药染料、染色剂等；8.作为工业原料，如中草药纤维、栲胶、栲胶蛋白、栲胶蛋白酶、栲胶蛋白酶抑制剂、栲胶蛋白酶抑制剂抑制剂等；9.作为建筑材料，如中草药灰浆、中草药砖瓦等；10.作为装饰材料，如中草药漆、中草药油墨等；11.作为工艺品，如中草药雕刻、中草药绘画等。

目 录

一、 品种介绍	(1)
1. 空心苋 (防治乙脑、流行性出血 热)	(1)
2. 抗痨新药——葎草	(3)
3. 菖草 (治疗多种炎症)	(5)
4. 治疗类风湿有苗头的六方藤	(8)
5. 对叶草 (民间治肝炎的有效良药)	(9)
6. 值得发掘的新药——战骨	(11)
7. 治慢性肾炎效验的荷莲豆	(12)
8. 猪肚果治疗支气管哮喘	(12)
9. 桃金娘根 (治疗无黄胆肝炎、中心 性视网膜炎)	(13)
10. 清热利水良药——露兜簕	(14)
11. 蝉翼藤叶 (治黄胆型肝炎新剂)	(14)
12. 罂粟败酱 (治疗多种妇科炎症)	(15)
13. 黄药子治食道癌	(15)
14. 九节木叶防治白喉	(16)
15. 荸荠 (治多种癌症、糖尿病、子宫颈 糜烂)	(16)
16. 黄花稔根止痛	(18)

17. 广东万年青治内外痔	(18)
18. 九节风(具广谱抗菌作用, 治疗癌肿、丝虫病)	(19)
19. 臭茉莉治子宫脱垂	(21)
20. 大力王治慢性气管炎	(22)
21. 肉碎补治疗链霉素中毒反应	(23)
22. 治疗矽肺有苗头的垂盆草	(24)
23. 优良的草药止痛剂——七叶莲	(25)
24. 治吐血良效的扶芳藤	(27)
25. 石仙桃(治疗脑震荡、眩晕症)	(27)
26. 穿根藤治风湿麻痹	(28)
27. 毛萎镇痛	(29)
28. 地蚕(益肾润肺、滋阴补血)	(29)
29. 止咳良药——乌肺叶	(30)
30. 匙羹藤(治疗内外痔疮)	(31)
31. 四方果(治小儿疝气)	(31)

二、中草药验方选编 (32)

<—> 预防疾病验方	(32)
1. 预防流行性感冒	(32)
2. 预防麻疹	(32)
3. 预防流行性乙型脑炎	(32)
4. 预防传染性肝炎	(33)
5. 预防狂犬病	(33)
6. 预防流行性脑脊髓膜炎	(33)
7. 预防钩端螺旋体病	(34)

8. 预防白喉	(34)
< 二 > 传染病验方	(34)
1. 感冒	(34)
2. 流行性感冒	(36)
3. 流行性乙型脑炎	(36)
4. 流行性腮腺炎	(38)
5. 脊髓灰质炎(小儿麻痹症)	(38)
6. 传染性肝炎	(38)
7. 百日咳	(40)
8. 细菌性痢疾	(41)
9. 阿米巴痢疾	(43)
10. 钩端螺旋体病	(43)
11. 疟疾	(44)
12. 慢性支气管炎	(45)
< 三 > 内、儿科疾病	(46)
1. 小儿哮喘	(46)
2. 肺炎	(46)
3. 溃疡病	(47)
4. 急慢性肝炎	(49)
5. 肝硬化腹水	(49)
6. 小儿疳积	(50)
7. 小儿消化不良	(50)
8. 急性胃肠炎	(52)
9. 滴虫性肠炎	(53)
10. 尿路感染	(54)
11. 肾炎	(54)

12.	急性溶血性贫血	(55)
13.	脑出血	(56)
14.	地方性甲状腺肿	(58)
15.	风湿性关节炎	(58)
16.	夏季热	(59)
17.	脾功能亢进	(59)
18.	渗出性胸膜炎	(59)
<四> 外科疾病		(60)
1.	止痛	(60)
2.	毒蛇咬伤	(61)
3.	跌打损伤	(63)
4.	胆囊炎	(64)
5.	阑尾炎	(64)
6.	脱肛	(65)
7.	泌尿系结石	(65)
8.	颈淋巴结结核	(66)
9.	脑震荡	(66)
<五> 妇产科疾病		(66)
1.	月经不调	(66)
2.	痛经	(66)
3.	功能性子宫出血	(67)
4.	阴道炎	(67)
5.	宫颈炎	(68)
6.	子宫脱垂	(68)
7.	产后宫缩痛	(69)
8.	产后会阴水肿	(69)

〈六〉五官科疾病	(69)
1. 麦粒肿	(69)
2. 结膜炎	(70)
3. 角膜斑翳	(70)
4. 夜盲症	(70)
5. 化脓性中耳炎	(71)
6. 扁桃体炎	(71)
7. 口腔炎	(71)
〈七〉皮肤病	(72)
1. 牛皮癣	(72)
2. 湿疹	(72)
3. 神经性皮炎	(73)
4. 下肢溃疡	(74)
三、处方用药科属一览表	(75)

一、品种介绍

1 空心苋（防治乙脑、流行性出血热）

来源：为苋科虾钳菜属植物空心苋，药用全草。

别名：螃蟹菊，喜旱莲子草，抗战草，革命草。

功用：

1. 500%煎剂口服治疗麻疹。
2. 以100%溶液，每日静脉点滴注射1次，治乙型脑炎。
3. 以煎剂治流行性出血热，疗效达100%。
4. 口服煎剂预防流感。
5. 以1:50注射液5毫升肌注，每8小时1次，治带状泡疹。

对亚洲甲型流感病毒有抑制作用；对乙脑病毒和狂犬病毒有一定灭活作用（武汉市传染病医院螃蟹菊科研小组）。

又据湖南省凤凰县人民医院儿科赵树章于《湖南医药杂志》1974年第3期报导，用本品制剂治疗重症乙型脑炎有显著效果。

用法：取鲜药制成100%静脉注射液及500%口服液（静脉液中并含10%葡萄糖）。剂量为20~50g/公斤体重/日，昏迷不能口服者，静脉点滴，神志恢复能口服改为口服，直至症状基本消失为止。

其他治疗：全部病例均加用氢化考的松或强的松。并发症者加用抗菌素；心力衰弱者加用毒毛旋花子苷K或西地兰；脑水肿者加用脱水剂如甘露醇等；呼吸衰弱者用呼吸兴奋剂如阿托品等。对症治疗如降温、给氧、止氯剂，纠正酸中毒及维持水电解质平衡等。

治疗 17 例中治愈 14 例，中途出院 1 例，死亡 2 例，病死率为 13·3%。其中 1 例合并房间隔缺损、肺炎，死于心力衰弱；另 1 例因输液反应后脑水肿并发小脑扁桃体疝而死亡。

神志恢复时间：2 天者 1 例；3 天者 4 例；4 天者 3 例；6 天者 2 例；7 天者 1 例；10 天者 1 例；11 天者 1 例；12 天者 1 例。最短者 2 天，最长者 12 天。

恢复期遗有精神及神经症状者 5 例，主要表现为痴呆、失语、肢体强直、震颤、多动、哭笑无常。1 例回家后 3 个月随访，已基本恢复正常，其余 4 例未能随访。

该院“乙脑”历年之病死率 1970 年为 50%；1971 年为 25·8%；1972 年为 31%，均包括普通型在内。1973 年主用空心苋治疗后，病死率下降至 13·3%（若包括普通型在内，病死率为 9·5%）。各年其他治疗方法及医疗护理条件基本相同，而死亡率明显降低，说明空心苋对“乙脑”有明显的治疗作用，且病死 2 例中，1 例原有先天性心脏病（房间隔缺损）并发肺炎，死于心力衰弱。

据武汉市传染病院动物试验，小白鼠静注空心苋 200 g／每公斤体重，无不良反应。湖南省凤凰县人民医院使用小剂量 20～50 g／每公斤体重，除输液反应外，均未发

现不良副作用，故其毒性很小，使用安全，在静脉点滴时，可与多种抗菌素（青霉素、氯霉素、红霉素、四环素）及急救药品（西地兰、毒毛旋花子苷K、氢化考的松、异丙基肾上腺素、去甲肾上腺素、洛贝林、可拉明、阿托品、乳酸钠、小苏打）配伍，仅少数药品如冬眠灵、非那根不能配伍，故使用上也很方便。

但17例中，有3例静脉输入空心管途中发生输液反应，对制剂质量，无菌操作，消毒方面应引起高度重视。

附注：经华东农科所作植物分析，其成份为：水份77·5%，粗蛋白3·2%，粗脂肪0·3%，粗纤维2·6%，粗灰粉4·4%，无氮浸出物12%。

2 抗痨新药——葎草

来源：为大麻科葎草属植物葎草，药用全草。

别名：拉拉藤。

《广西本草选编》记载，味苦，性寒。利尿消肿，凉血解毒。主治痢疾、血尿、小便淋沥，用鲜藤、叶1~2两，水煎服。肺结核潮热，用花研末，每用1钱5分，调蜜糖服。颈淋巴结结核，用藤、叶2两，红枣10个，水煎服。全草含黄酮甙、葡萄糖甙、木犀草黄素、挥发油、鞣质。果实含蛇麻酮、酒花酮。乙醇浸出液对革兰氏阳性细菌有抑制作用。花、果对人型结核杆菌有显著抑制作用。

据武汉市结核病防治院葎草研究小组报导用葎草治疗肺结核有显著疗效。

制作方法：全草洗净切碎，以酒精浸泡法（或煎煮浓缩）制成每毫升含1克葎草溶液，调节PH值至6.7~7.0

左右，加入0.85%氯化钠，搅匀，装安瓿消毒。

用法：肌肉注射，每日2次，每次2~4毫升。一般1个月为1疗程。

疗效观察：选择经链霉素、异菸肼等抗痨药物治疗不理想的复治肺结核患者80例，用葎草治疗1个疗程，效果如下：

1. 80例患者，经治疗1个月后症状消失或改善者72例，占90%。

2. 80例患者中，治疗前痰菌阳性者47例，经治疗1个月后，痰菌阴转者21例，占45%。

3. 80例患者中，治疗前有空洞者51例，经治疗1个月后，空洞缩小或关闭者36例，占70%，其中以干酪性和薄壁空洞较明显。

病例1，张××，男，54岁。患肺结核20年，长期使用抗结核药，1970年11月26日转入院，当时咳嗽，痰血，胃口不好，诊断为六型肺结核^上_{上+中}(+)，空洞为厚壁空洞(断层检查)。经葎草治疗1个月，咳嗽、痰血消失，食欲明显增加，断层检查空洞关闭，痰菌(-)。

病例2，×××，男，37岁。下午低烧半月，咳嗽，精神不佳。1970年9月14日胸片示：右肺尖1、2、3前肋间片状密度不均匀影，1肋间见3×4.5厘米透明区，诊断为浸润型肺结核进展期，经葎草治疗1个月，不咳不烧，精神佳，胸片(平片)复查，病灶明显吸收，空洞缩小。

经广西上林县人民医院试用，疗效确实，并治愈支气管扩张1例。

本品副作用小，对部份患者进行肝肾功能检查无影响，从这80例可以看到，疗程虽短，但疗效显著，且本药药源广，价廉，在目前耐药菌株产生，链霉素等抗痨药物的应用受到影响的情况下，为增加一种抗痨药物，有必要推广应用，以作进一步研究。

3 薔草（治疗多种炎症）

来源：为菊科蓍属植物蓍草，药用全草。

别名：飞天蜈蚣，土一支蒿，羽衣草。

本品民间习用已久，最近经江西省德兴县卫生局等单位研究，其成份含挥发油、生物碱、内脂香豆精、氨基酸、酚性物、还原性物质、多糖类等化合物。

一、蓍草有效部份制剂工艺摸索。

1. 蓍草片剂的制备：

处方：酸醇提取浸羔（含水份约20%）100克，淀粉150克，硬脂酸镁1克。

制法：将浸羔加入淀粉制成软材，过16目筛制成颗粒，60~70度烘干，拌入硬脂酸镁，压制成为0.4克重之片剂，每片含浸羔量0.17克。

用法：每日3次，每次5~10片。

2. 蓍草注射剂的制备：

处方：酸性乙酸乙酯提出物100克，苯甲酸10毫升，丙二醇50毫升，亚硫酸氢钠1克，加蒸馏水至500毫升。

制法：取提取物100克加水50毫升，拌成稀糊状，再加水200毫升搅拌，放置分出上清液，残渣再用温水洗3次，合拌洗液和上清液400毫升，将亚硫酸氢钠溶于

20毫升水中，与上溶液混合，放冰箱24小时，倾出上清液抽滤至澄清，加入1克活性炭（分3批加入），水浴上加热脱色半小时，过滤至清，冷却，调PH4·4，加苯甲醇4毫升，使溶解过滤，余下苯甲醇和丙二醇混合加入滤液中，加水至500毫升，过滤至清，摇匀灌封，使每支含药液2毫升，100°C蒸气灭菌30分钟，印字包装即成。

用法：2~4毫升肌注，1日2~3次。

注：针剂制备过程中，加热和PH值的变化对质量有影响，应注意。

二、疗效观察。

1·治疗炎症性疾病332例疗效观察：

给药方法：蓍草片，成人每次口服5片，日服3次，病重者用量可加倍。蓍草注射液，成人每次肌注2~4毫升，每日2次。

近期疗效统计表

病名	总例数	痊愈	好转	无效	有效率%
急性扁桃腺炎	92	54	25	13	85·9
细菌性痢疾	61	38	12	11	82·9
急性阑尾炎	27	22	2	3	88·9
外科炎症	79	50	15	14	82·3
肠炎	56	43	8	5	91·1
上感	17	6	9	2	88·2
合计	332	213	71	48	85·5

以上临床验证单位：北京医疗队、德兴县卫生局科研科，德兴县人民医院、铜矿职工医院、铅锌矿职工医院、长田卫生

院，福泉山场卫生院、万村公社卫生院、香屯公社卫生院等。

2. 治疗阑尾炎，肾盂肾炎等7种炎症。

给药方法同前。危重病例片剂和针剂同时使用。

疗效统计表

病名	例数	痊愈	好转	无效
急性肾盂肾炎	6	6		
慢性肾盂肾炎	4		3	1
盆腔炎	5	3	2	
胆道感染	11	8	2	1
阑尾炎	17	15	2	
急性扁桃腺炎	8	5	2	1
急性菌痢	2	2		
急性肠炎	2	2		
合计	55	41	11	3

验证单位：江西省上饶地区人民医院。

3. 治疗盆腔炎等4种炎症。

蓍草片成人服5片，日服3次或蓍草注射液2~4毫升肌注，一日2次。盆腔炎，肾盂肾炎10~14天为1疗程，扁桃腺炎、肠炎3~5天为1疗程。

疗效统计

病名	例数	痊愈	好转	无效
盆腔炎	18	11	7	
急性肾盂肾炎	6	2		4
急性扁桃腺炎	5	4		1
慢性肠炎	2		2	
合计	31	17	9	5

验证单位：江西省上饶市人民医院。

4 治疗类风湿有苗头的六方藤

来源：为葡萄科白粉藤属植物六方藤，药用茎。

别名：六骨春筋藤，抽筋藤。

本品未见有书本记载，民间用以治疗风湿骨痛，筋络不舒。最近据云南省姚安县东山卫生所报导，用本品治疗类风湿性关节炎 68 例，重点观察 20 例，近期疗效满意。

用法：六方藤 1 公两，浸酒 1 公斤，7 天后服用，每日 2~3 次，每次 10~15 毫升。

病例 1，昝普兰，女，66 岁，贫农。1972 年 2 月起病，首见右膝关节肿胀，疼痛，继而右肘、两腕、手指关节肿胀、疼痛，天寒冷时加重，至 7 月左右膝关节强硬，弯曲于 90 度姿势，不能下床活动，卧床 14 个月，大小便均要人照顾，两腕因疼痛不能拿起一斤重以上的物体。曾以中西药治疗无效，病情逐日加剧。

于 1972 年 9 月 5 日，服用本酒，一周后疼痛减轻，两周后疼痛消失，肿胀稍有消退，两手可以拿起一个小木橙，1 个月后可以站立，3 个月可以行走，半年后参加煮饭、领小孩等家务劳动，服药半年，未见不良反应。

病例 2，张化禄，男，49 岁，干部。1953 年 2 月起病，首见两足拇指关节刺痛，不能行走，每年冬季发作，均要住院治疗 3~6 个月，至夏秋缓减，原使用可的松有一定疗效，近半年无效。

于 1968 年 12 月，以草药六方藤药酒每日 2~3 次每次 10 毫升，连服 3 个月。服药第 2 周疼痛消失，可以行走，肿胀逐日消退。后因患者有胃炎，不敢多服，停药两年

余，于1972年元旦复发，但症状减轻，复以六方藤药酒治疗，仍有效，现间断给药，一年半未见复发，服药期间，亦未发现中毒情况。

病例3，胡中香，女，17岁，贫农。1970年12月起病，首见右足拇趾关节疼痛，肿胀，继以两踝、腓骨头、两肘等关节肿胀，疼痛，行走困难，上楼要爬行。于1972年在县医院摄了右足正侧位X光片报告，骨质增生，增厚，疏松，脱钙，诊断为“类风湿关节炎”。用过大剂量的可的松、保太松、安乃近等治疗无效，可的松可以止痛1天，停药则更加疼痛，已9个月未参加劳动。

72年7月10号到我所住院治疗，以六方藤药酒10毫升，每日3次口服，同时服用维生素乙、酵母片等治疗7、8天，疼痛更剧。第9日疼痛消失，以后肿胀逐日消退，不但可以行走，且可跑步下楼。一月后参加劳动。73年4～5月下田栽秧，薅秧35天，未见复发，现可挑50斤重的肥料，送到10公里以上的山地，服药10个月，未见不良反应。

其它病例尚多，不一一列举。从已有病例中，剂量以每日2～3次，每次10～15毫升为宜，连服3个月，未见严重中毒情况，也未发现明显禁忌，仅有1例吃蛇肉后服药，引起呕吐等急性胃炎症状。

5 对叶草(民间治肝炎的有效良药)

来源：为爵床科柔刺草属植物柔刺草，药用全株。

别名：竹节王，拔弹藤，调节草。

《广西本草选编》记载，本品味微涩，性凉。清热除