

初中学生数学课外阅读系列

MIANJI
GUANXI
BANGNI



JIE TI

张景中 编著
上海教育出版社

面积关系
帮你解题

初中学生数学课外阅读系列

面积关系帮你解题

张 景 中

上海教育出版社

初中学生数学课外阅读系列

面积关系帮你解题

张景中 编著

上海教育出版社出版发行
(上海永福路123号)

各地新华书店经销

上海市印刷三厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张3.75 字数77,000

1982年12月第1版 1998年7月第7次印刷

印数 137,141—142,160本

ISBN 7-5320-5334-2/G·5576

定价: 3.70元

序

在中学阶段，数学是很重要的课程，对于提高学生的文化素质，有极大的作用。学生将来无论从事哪一种职业，都需要打好数学基础，有好的数学修养，更不必说从事理工科、经济管理方面的专门工作了。

怎样学好初中数学？课堂学习是最重要的一个环节，练习一定数量的习题也是完全必要的。但是现在有一种倾向，认为题目做得越多越好，越难越好；又有一种倾向，认为课外再要请老师辅导，老师辅导得越多越好。这样不仅造成学生课业负担过重，而且会影响学生智力的发展。

我认为要想学好数学（其他学科也如此），培养自学能力和思考能力最为重要，即使在初中阶段，能使學生有自行阅读课外读物的能力是很重要的事，特别对那些学习较好的同学，尤其如此。任课教师最好在提高课堂教学的同时，留一些时间让学生自学，启发学生思考，这样也就能进一步提高学生的兴趣和水平。因此好的课外读物就显得非常重要了。

上海教育出版社出版了《初中学生数学课外阅读系列》，内含10本小册子：《漫游勾股世界》、《绝对值》、《多项式的乘法和因式分解》、《怎样列方程解应用题》、《怎样解不等式》、《怎样用配方法解题》、《面积关系帮你解题》、《怎样添辅助线》、《根与系数的关系及其应用》、《反证法》。这些专题是中学数学中极其重要的基本内容，并且是初等数学的基础。这些专题有的注重于与横向知识的联系，以培养初中学生初

步运用知识解决问题的综合能力；有的适当介绍了知识的自身发展并注重于与后续内容的联系，以便让学生领略数学知识的应用和作用。例如《面积关系帮你解题》，看来似乎只是讲几何的，其实却蕴含着许多三角、代数的内容。又如《根和系数关系及其应用》，从二次方程的判别式和韦达定理出发，引出了许多几何和代数的问题，还包含了解析几何的思想。这套丛书还将趣味性寓于知识性之中，例如《漫游勾股世界》中，有许多有趣的故事和问题。总之，这是一套开拓学生视野，训练学生思维，为学生终身受益的一套课外读物。这套书由专家和有经验的教师所撰写，所以质量是有保证的。初中学生如果能够读懂其中的某些分册或某些部分，就会得到很多益处。

于复旦

于复旦大学数学所

1995.5.

目 录

一、一个古老而年轻的方法	1
二、同一个面积的多种表示	6
三、一个公式表示多种面积	11
四、面积公式小试锋芒	15
五、它可以导出许多基本定理	20
六、初步小结	26
七、证明长度或角度相等	30
八、证明比例式或复杂的比例式	37
九、证明和差倍分关系	45
十、证明三点共线与三线共点	49
十一、利用面积关系作几何计算	59
十二、面积关系与几何不等式	66
十三、几个著名定理的面积证法	76
十四、带号面积和面积坐标	82
十五、向前还能走多远?	100
练习题的提示或解答概要	102

一、一个古老而年轻的方法

利用面积关系来说明数学中的某些恒等式、不等式，或证明某些定理，这是一个古老而又年轻的方法。

说它古老，是因为：早在三千多年前，在几何学还没有形成一门系统的学科时，人们已经会用这种方法来解决某些问题了。

说它年轻，是因为：直到今天，人们并没有给它足够的重视，因而，这种方法的潜力远没有得到发挥。它广泛的、五花八门的用途，很少在教科书、教学参考书和各种学生读物中得到较系统的阐述。

几何学的产生，源于人们对土地面积的测量的需要。翻开任何一本关于数学史的通俗读物，差不多都记载着这样的故事：在古埃及，尼罗河每年泛滥一次。洪水给两岸的田地带来了肥沃的淤积泥土，但也抹掉了田地之间的界线标志。洪水退后，人们要重新划出田地的界线，这就必须丈量 and 计算田地的面积。年复一年，就积累了最基本的几何知识。

这样看来，从一开始，几何学便与面积结下不解之缘。英语中的“几何”——“Geometry”，这个字的字头“geo-”，便含有“土地”的意思。

但是，用面积关系来证明几何定理，最早的例子是勾股定理的证法。所谓勾股定理，就是：

在直角三角形中，两直角边的平方之和等于斜边的平方。

我国古代数学家把直角三角形的较短的直角边叫“勾”，较长的直角边叫“股”，而把斜边叫做“弦”。因而把这个定理叙述为“勾方加股方等于弦方”，勾股定理由此而得名。

勾股定理的下述精采证明，是我国古代数学家智慧的结晶。

勾股定理证法之一：

如图，四个同样大小的直角三角形的斜边围成一个正方形；它们的直角边围成了一个更大的正方形。（为什么？请读者自证。）




图 1

设直角三角形两直角边分别为 a 、 b ，斜边为 c 。图中大正方形面积

$$S_{\text{大}} = (a+b)^2,$$

小正方形面积

$$S_{\text{小}} = c^2,$$

直角三角形面积 $S_{\Delta} = \frac{1}{2}ab$ 。显然有

$$S_{\text{大}} = S_{\text{小}} + 4S_{\Delta},$$

也就是

$$(a+b)^2 = c^2 + 2ab,$$

把等式的左边展开，两边消去 $2ab$ ，便得勾股定理

$$a^2 + b^2 = c^2.$$

□●

到目前，勾股定理常见的证明方法，已有数十种了，但其中最简单的证法，仍然是利用面积关系。

勾股定理证法之二：

● □记号表示证毕的意思。

作直角 $\triangle ABC$ 斜边 AB 上的高 CD , 得到三个相似三角形, 即

$$\triangle ABC \sim \triangle ACD \sim \triangle CBD.$$

(为什么? 请读者自证.)

根据相似三角形的面积与对应边的平方成正比的定理, 可得

$$S_{\triangle ABC} : S_{\triangle ACD} : S_{\triangle CBD} = AB^2 : AC^2 : BC^2.$$

也就是

$$S_{\triangle ABC} = kAB^2, \quad S_{\triangle ACD} = kAC^2, \quad S_{\triangle CBD} = kBC^2;$$

这里 k 为正数. 但是

$$S_{\triangle ABC} = S_{\triangle ACD} + S_{\triangle CBD},$$

因而

$$kAB^2 = kAC^2 + kBC^2,$$

也就是

$$AB^2 = AC^2 + BC^2.$$

□

用面积关系说明一些基本的恒等式或不等式, 也是早就被许多教科书所采用的方法. 例如, 从图 3 一眼便可看出恒

等式①




图 3

$$(x+y)^2 - (x-y)^2 = 4xy,$$

由于 $(x-y)^2 \geq 0$, 从而得到不等式

$$(x+y)^2 \geq 4xy,$$

或者化简一下, 得

$$x^2 + y^2 \geq 2xy.$$

当且仅当 $x=y$ 时等号才成立.

生理学家和医学家们的研究发现: 我们大脑的两个半球, 左半球主要管抽象的东西——语言, 逻辑, 数字……, 右半球

① 请注意: 阴影部分的面积是 $(x-y)^2$.

主要管具体的东西——形象, 图画, 音乐……. 把抽象的代数关系用具体的图形表示出来, 便动员了两个半球同时工作, 印象深、理解快、记得牢. 用图形表示代数关系的重要方法之一, 便是用面积关系来联系的.





这本小册子的目的, 是试图较为系统地阐述用面积关系证明几何命题的基本技巧和方法.

练 习 题 一

1. 用面积关系表示下列恒等式:

(1) $(x+y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$; (2) $(x-y)^2 = x^2 - 2xy + y^2$.

2. 利用下列图形, 给出勾股定理的几种证法.



(第2题图)

3. 用面积关系表示阿贝尔恒等式:

$$\begin{aligned} & a_1b_1 + a_2b_2 + \cdots + a_nb_n \\ &= a_1(b_1 - b_2) + (a_1 + a_2)(b_2 - b_3) + \cdots \\ & \quad + (a_1 + a_2 + \cdots + a_{n-1})(b_{n-1} - b_n) + (a_1 + a_2 + \cdots + a_n)b_n. \end{aligned}$$

二、同一个面积的多种表示

上面介绍的勾股定理的古老证法一虽然简单，但它已体现了用面积关系证题的基本思想：用不同的方法计算同一块面积，从而得到一个等式——这样的等式我们把它叫做“面积方程”；再对这个“面积方程”进行整理或变换，以获得我们所需要的结果。

为了能够列出各种各样的面积方程，就要熟悉面积的计算方法。平面几何中许多图形，都可以分割成若干个三角形。于是，我们应当熟悉三角形面积的各种表示法。

按习惯，用 a, b, c 分别表示 $\triangle ABC$ 的三个角 A, B, C 所对的边， h_a, h_b, h_c 顺次表示为 a, b, c 三边上的高。我们最熟悉的三角形面积公式是

$$\text{三角形面积} = \frac{1}{2} \times \text{底} \times \text{高},$$

以后，为方便起见，我们同时用记号“ $\triangle ABC$ ”表示三角形 ABC 本身和它的面积。这样做，记号的意义可由上下文看出，并不至于混淆。上述公式便可清楚地记作

$$\triangle ABC = \frac{1}{2} ah_a = \frac{1}{2} bh_b = \frac{1}{2} ch_c. \quad (I)$$

对公式(I)略加改变，利用关系式

$$h_a = b \sin C$$




图 4

等代入,便得到了与角、边都有联系的公式

$$\triangle ABC = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2}ac \sin B = \frac{1}{2}ab \sin C. \quad (\text{II})$$

这个公式,往往不被人们重视。其实,它的用处很大。因为它把平面几何中三种最重要的度量——长度、角度、面积——紧密地联系在一起的。下面,我们很快可以看到公式(II)的重要性。

还有一个大家所熟知的海伦公式,即已知三角形三边求面积的公式

$$\triangle ABC = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}. \quad \textcircled{1} \quad (\text{III})$$

我们利用勾股定理可从(I)导出这个公式。事实上,在图4中令 $BD = x$, 那末 $DC = a - x$, 由勾股定理列出方程

$$c^2 - x^2 = b^2 - (a - x)^2,$$

展开后解得

$$x = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2a}.$$

$$\begin{aligned} \therefore h_a^2 &= c^2 - x^2 = \frac{1}{4a^2} [4a^2c^2 - (a^2 + c^2 - b^2)^2] \\ &= \frac{1}{4a^2} (2ac + a^2 + c^2 - b^2)(2ac - a^2 - c^2 + b^2) \end{aligned}$$

① $s = \frac{1}{2}(a+b+c)$ 表示 $\triangle ABC$ 的周长的一半。

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{4a^2} [(a+c)^2 - b^2] [b^2 - (a-c)^2] \\
&= \frac{1}{4a^2} (a+b+c)(a-b+c)(a+b-c)(-a+b+c) \\
&= \frac{4}{a^2} s(s-a)(s-b)(s-c).
\end{aligned}$$

由此即得公式(III). □

三角形的面积公式远远不只以上三个，还可以导出已知三条高、或三条中线、或三条角平分线、或两角一边、或一边及另两边上的高、或一角一对边及这边上的中线等等求面积的公式。这样的公式至少也有几十种。但是，在应用面积关系解题时，有了这三个，也就足够用了。其它多种多样的三角形面积公式，都可以直接或间接地由这三个基本公式导出。请看以下的两个例子：

[例1] 已知 $\triangle ABC$ 两边 b, c 上的高为 h_b, h_c ，及另一边 a ，求它的面积。

解 利用面积公式(I)，得到

$$b = \frac{2\Delta}{h_b}, \quad c = \frac{2\Delta}{h_c},$$

这里简记 $\triangle ABC$ 为 $\triangle$ ，代入海伦公式，得

$$\begin{aligned}
\Delta &= \frac{1}{4} \left[a + \left(\frac{1}{h_b} + \frac{1}{h_c} \right) 2\Delta \right]^{\frac{1}{2}} \left[-a + \left(\frac{1}{h_b} + \frac{1}{h_c} \right) 2\Delta \right]^{\frac{1}{2}} \\
&\quad \times \left[a + \left(\frac{1}{h_b} - \frac{1}{h_c} \right) 2\Delta \right]^{\frac{1}{2}} \left[a - \left(\frac{1}{h_b} - \frac{1}{h_c} \right) 2\Delta \right]^{\frac{1}{2}}.
\end{aligned}$$

$$\therefore 16\Delta^2 = \left[\left(\frac{1}{h_b} + \frac{1}{h_c} \right)^2 4\Delta^2 - a^2 \right] \left[a^2 - \left(\frac{1}{h_b} - \frac{1}{h_c} \right)^2 4\Delta^2 \right].$$

展开后得方程

$$16\left(\frac{1}{h_b^2} - \frac{1}{h_c^2}\right)^2 \Delta^4 - 8\left[a^2\left(\frac{1}{h_b^2} + \frac{1}{h_c^2}\right) - 2\right]\Delta^2 + a^4 = 0.$$

解这个方程, 它的唯一的正实数根即为 $\triangle ABC$ 的面积. 以下从略. $\square$

[例 2] 已知 $\triangle ABC$ 的三条中线为 m_a, m_b, m_c , 求它的面积.

解 如图 5 所示, 设三条中线 AD, BE, CF 交于 P 点, 由于




图 5

$$AP = \frac{2}{3}AD,$$

$$\therefore \triangle APF = \frac{1}{2}\triangle ABP = \frac{1}{6}\triangle ABC.$$

取 AP 的中点 M , 那末

$$MP = \frac{1}{3}m_a, \quad PF = \frac{1}{3}m_c, \quad FM = \frac{1}{3}m_b.$$

而

$$\triangle MPF = \frac{1}{2}\triangle APF = \frac{1}{12}\triangle ABC.$$

于是由海伦公式可得

$$\frac{1}{12}\triangle ABC = \triangle MPF = \frac{1}{9}\sqrt{m(m-m_a)(m-m_b)(m-m_c)}$$

$$\left(m = \frac{1}{2}(m_a + m_b + m_c)\right).$$

$$\therefore \triangle ABC = \frac{4}{3}\sqrt{m(m-m_a)(m-m_b)(m-m_c)}. \quad \square$$

在上面的解法中，用到了中线的性质。这些性质也可以独立地由面积关系导出。请读者参看第九节的例 1。

练 习 题 二

1. 已知 $\triangle ABC$ 的三条高为 h_a, h_b, h_c ，求它的面积和三边。
2. 已知 $\triangle ABC$ 的周长和内切圆的半径，求它的面积。
3. 已知 $\triangle ABC$ 的 a 边及 B, C 两角，求它的面积。

三、一个公式表示多种面积

前面说过, 面积公式(II)

$$\triangle ABC = \frac{1}{2} bc \sin A = \frac{1}{2} ac \sin B = \frac{1}{2} ab \sin C$$

用途最广, 因为它把长度、角度和面积三种度量联系在一起了。另外, 它还有一个有趣的特点——“一身而兼多任”, 可以表示好几种图形的面积。

本来, 在公式

$$\triangle ABC = \frac{1}{2} ab \sin C$$

中, a, b 表示 $\triangle ABC$ 中角 C 的两夹边。但我们稍一留心, 便可发现, 完全能够给 a, b, C 以更广义的解释。

把这广义的解释写成

[命题 1] 在 $\triangle ABC$ 中, 设 $BC = a$, 在直线 BC 上任取一点 P , 设 $AP = b^*$ ①, AP 与 BC 所成的角(锐角或钝角任取其一)为 C^* , 那末有

$$\triangle ABC = \frac{1}{2} ab^* \sin C^*.$$

证明 如果点 P 与 B, C 之一重合, 所要证的就是前面的公式(II)。如果不重合, 不外有以下三种情形:

① 我们把 AP 叫做 $\triangle ABC$ 在 BC 边上的斜高。