

# 重慶中藥

重慶市衛生局編  
重慶人民出版社

# 中美年度



美國政府出版  
美國政府印刷局

# 重 庆 中 药

重 庆 市 卫 生 局 編

重 庆 人 民 出 版 社

# 重 庆 中 藥

重 庆 市 卫 生 局 編

---

重 庆 人 民 出 版 社 出 版 (重 庆 嘉 陵 路 344 号)

重 庆 市 书 刊 出 版 业 营 业 許 可 証 出 字 第 1 号

重 庆 新 华 印 刷 厂 印 刷 四 川 省 新 华 书 店 重 庆 发 行 所 发 行

开 本 850 × 1168 1/32 印 张 13 1/4 字 数 345 千

1962 年 2 月 第 1 版 1962 年 2 月 第 1 次 印 刷

印 数, 1-6,000 册

---

统 一 书 号: 14114 · 23

定 价: (7) 1.35 元

## 前 言

中藥与中医有同样悠久的历史，同为祖国宝贵的文化遗产，几千年来，对维护我国人民身体健康与民族繁衍起着重大的作用。

重庆历来是中藥材集散地，并有規模較大、歷史較久的中藥飲片与膏丹丸散炮制加工場所，有許多中藥師不仅繼承和掌握了前人的藥学知識，而且在多年的实际工作中創造和积累了很多有关中藥經營管理、加工炮制和品質鑒別等方面的經驗。这些宝贵經驗很需要进行全面的系統的記錄和总结。同时，在党的中医政策鼓舞下，西医学习中医运动已普遍深入展开，中藥材生产亦随之蓬勃发展，中藥材調拨儲运工作更加頻繁，这样，中西医药卫生人員，尤其是藥工人員就很需要有关中藥方面的書籍，以供中藥經營管理、加工炮制、品質鑒別和学习研究时参考。为此，我局乃会同中国科学院四川分院中医中藥研究所、重庆中藥材采購批發站等单位，編輯“重庆中藥”，以便更好地貫徹党的中医政策，繼承和发揚祖国藥学遺產，使中医中藥工作更好地为保障人民身体健康，为社会主义建設服务。

“重庆中藥”共收載了本市較常用的中藥375种，每一品种均分概述、来源形态、性状鑒別、效用……等項目敘述。內容除来源形态一項多参考其他書籍外，主要是本市中藥師在实践中不断积累的宝贵經驗的記錄和总结。由于我們編輯这样的書还缺乏經驗，遺漏和不妥当的地方是會有的，甚盼各地讀者多加批評指正。

重庆市卫生局

1961年10月

## 凡 例

1. 本書共收載重慶市常用中藥 375 種。每種分別名、概述、產地、產季、產地加工、性狀鑒別、商品規格、加工炮制、效用、貯存等十個項目敘述。

2. 在概述中介紹了重慶市對中藥材的銷售、使用的路道與歷史習慣，並對各地使用情況不一致（如同名異物、同物異名、代用品等）的品種作了初步考查。

3. 來源與形態一項，是記載植物所屬的科名和藥用部分，並對原植物作了簡單的形態描述。

4. 性狀鑒別是根據重慶市中藥老師的經驗編寫的，對較複雜品種除描述总的性狀外，並對各路道提出特點和區別點。

5. 在加工炮制項下，對部分藥物加述了成品性狀，使讀者對原生藥與飲片有較全面的認識。

6. 品名與別名以重慶市中藥老師的習慣稱呼為準，很少有人知道的名稱則未收載。

7. 本書所載季節和月分均指農曆而言。

8. 本書所載長度以市尺為單位；重量以市斤（十六兩）為單位。

# 目 录

| 根 类 |      |                 |
|-----|------|-----------------|
| 山药  | (1)  | 何首乌 (37)        |
| 山慈姑 | (2)  | 牡丹皮 (38)        |
| 山豆根 | (3)  | 赤芍 (39)         |
| 大戟  | (5)  | 麦冬 (41)         |
| 川乌  | (6)  | 附子〔附：各种附片〕 (42) |
| 千年健 | (7)  | 远志 (48)         |
| 巴戟天 | (8)  | 明参 (49)         |
| 牛膝  | (9)  | 青藤香 (50)        |
| 天冬  | (11) | 板蓝根 (51)        |
| 木香  | (12) | 郁金 (52)         |
| 白藜  | (14) | 羌活 (54)         |
| 白芷  | (16) | 胡黄连 (56)        |
| 白芍  | (17) | 前胡 (56)         |
| 白薇  | (19) | 南沙参 (58)        |
| 白鲜皮 | (20) | 苦参 (59)         |
| 白头翁 | (21) | 草乌 (60)         |
| 仙茅  | (22) | 秦艽 (61)         |
| 甘草  | (23) | 粉葛 (62)         |
| 甘遂  | (24) | 桑白皮 (64)        |
| 玄参  | (25) | 桔梗 (64)         |
| 防风  | (26) | 茜草 (66)         |
| 防己  | (28) | 乌药 (67)         |
| 地骨皮 | (30) | 狼毒 (68)         |
| 地榆  | (30) | 党参 (69)         |
| 地黄  | (32) | 紫苑 (72)         |
| 百部  | (33) | 紫草 (74)         |
| 当归  | (35) | 常山 (75)         |
|     |      | 商陆 (76)         |
|     |      | 黄芩 (77)         |

|          |      |          |       |
|----------|------|----------|-------|
| 黄耆.....  | (79) | 泽泻.....  | (119) |
| 都柴首..... | (81) | 独活.....  | (120) |
| 椿根皮..... | (82) | 骨碎补..... | (122) |
| 漏蘆.....  | (83) | 香附.....  | (123) |
| 銀柴胡..... | (84) | 南星.....  | (124) |
| 藁本.....  | (85) | 知母.....  | (126) |
| 藜蘆.....  | (86) | 射干.....  | (127) |
| 續断.....  | (87) | 浙貝母..... | (128) |

### 根 茎 类

|          |      |          |       |
|----------|------|----------|-------|
| 川芎.....  | (89) | 貫众.....  | (129) |
| 川貝母..... | (90) | 黄精.....  | (131) |
| 大黃.....  | (92) | 黃連.....  | (132) |
| 土茯苓..... | (94) | 葛蒲.....  | (134) |
| 干姜.....  | (95) | 蒼朮.....  | (135) |
| 三七.....  | (97) | 蓬莪朮..... | (136) |

### 茎 类

|          |       |          |       |
|----------|-------|----------|-------|
| 三棱.....  | (98)  | 卫矛.....  | (138) |
| 山奈.....  | (99)  | 木通.....  | (139) |
| 天葵子..... | (100) | 木賊.....  | (140) |
| 天麻.....  | (101) | 五加皮..... | (141) |
| 升麻.....  | (102) | 石斛.....  | (142) |
| 玉竹.....  | (104) | 石楠藤..... | (143) |
| 白芨.....  | (105) | 肉蓯蓉..... | (144) |
| 白朮.....  | (107) | 血藤.....  | (145) |
| 白前.....  | (109) | 合欢皮..... | (147) |
| 白茅根..... | (110) | 沉香.....  | (147) |
| 白附子..... | (111) | 杜仲.....  | (149) |
| 半夏.....  | (112) | 松节.....  | (150) |
| 甘松.....  | (114) | 官桂.....  | (151) |
| 百 合..... | (115) | 苏木.....  | (152) |
| 延胡索..... | (116) | 降香.....  | (153) |
| 良姜.....  | (117) | 厚朴.....  | (154) |
| 狗脊.....  | (118) | 苦楝皮..... | (156) |



|     |       |
|-----|-------|
| 桑枝  | (156) |
| 秦皮  | (157) |
| 海桐皮 | (158) |
| 桂   | (159) |
| 通草  | (161) |
| 排草  | (162) |
| 紫荆皮 | (163) |
| 钩藤  | (163) |
| 黄柏  | (164) |
| 檀香  | (165) |
| 鎖阳  | (166) |

## 叶 类

|     |       |
|-----|-------|
| 大青叶 | (168) |
| 石葶  | (168) |
| 艾叶  | (169) |
| 枇杷叶 | (170) |
| 桑叶  | (171) |
| 側柏叶 | (172) |
| 番泻叶 | (173) |

## 花 类

|     |       |
|-----|-------|
| 丁香  | (175) |
| 木槿花 | (176) |
| 辛夷花 | (177) |
| 金银花 | (178) |
| 芫花  | (179) |
| 厚朴花 | (180) |
| 紅花  | (181) |
| 梅花  | (182) |
| 旋复花 | (182) |
| 腊梅花 | (183) |
| 款冬花 | (184) |

|    |       |
|----|-------|
| 菊花 | (185) |
| 葛花 | (187) |
| 蒙花 | (188) |
| 蒲黄 | (189) |

## 果实类

|      |       |
|------|-------|
| 八角茴香 | (190) |
| 山茱萸  | (191) |
| 山查   | (192) |
| 大腹皮  | (194) |
| 大枣   | (195) |
| 小茴香  | (196) |
| 女贞子  | (197) |
| 木瓜   | (198) |
| 五味子  | (199) |
| 化紅   | (200) |
| 牙皂   | (202) |
| 石榴皮  | (203) |
| 冬瓜皮  | (204) |
| 龙眼肉  | (204) |
| 地肤子  | (205) |
| 佛手   | (206) |
| 吴茱萸  | (207) |
| 刺蒺藜  | (208) |
| 青皮   | (209) |
| 青果   | (210) |
| 金樱子  | (211) |
| 花椒   | (212) |
| 香橼   | (213) |
| 橘萸   | (214) |
| 枳壳   | (216) |
| 枳实   | (217) |
| 苦楝子  | (218) |

|                  |       |          |       |
|------------------|-------|----------|-------|
| 枸杞.....          | (219) | 决明子..... | (251) |
| 蒴藋.....          | (220) | 車前子..... | (252) |
| 胡椒.....          | (221) | 赤小豆..... | (253) |
| 馬兜鈴.....         | (222) | 杏仁.....  | (254) |
| 草果.....          | (223) | 使君子..... | (255) |
| 桑椹.....          | (224) | 芡实.....  | (256) |
| 烏梅.....          | (225) | 青箱子..... | (257) |
| 益智仁.....         | (226) | 鬼絲子..... | (258) |
| 蛇床子.....         | (227) | 砂仁.....  | (259) |
| 梔子.....          | (228) | 枳椇子..... | (261) |
| 連翹.....          | (229) | 柏子仁..... | (261) |
| 訶子.....          | (230) | 胡麻仁..... | (263) |
| 絲瓜絡.....         | (231) | 相思子..... | (264) |
| 蒼耳子.....         | (232) | 胖大海..... | (265) |
| 槐角.....          | (233) | 韭子.....  | (265) |
| 罌粟壳.....         | (234) | 扁豆.....  | (266) |
| 萵澄茄.....         | (235) | 苡仁.....  | (267) |
| 橘皮〔附：橘紅、橘白〕..... | (236) | 荔枝核..... | (268) |
| 橘絡.....          | (237) | 草豆蔻..... | (269) |
| 复盆子.....         | (238) | 桃仁.....  | (270) |
| 鶴虱.....          | (240) | 牵牛子..... | (271) |

## 种子类

|          |       |          |       |
|----------|-------|----------|-------|
| 大力子..... | (241) | 黃豆卷..... | (272) |
| 木鼈子..... | (242) | 番木鱉..... | (272) |
| 巴豆.....  | (243) | 补骨脂..... | (273) |
| 木蝴蝶..... | (244) | 萊菔子..... | (274) |
| 火麻仁..... | (245) | 楮实子..... | (275) |
| 石蓮子..... | (246) | 蓖麻子..... | (276) |
| 冬葵子..... | (247) | 葶藶子..... | (277) |
| 白芥子..... | (248) | 葫蘆巴..... | (278) |
| 白果.....  | (249) | 酸枣仁..... | (279) |
| 肉豆蔻..... | (250) | 潼蒺藜..... | (280) |
|          |       | 榧子.....  | (281) |
|          |       | 鴉蛋子..... | (282) |

|         |       |
|---------|-------|
| 薏仁..... | (283) |
| 橘核..... | (284) |
| 檳榔..... | (285) |

## 全草类

|           |       |
|-----------|-------|
| 大蓟.....   | (287) |
| 小蓟.....   | (288) |
| 王不留行..... | (289) |
| 仙鹤草.....  | (290) |
| 龙胆草.....  | (291) |
| 灯芯草.....  | (292) |
| 谷精草.....  | (293) |
| 青蒿.....   | (294) |
| 佩兰.....   | (295) |
| 泽兰.....   | (296) |
| 香茹.....   | (296) |
| 柴胡.....   | (298) |
| 夏枯草.....  | (299) |
| 荆芥.....   | (300) |
| 海風藤.....  | (301) |
| 茵陈.....   | (302) |
| 益母草.....  | (303) |
| 鹿衔草.....  | (304) |
| 淡竹叶.....  | (305) |
| 細辛.....   | (306) |
| 淫羊藿.....  | (307) |
| 藜蘆.....   | (308) |
| 蒲公英.....  | (309) |
| 薄荷.....   | (309) |
| 瞿麦.....   | (310) |
| 藜香.....   | (311) |

## 动物类

|          |       |
|----------|-------|
| 九香虫..... | (314) |
| 土鼈.....  | (314) |
| 五灵脂..... | (315) |
| 水獺肝..... | (316) |
| 水蛭.....  | (317) |
| 牛黃.....  | (318) |
| 石决明..... | (320) |
| 白花蛇..... | (320) |
| 白僵蚕..... | (321) |
| 地龙.....  | (322) |
| 全蝎.....  | (323) |
| 血灵脂..... | (324) |
| 牡蠣.....  | (325) |
| 龟板.....  | (325) |
| 夜明砂..... | (326) |
| 虎骨.....  | (327) |
| 刺猬皮..... | (328) |
| 望月砂..... | (329) |
| 蛇虫.....  | (329) |
| 玳瑁.....  | (330) |
| 鹿角.....  | (331) |
| 鹿茸.....  | (331) |
| 海蛤.....  | (334) |
| 海馬.....  | (334) |
| 海浮石..... | (335) |
| 穿山甲..... | (336) |
| 馬宝.....  | (337) |
| 斑蝥.....  | (338) |
| 蚕砂.....  | (338) |
| 桑螵蛸..... | (339) |
| 羚羊角..... | (340) |
| 紫河車..... | (341) |
| 蛇蛻.....  | (342) |

|          |       |          |       |
|----------|-------|----------|-------|
| 蛤蚧.....  | (343) | 赭砂.....  | (368) |
| 蝉花.....  | (344) | 寒水石..... | (368) |
| 蝉蛻.....  | (345) | 鐘乳石..... | (369) |
| 熊胆.....  | (346) | 銀精石..... | (370) |
| 碎蛇.....  | (346) | 滑石.....  | (371) |
| 螻蛄.....  | (347) | 礪砂.....  | (371) |
| 鷄內金..... | (348) | 雄黃.....  | (372) |
| 蟾酥.....  | (349) | 輕粉.....  | (373) |
| 鱉蟾.....  | (350) | 銅綠.....  | (374) |
| 蕲蛇.....  | (351) | 磁石.....  | (374) |
| 麝香.....  | (351) | 綠矾.....  | (375) |
| 鼈甲.....  | (351) | 礞砂.....  | (376) |
|          |       | 鵝管石..... | (376) |
|          |       | 礞石.....  | (377) |

### 矿物类

|          |       |
|----------|-------|
| 天生黃..... | (355) |
| 水銀.....  | (355) |
| 石膏.....  | (356) |
| 代赭石..... | (357) |
| 无名異..... | (358) |
| 白石英..... | (358) |
| 玄精石..... | (359) |
| 自然銅..... | (359) |
| 阳起石..... | (360) |
| 芒硝.....  | (361) |
| 赤石脂..... | (362) |
| 余粮石..... | (363) |
| 炉甘石..... | (363) |
| 青盐.....  | (364) |
| 花蕊石..... | (365) |
| 金精石..... | (365) |
| 胆矾.....  | (366) |
| 砒石.....  | (366) |
| 紫石英..... | (367) |

### 其他类

|           |       |
|-----------|-------|
| 人中白.....  | (379) |
| 儿茶.....   | (379) |
| 干漆.....   | (380) |
| 五倍子.....  | (381) |
| 天竺黃.....  | (382) |
| 冬虫夏草..... | (383) |
| 石蟹.....   | (384) |
| 石燕.....   | (385) |
| 龙骨.....   | (385) |
| 百草霜.....  | (386) |
| 血竭.....   | (387) |
| 沒食子.....  | (387) |
| 阿魏.....   | (388) |
| 阿胶.....   | (389) |
| 沒药.....   | (390) |
| 昆布.....   | (391) |
| 蘆薈.....   | (392) |

## 根 类

### 山 药

〔概述〕重庆市銷售的山药，多由河南省运來，称淮山药，川产山药亦有供应，习称土山药。本品药用量較多，为中等药材。

来源与形态——本品系薯蓣科植物，多年生草本，以干燥块根供药用。根粗大，长可达3尺。茎細长，纏繞于他物上。叶对生，长心脏形，先端尖，基部有两耳，叶柄和茎都帶紫色。夏日，叶腋生单性花，排列呈穗状花序，白色，雌雄異株。

〔产地〕主产河南省新乡专区；四川省之簡阳、金堂、华阳、涪陵、合江、南川、温江、新都、雅安、宜宾等地。广西、湖北等省亦产。

〔产季〕冬至前后采集为宜。

〔产地加工〕土山药于立冬前挖出块根，用稻草擦去泥土，刮去外皮，立即用硫磺熏，熏后再洗，然后入炕，上盖席子，炕至半干，翻三次，架成十字形，完全炕干即成商品。

淮山药由于制法不同，又分为毛山药、光山药两种：

毛山药：取鮮山药用水泡2—3小时后，取出用竹刀刮去紅皮，放竹簍內用硫磺熏。150斤山药，用硫磺約1斤。熏后将山药置另一竹簍內放室內2天，晒1天，如此反复进行四、五次，晒干即成商品。

光山药：将毛山药放入水井內泡1天，浸至无干心为止。取出放簍內，加热燻12小时，使其綿軟，再晒1天，直到山药生白霜，又放簍內如上法用硫磺再熏一次（每簍用硫磺半斤），熏后放缸內擱两天（阴干），使干湿均匀，然后取出放梨木案板上，用梨木板搓平沟槽，此为头遍；晒2小时后重放缸內擱1天，取出再搓，同

时用刀将两端切齐，制成长短大小不同的规格，晒干即成商品。晒时若日光过强，应盖以布单，防止裂口。

〔性状鉴别〕土山药呈半圆形、长条形或长方形不等，未切开的形似白薯状。外表面为粉白色，粗糙，有黄棕色的表皮残痕存在；质松泡，断面亦为粉白色，用力捏之则起粉。气微，味淡微酸。

光山药呈圆柱形，条子粗细均匀，长4—7寸，粗可达1寸以上。外表光滑细腻；质坚硬结实，相碰时有清脆响声。

毛山药乃未经加工修整的光皮山药，外形不一，多为扁圆形略弯曲的柱状体。外表面为灰黄色或灰白色，质不坚实。

〔商品规格〕分光山药、毛山药和方山药（块块）三类。光山药按来货的原有等级出售。均以身干、无虫蛀及霉烂为优。

〔加工炮制〕将大个山药用清水浸泡2—4小时，取出置瓦缸中，使其润透，然后切成1分半厚的圆片，晒干。

〔效用〕健脾胃，理脾养肾。

〔贮存〕放干燥处，密封保存最好。受潮后发霉，皮色变黄，极易生虫。若发霉生虫，可日晒后用硫磺熏，又能使颜色变白。

## 山 慈 姑

〔别名〕地胆。

〔概述〕山慈姑重庆市在1956年前销售极少，不成庄口，1956年以后，中药材经营部门才开始销售，多由贵州省运来。本品在汉口称金果榄。药用很少，为小宗药材。云南省之山慈姑即光姑子，与本品不同。

来源与形态——本品系防己科植物，多年生常绿缠绕藤本，以干燥根供药用。根深长，块根黄色，形状不一。小枝圆形，细长粗糙有纵沟，节上被短硬毛。叶互生，具柄，叶片卵状披针形，先端渐尖

或鈍，基部通常尖銳，箭形或戟狀箭形，全緣，兩面被短硬毛，脈上尤多。初夏開單性花，雌雄異株，集成總狀花序。核果紅色，背部隆起，近頂端處有時具花柱的殘迹。

〔產地〕貴州省出產較多。四川南川、青川、雷波等地亦產。

〔產季〕9—10月。

〔產地加工〕秋季將根莖挖起，去淨泥土，曬干或炕干，即成商品。

〔性狀鑒別〕本品呈圓塊狀或長圓形，長0.5—2寸，粗細不一。表面凹凸不平，有皺紋和蒂痕，外表為黃色或黃褐色；質堅硬，破碎後內面白色。味極苦。

〔商品規格〕不分等級。以個大、身干、無虫蛀者為優。

〔加工炮制〕用水洗淨，取出悶潤至透，切片曬干。

〔效用〕解熱毒，疔瘡癢。為治瘡毒癰腫藥。

〔貯存〕放干燥處，防虫蛀。

## 山 豆 根

〔概述〕重慶市銷售的山豆根，由廣西省運來，又稱廣豆根。四川省所產之山豆根稱土豆根，重慶市不銷售。本品藥用量不多，為小宗藥材。

來源與形態——本品系防己科植物，多年生草質藤本，以干燥根莖供藥用。根莖長達3尺許，粗可達5分，表面黑色，彎曲，木質部作放射狀。莖葉及初芽有疏生長白毛，漸次脫落；葉互生，單葉，卵圓形至盾圓形，紙質，全緣，葉柄盾狀着生。花長疏狀排列呈總狀花序或聚傘花序，花梗單條，或分二至三條，腋生，下垂。果實為核果，紅色，稍圓形。

〔產地〕廣西省之百色、南寧等地。

〔產季〕7—8月採根。

〔产地加工〕去其苗茎根須，晒干即成商品。

〔性状鉴别〕本品为长圆柱形，长达1尺許，粗2—3分，商品中多成断节，少有分歧或带根头部分。全体呈暗褐色，有縱皺紋和扁圓形之斑痕及須根痕迹；質堅硬，不易折斷，断面粗糙，呈微黃色，中心有木質心，若用刀切斷，有蜡質樣之褐色圓圈。味極苦。

易与本品混淆者有下列三种：

一种是藤本植物之地下根：呈长圆柱形，长达数尺，粗約1分，附有須根。表皮褐色，易剝落，露出黃色縱沟（皮層纖維）；質韌不易折斷，兩手执兩端反復揉之，中心成粉，皮部纖維能条条分开；横切面有很小之白心，松泡，周围淡黃色，有放射狀之裂縫。味苦。本品系何种植物，尙待調查研究。

四川省巫溪县所产之土豆根：呈圓錐形，长0.5—1尺。外表呈淡紅褐色，有致密之縱紋，稍长有分歧和斑痕及須根痕迹；質堅脆，易折斷，断面粗糙，呈黃色，中部甚大，占断面五分之一。味苦，能使唾液染成黃色。

重庆市草药中之八爪金龙：本品常帶有莖一节，呈灰棕色。表面平坦；質堅脆，不易折斷，断面纖維狀，似木通樣，类白色；用刀横切，断面呈蜡質樣，中部有小白色心。其莖之下端常分多数支根，呈灰褐色，有細縱紋及須根或残留之痕迹；表面皮部横裂成节，中心露出不断。从裂紋处折斷，表面白色，皮部与中心脫离，中心黃色。味麻。

〔商品規格〕不分等級。以身干、条粗、均匀者为优。

〔加工炮制〕用清水泡約3小时，潤透去蘆，切成圓片，晒干备用。

〔效用〕止咽喉痛，退热，消肿。

〔貯存〕放干燥处，防潮湿及虫蛀。



## 大 戟

〔概述〕本品在全国使用的品种较为混乱。重庆习销的是由广西、云南两省运来的红芽大戟。药用量少，为小宗药材。

来源与形态——本品系大戟科植物，多年生草本，以干燥根供药用。体内含有白色乳汁，根细长，圆锥形。茎直立，圆柱形，上部分枝，表面被白色短柔毛。叶互生，几无柄，长圆形或披针形，全缘，表面绿色，背面灰绿色。春夏间开花，呈环状聚伞花序，通常五枝排成伞形，雌雄花均无花被，花序基部苞片近肾形。蒴果三棱状球形，表面具疣状凸起物。种子卵圆形，表面光滑，灰褐色。

〔产地〕吉林、辽宁、河北、安徽、广东、广西及云南等省均产。

〔产季〕春秋两季均可采挖。

〔产地加工〕将根挖起，去净苗茎泥沙，晒干或阴干，即成商品。

〔性状鉴别〕本品为扭曲不直的根，有少数分叉，长1—4寸，粗1—4分。外表暗红棕色，有明显的纵皱纹，易折断，断面不平坦，呈红棕色或红黄色，陈久者内部黑褐色。味微甜。

〔商品规格〕不分等级。以条粗、肥壮、无须根、少枯支者为优。

〔加工炮制〕用清水洗净泥沙，润透，切成长片。

醋炒：将大戟片置锅中微火炒热，倾入稀醋，经常翻动拌匀，焙干水气，取出晒干或烘干而成。每100斤大戟片用醋25斤。成品外面呈灰黑色，内现污红色的花纹，有醋味。

〔效用〕泻水，利尿。醋炒增加行水、解毒作用。过重有堕胎的危险。

〔贮存〕切片后晒干，装瓦罐中密封，防止受潮生霉。