



数理化自学丛书

物理

第一册

数理化自学丛书
物 理
(第一册——力学)

数理化自学丛书编委会
物理编写小组编

上海科学技术出版社

数理化自学丛书

物 理

(第一册——力学)

数理化自学丛书编委会

物理编写小组编

上海科学技术出版社出版

(上海瑞金二路450号)

北京出版社重印

北京市新华书店发行

北京印刷一厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 15 字数 331,000

1964年5月第1版 1979年1月第1次印刷

书 号：13119·570 定 价：0.98 元

重印说明

《数理化自学丛书》是一九六六年前出版的。计有《代数》四册，《平面几何》二册，《三角》一册，《立体几何》一册，《平面解析几何》一册；《物理》四册；《化学》四册。这套书的特点是：比较明白易懂，从讲清基本概念出发，循序前进，使读者易于接受和理解，并附有不少习题供练习用。这套书可以作为青年工人、知识青年和在职干部自学之用，也可供中等学校青年教师教学参考，出版以后，很受读者欢迎。但是在“四人帮”及其余党控制上海出版工作期间，这套书横被扣上所谓引导青年走白专道路的罪名，不准出版。

英明领袖华主席和党中央一举粉碎了祸国殃民的“四人帮”。我国社会主义革命和社会主义建设进入新的发展时期。党的第十一次全国代表大会号召全党、全军、全国各族人民高举毛主席的伟大旗帜，在英明领袖华主席和党中央领导下，为完成党的十一大提出的各项战斗任务，为在本世纪内把我国建设成为伟大的社会主义的现代化强国，争取对人类作出较大的贡献，努力奋斗。许多工农群众和干部，在党的十一大精神鼓舞下，决心紧跟英明领袖华主席和党中央，抓纲治国，大干快上，向科学技术现代化进军，为实现四个现代化作出贡献，他们来信要求重印《数理化自学丛书》。根据读者的要求，我们现在在原书基础上作一些必要的修改后，重新出版这套书，以应需要。

十多年来，科学技术的发展是很快的。本丛书介绍的虽仅是数理化方面的基础知识，但对于应予反映的科技新成就方面内容，是显得不够的。同时，由于本书是按读者自学的要求编写的，篇幅上就不免有些庞大，有些部分也显得有些烦琐。这些，要请读者在阅读时加以注意。

对本书的缺点，希望广大读者批评指出，以便修订时参考。

一九七八年一月

目 录

重印说明

第一 章 基本量度 1

§ 1·1 长度的量度	2
§ 1·2 面积的量度	5
§ 1·3 体积的量度	7
§ 1·4 重量的量度	10
§ 1·5 时间的量度	14
§ 1·6 物质的比重	15
本章提要	20
复习题一	22

第二 章 固体的一些性质 24

§ 2·1 物体的三态	24
§ 2·2 力	24
§ 2·3 固体的弹性和范性	27
§ 2·4 压强	32
本章提要	35
复习题二	36

第三 章 液体和气体的一些性质 38

§ 3·1 液体和气体对压强的传递,水压机	38
§ 3·2 液体的压强	42
§ 3·3 连通器及其应用	52
§ 3·4 大气压强	57
§ 3·5 气压计	59
§ 3·6 抽气机,打气筒和抽水机	61

§ 3·7 阿基米德定律

§ 3·8 物体浮沉原理	67
本章提要	72
复习题三	73

第四 章 匀速直线运动 75

§ 4·1 机械运动	75
§ 4·2 质点的运动	77
§ 4·3 路程和位移	80
§ 4·4 匀速直线运动	82
§ 4·5 匀速直线运动的速度图线和路程图线	87
§ 4·6 运动的合成	95
§ 4·7 速度的合成和分解	100
本章提要	105
复习题四	107

第五 章 变速直线运动 109

§ 5·1 变速直线运动的平均速度和即时速度	109
§ 5·2 匀变速直线运动——加速度	114
§ 5·3 匀变速直线运动的速度和路程	118
§ 5·4 匀加速直线运动的速度图线	125
§ 5·5 自由落体运动	132
§ 5·6 竖直上抛运动	136
本章提要	140

复习题五	142	§ 9·2 有固定转轴的物体的平衡条件, 力矩	229
第六章 牛顿第一运动定律		§ 9·3 物体在平行力作用下的平衡条件	236
.....	144	§ 9·4 物体在一般平面力作用下的平衡条件	240
§ 6·1 牛顿第一运动定律	144	§ 9·5 平行力的合成	243
§ 6·2 力	147	§ 9·6 重心	248
§ 6·3 重力, 弹力, 摩擦力	147	§ 9·7 物体平衡的种类, 稳度	255
§ 6·4 力的合成	155	本章提要	260
§ 6·5 力的分解	159	复习题九	261
本章提要	165		
复习题六	167		
第七章 牛顿第二运动定律			
.....	169		
§ 7·1 牛顿第二运动定律	169	第十章 机械能	263
§ 7·2 质量和重量, 密度和比重	174	§ 10·1 功	263
§ 7·3 力学单位制	179	§ 10·2 功率	269
本章提要	185	§ 10·3 能, 动能	272
复习题七	187	§ 10·4 重力势能	276
第八章 牛顿第三运动定律		§ 10·5 机械能守恒定律	280
.....	189	§ 10·6 功能原理, 能的转变和能量守恒定律	284
§ 8·1 牛顿第三运动定律	189	本章提要	292
§ 8·2 牛顿定律的适用范围	202	复习题十	293
§ 8·3 动量和冲量, 动量定理	203		
§ 8·4 动量守恒定律, 反冲运动	208		
本章提要	213	第十一章 简单机械	295
复习题八	217	§ 11·1 机械的功的原理	295
第九章 物体的平衡	219	§ 11·2 机械效率和机械利益	298
§ 9·1 物体在共点力作用下的平衡条件	220	§ 11·3 杠杆	300
		§ 11·4 滑轮和轮轴	306
		§ 11·5 斜面	315
		§ 11·6 螺旋	317
		本章提要	322
		复习题十一	323
		第十二章 曲线运动, 转动	324

§ 12·1 物体作曲线运动的条件,速度的方向	324	§ 14·6 飞机的举力	392
§ 12·2 平抛物体的运动	326	本章提要	395
§ 12·3 斜抛物体的运动	332	复习题十四	395
§ 12·4 匀速圆周运动	341	第十五章 振动和波	396
§ 12·5 向心力和向心加速度	343	§ 15·1 简谐振动	396
§ 12·6 向心力和离心力	347	§ 15·2 振动的振幅、周期和频率	400
§ 12·7 离心机械	354	§ 15·3 振动的图线	401
§ 12·8 固体的转动	357	§ 15·4 单摆的振动	403
§ 12·9 皮带传动和齿轮传动	360	§ 15·5 单摆的振动定律	406
本章提要	365	§ 15·6 阻尼振动	409
复习题十二	367	§ 15·7 受迫振动,共振	411
第十三章 万有引力定律	368	§ 15·8 振动在物体中的传播	415
§ 13·1 行星的运动	368	§ 15·9 横波	417
§ 13·2 万有引力定律	369	§ 15·10 纵波	422
§ 13·3 地球上物体重量的变化	374	§ 15·11 波长,频率和波速的关系	426
§ 13·4 人造卫星,第一宇宙速度	376	本章提要	428
本章提要	377	复习题十五	429
复习题十三	378	第十六章 声学	431
第十四章 流体力学	379	§ 16·1 声音的发生和传播	431
§ 14·1 稳流,连续原理	379	§ 16·2 乐音的特性	434
§ 14·2 流线	383	§ 16·3 声波的反射	440
§ 14·3 流动流体里的压强	385	§ 16·4 声音的共鸣,共鸣器	442
§ 14·4 液流和气流的空吸作用	387	§ 16·5 超声波	443
§ 14·5 物体在流体中运动时所受的阻力,流线体	391	本章提要	445
		复习题十六	446
		总复习题	447
		习题答案	460

第一章 基本量度

本章要讲的基本量度包括长度、面积、体积、重量和时间的量度。在日常生活中，我们常常要进行各种量度。无论制造什么东西，例如木箱、书架、机械模型等，都要进行量度。读者可能要问：学物理为什么一开始要学量度？这是因为物理学是研究自然现象的科学，要研究自然现象首先要观察自然现象，要观察就得用各式各样的仪器来测量，也就是要进行各式各样的量度。

不论量度什么，都必须有一个标准。例如你要知道你的身长多少，就得用一根尺来量，而尺上的刻度是按照一定的标准长度刻好的。你要知道你的体重多少，就得用秤来称，而秤上的刻度，也是按照规定的标准重量刻好的。所以每一个物理学中的量都有一个规定的标准，叫做这个物理量的标准单位。量度就是把一个要测定的量跟标准单位进行比较，看它是标准单位的多少倍。例如你的身长是 1.7 米，也就是长度标准单位 1 米的 1.7 倍。你的体重是 60 公斤，也就是重量标准单位 1 公斤的 60 倍。

量度的结果必须写明单位。如果你量一个物体的长度只写 30，那么谁能知道它究竟是 30 丈、30 尺还是 30 寸呢？所以一个量度的结果，不能只写数值，而必须写明单位才有实际意义。

量度必须精确。好比裁缝做衣服，尺寸量得不准，做出来的衣服必然不合身。又好比在生产上，机器内部的许多零件

如齿轮、螺旋等，因为尺寸量不准而做得稍大了一些或者小了一些，就不能把机器装配起来。

研究物理学的人，不仅要懂得量度的道理，还要学会量度的技术，否则他就不能准确地了解自然现象。

§ 1·1 长度的量度

1. 长度的单位 国际通用的长度标准单位是1米。怎样的长度才是1米呢？国际上最初规定是：

以通过法国巴黎的地球子午线，从赤道到北极的距离的一千万分之一，作为1米。为便于实际应用，后来又用90%铂和10%铱的合金制成一根标准米尺，保存在巴黎的国际度量衡局里面，称为国际米原器（图1·1）^①。米原器的横截面作X形，在它的凹沟里靠近两端的地方各划一条横线，与棒长垂直。规定在摄氏温度零度时，这两条横线之间的距离为1米。现在我们日常用的米尺（即公尺），就是以这个原器作为标准的。

图1·1 国际米原器

以米为长度标准单位的计量制度，称为公制或米制，公制是国际通用的计量制度。公制中常用的其他长度单位有：

$$1 \text{ 公里(千米)} = 1000 \text{ 米(公尺)}; 1 \text{ 米(公尺)} = 10 \text{ 分米};$$

$$1 \text{ 分米} = 10 \text{ 厘米}; 1 \text{ 厘米} = 10 \text{ 毫米}; 1 \text{ 毫米} = 1000 \text{ 微米}.$$

^① 1971年国际计量局规定的世界通用长度单位米的定义如下：米，是氯³⁸原子的 $2P_{1/2}$ 和 $5d_5$ 能级之间跃迁的辐射在真空中波长的1650763.73倍，单位符号为m。

在日常生活中，我们也常常用市制^①，即用 1 市里、1 市丈、1 市尺、1 市寸、1 市分等长度单位。这里：1 市里 = 150 市丈；1 市丈 = 10 市尺；1 市尺 = 10 市寸；1 市寸 = 10 市分。它和米制的基本关系是：

$$1 \text{ 市尺} = \frac{1}{3} \text{ 米} \text{，或 } 1 \text{ 米} = 3 \text{ 市尺}.$$

在习惯用法中，往往把“市”字略去，如把“1 市尺”叫做“1 尺”。

2. 测量长度的基本工具 测量长度的工具很多，其中直尺是最常用的一种。

直尺又叫做刻度尺，为着携带方便起见，可将它做成各种不同的形式，如折尺和卷尺等（图 1·2）。它们的刻度单位和用法都是相同的。

用刻度尺测量物体的长度时，先要使尺上的某一刻度跟




图 1·2 折尺和卷尺

① 市制是以公制为基础结合我国民间习用名称而制定的计量制度。在 1959 年 6 月国务院公布确定以公制作为我国基本计量制度的同时，规定仍旧保留市制。两种制度中的主要单位，有着“一”、“二”、“三”的简单关系，即 1 公升 = 1 市升；1 公斤 = 2 市斤；1 公尺 = 3 市尺。




图 1·3 用刻度尺测量物体的长度
厘米. 这样, 这个物体的长度就是 $13.9\text{ 厘米} - 10.0\text{ 厘米} = 3.9\text{ 厘米.}$

一般刻度尺的最小刻度是 1 毫米, 如果要测量到十分之几毫米, 那么就只能根据肉眼观察来估计.

下面是两种经常出现的错误的测量方法, 读者必须注意. 图 1·4 表示尺放斜了, 图 1·5 的左面表示读左边一

被测量的物体的一端对齐, 如图 1·3 中的 10.0 厘米, 再读出跟物体另一端相符合的刻度, 如图 1·3 中的 13.9




图 1·4 尺放斜了





图 1·5

端的刻度时眼睛的位置放得对，右面表示眼睛的位置放得不对。

习题 1·1

1. 假使我说：我们这本物理书长 20.0，宽 13.6，你以为怎样？你能说我身长 1.54 吗？为什么这两种说法都不对？缺了一些什么？
2. 量一量你常见的东西的长度，例如：你的手指、手臂、铅笔、橡皮、刀片，……。你能否用你的手来表示 1 厘米和 1 米大约为多少长？
3. 附图所示是测量铜丝直径的一种方法，你能否估计一下图中铜丝的直径等于多少厘米？
4. 用和上题相同的方法，你是否可以测量五分铝币的直径和厚度？



(第 3 题)

§ 1·2 面积的量度

测量物体的面积是以测量它的长度为基础的。我们规定边长为 1 米的正方形面积作为面积的标准单位，叫做 1 米²（读做 1 平方米，其余都类推）。在米制中，面积的单位还有：

$$1 \text{ 厘米}^2 = 100 \text{ 毫米}^2; 1 \text{ 分米}^2 = 100 \text{ 厘米}^2;$$

$$1 \text{ 米}^2 = 100 \text{ 分米}^2.$$

有规则形状的面积，可以按照求面积的公式计算出来。例如，长方形的面积 = 长 × 宽，三角形的面积 = $\frac{1}{2}$ 底 × 高，圆的面积 = $\pi \times \text{半径}^2$ 。所以你如果要知道书桌的面积，可以先量

出桌子的长度和宽度，然后把测得的两个数值相乘，就得到面积的大小。在实际计算时，长度和宽度只能用同一种长度单位。如果你用的长度单位是1米，那么宽度的单位也应该用1米，于是得到的面积就是 1米^2 ；如果你用的长度单位是1厘米，那么宽度的单位也应该用1厘米，于是得到的面积就是 1厘米^2 ，这一点千万不可弄错。

对于不规则形状的面积，一般是这样来测量的：把图形放在方格纸上，描下要测量的面积的轮廓（图1·6）。数一下图形里面所包括的小方格的数目，对于图形边缘上不满一小格的各部分，采用大于半小格的和小于半小格的凑作一小格计算。把小方格的总的数目乘上每一小格的面积，就是所要求的面积了。




图1·6 不规则面积的计算

习题 1·2

1. 用尺测量这本书的面积。假使我说这本书的面积是215.4，你看这种讲法对不对？还缺少些什么没有讲？
2. 在小方格子上描出你的手的轮廓，计算它的面积。
3. 先估计一下你家里的床、桌子等的面积，然后用尺进行测量，计算出它们的实际面积，看一看估计与计算的结果差多少。要做到对 1米^2 、 1厘米^2 这种面积的大小心中有数。

§ 1·3 体积的量度

体积的单位也是从长度单位导出来的。和面积一样，它是以边长为1米的正立方体作为体积的标准单位，叫做 1米^3 （读做1立方米，其余都类推）。在米制中，体积的单位还有：

$$1\text{厘米}^3 = 1000\text{毫米}^3;$$

$$1\text{分米}^3 = 1000\text{厘米}^3;$$

$$1\text{米}^3 = 1000\text{分米}^3.$$

有规则形状的体积可以按照求体积的公式计算出来。例如，长方形的体积=长×宽×高，球的体积= $\frac{1}{6}\pi \times \text{直径}^3$ 。和前面面积的量度一样，在实际计算时要注意长度、宽度和高度只能用同一种长度单位。

对于不规则形状的固体体积的测定，要用液体和量筒来进行，下面我们就来讲一讲这种方法。

液体没有一定的形状，要测量液体的体积，必须把液体倒在带有刻度的容器里，这种容器叫做量筒或量杯（图1·7）。筒壁或杯壁上带有刻度，标明立方厘米的数目。

容器的容量单位通常用1升来表示， $1\text{升} = 1\text{分米}^3 = 1000$




图 1·7 量筒和量杯

厘米³.

把液体倒入量筒或量杯里，看它升高到哪个刻度，也就是要看液面和容器壁上哪个刻度相符合，这样，就可以读出液体的体积。不过读的时候眼睛必须跟液面水平对齐（图1·8），否则要发生错误。

形状不规则的固体的体积，只要它比水（或某种液体）重，并且不吸收水（或某种液体）也不溶解于水（或某种液体），就可以用量筒或量杯来测量。如果物体不太大，可以直接把它放在量筒或量杯里。如图1·9那样，先在量筒里面放一些水（假定我们用水，而不用其他液体），记下水面所在的刻度，然后把物体放入，并使它完全浸没在水中；这时水面升高了，再




图1·8 用量筒测定液体体积时，
眼睛要跟液面对齐




图1·9 量度不规则固体的体积

记下这个刻度。这样，两次读数的相差，就是这个固体的体积。

如果物体比较大，量筒里放不下，可以用一只较大的旁边附有小开管的溢杯(图 1·10)。量度时，先在杯子里面放一些水，水面要刚好在小开管的下面(也就是再多放一点水就要从小开管中流出来)。然后把物体放入溢杯里，并使它完全浸没在水中，这时水就要从小开管流到旁边的量杯中去。流入量杯里的水的体积，就是这个固体的体积。




图 1·10 量度较大固体的体积

习题 1·3

1. 用厚纸来做一个体积为 1 立方厘米的正立方体。
2. 估计一下你用的书、桌面等的体积，然后测量它们的长、宽和

厚，计算出它们的体积，看一看估计与计算的结果差多少？

3. 根据图 1·7，说明量筒和量杯的刻度有什么不同？为什么有这些不同？

4. 你能想出一种方法求出你经常所看到的一些东西如玻璃杯、小刀、橡皮等的体积吗？

5. 问 47,896 厘米³ 等于多少毫米³ 和多少米³？4.8 米³ 等于多少厘米³？

§ 1·4 重量的量度

任何一个物体都有重量，这是大家都知道的。但是重量究竟是什么呢？让我们来看一看下面这些现象。

踢一个皮球，不论踢得多么高，结果总是要落下来；手里拿着一块石头，一放手，石头也要落下来。一切物体，如果没有东西支持它，结果都要向下落。

用手托住物体，我们感觉到物体压在手上的力。提一桶水，手就感觉到水桶向下拉的力。提半桶水比提一桶水感觉到水桶向下拉的力要小一些。

所有这些现象都是由于地球对物体有吸引作用而引起的。由于一切物体都受到地球的吸引，所以它们都有重量。物体的重量是由于地球对它的吸引而产生的。

如果用绳子把物体悬挂起来，那么，由于物体有重量，就要把绳子拉紧，跟我们用手的力量把绳子拉紧一样（图 1·11）。如果把物体放在薄木板上，物体就把木板压弯，跟我们用手的力量把木板压弯一样（图 1·12）。这些现象表明，重量实际上是一种力。因此，在物理学中，又常常把重量叫做重力。重力（重量）的大小等于物体拉紧悬挂物体的绳子的力，或者压在