

外科證治全生集



清 王維德著

外科證治全生集

人民衛生出版社影印

外科證治全生集

開本：850×1168/32

印張：1 $\frac{1}{2}$

清 王 維 德 著

人 民 衛 生 出 版 社 影 印

(北京書刊出版業營業許可證出字第〇四六號)

· 北京崇文區錢子胡同三十六號 ·

北京市印刷四廠印刷·新華書店發行

統一書號：14048·1007

1956年10月第1版—第1次印刷

定 價：0.24 元

(北京版) 印數：1—10,000

內容簡介

本書為清代王維德（洪緒）所著，原書刊行於乾隆五年（公元一七四〇年），是一本中醫外科治療學。

本書分「論証」、「治法」、「醫方」、「雜証」、「制葯」、「醫案」六部分。第一部分「論証」，就是辨明急性化膿性感染與慢性膿瘍的區別，並一反過去有些醫書以膿腫所生部位作為診斷病情輕重的說法，而強調膿腫的大小、形色，以及全身症狀在鑑別診斷上的重要性。第二部分「治法」，是論述各種膿腫的治療原則，和幾種惡化症候的治療方法。第三部分「醫方」和第四部分「雜証」中所載的處方，如「枯痔散」的治療痔瘡，「冷哮丸」的治療慢性支氣管炎，直到現在臨床上仍認為有很高的療效。第五部分「制葯」，除了詳論各種外科應用葯的制法外，還簡要地說明它的用途，特別是對於消炎、殺菌、腐蝕、鎮痛等葯物。第六部分「醫案」，是作者四十多年來的實驗記錄，其中有不少是典型的病例，可供我們進一步的研究。總的說來，本書的特點，是以介紹實際經驗為主，故對中西醫研究中醫外科療法很有參考價值。

自序

明劉誠意伯言。藥不對證。枉死者多。余曾祖若谷公秘集云。癰疽無一死證。而諸書所載。患生何處。病屬何經。故治乳品而用羚羊犀角。治橫痃而用生地防己。治癰癤惡核而用夏枯連翹。概不論陰虛陽實。唯憑經竝治。以致乳品橫痃成功。不救癰癤惡核。潰久成怯。全不悔憑經之誤。夫紅癰乃陽實之證。氣血熱而毒滯。白疽乃陰虛之證。氣血寒而毒凝。二者以開腠裏為要。腠裏一開。紅癰毒平痛止。白疽寒化血行。彼憑經而失證治者。初以為藥之對經而實背證也。世之患陰疽而斃命者。豈乏人乎。如以陰虛陽實分別治之。癰疽斷無死證矣。余曾祖留心此道。以臨危救活之方。大患初起立消之藥。一一筆之於書。為傳家珍寶。余幼讀之。與世諸書治法迥別。歷證四十餘年。百治百靈。從無一失。因思癰疽憑經竝治。久徧天下。分別陰陽兩治。唯余一家。特以祖遺之秘。自己臨證。竝藥到病癒之方。精製藥石之法。和盤托出。盡登是集。竝序而梓之。以質諸世之留心救人者。依方修合。依法法製。依證用藥。庶免枉死。使天下後世知癰疽果無死證云爾。乾隆五年歲在庚申仲春朔日。林屋王維德洪緒氏書。

凡例

一癰與疽之治。截然兩途。世人以癰疽連呼竝治。夫癰疽二字之連呼。即夫妻二字之連呼也。若以癰藥治疽。猶以安胎之藥服其夫矣。是集以癰疽分別兩治。皆執證執方之治法。如照法法製。照證用藥。救人之功。余不敢分。害人之罪。余當獨認情願。萬劫披毛。甘受屠家誅戮。

一輯是集專論陰虛陽實。認定初起紅白兩色。是癰是疽。治即全瘳。所載諸方。皆藥到病癒。切勿增減。逐證治法。開卷了然。不必投師。人人可精此道。

一諸書惟馬氏錦囊內附陰疽論。與余家遺秘相符。獨無消疽之方。惟有溫補兼托為法。且疽初起如即平塌。安可用托。托則成功。余家之治。以消為貴。以托為畏。即流注癰癤惡核。儘有潰者。仍不敢托。托則潰者雖斂。增出者又如何耶。故以消為貴。一醫可寄生死。閱坊刻外科。妄稱正宗。載云。證現七惡。即死。又載以桐油燒紅衣鍼。鍼入瘻塊半寸。用降藥為條。插入鍼孔。七日塊自開裂。再以條插七日。其核自落。又稱毒在皮裏。肉內。刀割深要寸許。方能洩毒。殊不知毒在皮裏。膿外。或應開刀。向忌深過三分。恐傷內膜。若深入寸許。傷透內腑。病人何能堪此。極刑七惡之現。頃刻世之宗其法者。盡屬創徒。此集唯斥用刺。此外科不輕用刀鍼。竝禁用升降二丹。令人痛癢。一足書無論背項腰腹。色白者。言疽。以疽藥療之。紅腫者。言癰。以癰藥療之。坊刻書稱以某藥與服。不應再易某藥。豈非以人試藥乎。儒生要緊穴道。安可遺醫。幾試望高明詳之。一世無爛久之癰。唯疽初起失消。或遺降灸鍼。割以致年久不

敘治之方詳載集中。

一外科藥證外另有雜證五十方。俱一服即效者。附梓集中。並無以人試藥之誤。望有力者。照方合就。遇病施送。如鈔方傳人。註明製法。

一此集所到之處。見信者自然藥至病除。更願處處翻刻。遍海內。使瘡毒無枉死之人。余願始遂。余年七十有二矣。治病歷四十餘年。用藥從無一誤。或疑藥味香散猛烈。畏而不服。則是養癰貽患。非余之咎也。

王洪緒先生外科證治全生目錄

論證

癰疽總論

治法

爛潰不斂治法

毒氣攻心治法

石疽治法

疔毒治法

走黃治法

楊梅結毒治法

漆瘡治法

凍瘡治法

上部治法

瘰癧頭及髮疽治法

蠟聚瘡治法

喉痹治法

喉癰治法

纏喉風治法

瘰癧治法

走馬牙疳治法

天蛇頭治法

中部治法

井泉疽治法

乳呂治法

陰疽論名

部位論名

患孔毒根治法

癰癧治法

惡核治法

紅絲疔治法

諸瘡治法

疽毒治法

火珠治法

禁用干槌膏鯽魚膏

湯火治法

蛙髮癰治法

咽喉治法

乳蛾治法

鎖喉治法

骨槽風治法

耳後銳毒治法

鵝爪風治法

脫骨疽治法

發背治法

乳癰治法

乳癰治法

下部治法

橫痃治法

子癰治法

鶴膝風治法

膿瘡治法

流火治法

醫方

陽和湯

犀黃丸

觀音救苦丹

回疔散

聖靈丹

蟾蛛丸

勝金散

咬頭膏

山蓮散

推車散

合掌散

金銀散

金霜散

退管方

洞天鮮草膏

白花膏

聾耳散

小腸疽治法

囊脫治法

貼骨疽治法

驢眼治法

陽和丸

小金丹

洞天救苦丹

拔疔散

三黃丸

梅花點舌丹

五音錠

代刀散

象皮散

五寶散

二美散

神仙棗

平安餅

消管丸

白玉夾紙膏

紫微膏

消管方

懸癰治法

痔漏治法

魚肚癰治法

牛程癰治法

醒消丸

子龍丸

大棗丸

奪命湯

五通丸

紫金錠

一筆消

紫藥

六和散

拔毒散

五美散

紅棗丸

枯痔藥

陽和解癰膏

化核膏

麝蘇膏

癰酒方

鮮角膏

眞珠散

南星散

固齒散

小兒口疳方

千金內托散

又保元湯

六味地黃湯

雜證

調經種子方

祛風逐溼散

瘰癧聚

瘰癧證方

癰血頭痛如裂方

箭風痛方

疳膨食積方

赤眼淹睛方

夢遺方

天絲入目方

冷哮方

翻胃初起方

大麻風方

小兒蟲證方

啞驚丹方

喉證方

赤霜散

骨鯁方

取齒丹

口舌藥方

二陳湯

加味四物湯

龍膽瀉肝湯

求嗣得嗣法

化痞膏

黃疸立效方

吐血立瘳方

偏身癱瘓方

雷頭風方

又方

胃脘痛方

白濁方

塵屑入目方

腸紅方

烏沙瘰方

狗咬方

夜啼兒方

小兒目疾方

壁錢散

又方

刺散凡又名過街笑

舌上出血或鼻衄方

楊梅瘡敷藥

四物保元湯

十全大補湯

敗毒湯

黎洞丸

三日大瘡方

紅白痢及麻息痢方

痰中有血方

手足骨節癱痛方

偏正頭風方

閃頸促腰方

又方

欬嗽神效方

跌打骨斷方

胃寒嘔吐黃水方

水瀉立瘳方

小兒冷疳方

砂雪丸

又方

小便閉方

製藥

銅青

蜜陀僧

水銀

雄黃

元精石

硫黃

伏龍肝

人參

知母

元澁

白芨

黃芩

柴胡

藕活羌活

延胡索

貝母

細辛

白芷

丹皮

縮砂仁

澤蘭

紫蘇

老年便燥方

鉛粉

鐵鑄

經粉

滑石

寒水石

白礬

甘草

沙藺

白朮

地榆

三七

秦艽

前胡

升麻

紅花

茅根

當歸

白芍

木香

香附

荊芥

白甘菊

小兒浮腫方

黃丹

丹砂

銀朱

礞石

礞砂

綠礬

黃芪

桔梗

蒼朮

丹蘂

黃連

天麻

防風

苦蘗

水紅花子

龍膽草

芎藭

赤芍

高良薑

藿香

薄荷

陳艾

茵陳

牛蒡子

益母草

地黃

淡竹葉

馬鞭草

大黃

甘遂

川附子

半夏

黑白牽牛仁

天葵子

木通

藤黃

仙人對坐草

麥冬

小黑豆

紅菊

蒲公英

松子仁

橙子

山楂

吳茱萸

芡實

青蒿

續斷

麻黃

芋藤

葛葵

連翹

商陸

蒺藜子

川烏

蚤休

番木鱧

土茯苓

防己

澤瀉

穀芽

大麻仁

白豆豉

白芥子

紅棗

烏梅

陳皮

橄欖

甘蔗

山藥

夏枯草

蒼耳子

燈芯

麥蘗冬

葶藶子

紫花地丁

大戟

常山

草烏

五味子

天花粉

白朮

金銀花

海藻昆布

浮麥

薏苡仁

神麴

生薑

杏仁

楊梅

青皮

檳榔

蓮鬚

柏子仁

松香	肉桂	官桂
沉香	丁香	樟腦
白膠香	冰片	乳香
沒藥	血竭	阿魏
厚朴	金鈴子	杜仲
楝樹根	阜角刺	巴豆
桑白皮	柘樹	枳實枳殼
枸橘	山梔炭	荳蔻
白茯苓	赤茯苓	茯神
琥珀	天竹黃	蜂房
土蜂窠	五櫛子	蠶蠶
蜘蛛	蟬蛻	蠟子
推車蟲	癩團卽癩蝦蟆	蜈蚣
蚯蚓	蚯蚓糞	龍骨
穿山甲	蛇蛻	白花蛇
石首魚	朱鼈	牡蠣
眞珠	田蟲	雞裏金
白丁香	五靈脂	山羊血
山羊矢	線膠	皮脂卽烟膠
象皮	麝香	貓矢
鼠矢	頭髮	指甲
人中黃	人中白	
醫案	髮疽醫案	瘰癧醫案
喉證醫案		

痰核醫案	惡核醫案	乳品醫案
發背醫案	腰疽醫案	流注醫案
橫痃及楊梅瘡醫案		起肛醫案
疽毒醫案	囊脫醫案	陰腫醫案
湯傷醫案		

王洪緒先生外科證治全生

論證

癰疽總論

癰疽二毒由於心生。心主血而行氣。氣血凝滯而發毒。患盤踞徑寸者。紅腫稱癰。癰發六腑。若其形止數分。乃言小癰。按之陷而不即高。頂雖溫而不甚熱者。膿尚未成。按之隨指而起。頂已輾而熱甚者。膿已滿足。無膿宜消散。有膿當攻托。醒消一品立能消腫。止癢為癰之聖藥。白陷稱疽。疽發五臟。故疽根深而癰毒淺。根紅散漫者。氣虛不能拘血緊附也。紅活光潤者。氣血拘毒出外也。外紅裏黑者。毒滯於內也。紫黯不明者。氣血不充不能化毒成膿也。膿色濃厚者。氣血旺也。膿色清淡者。氣血衰也。未出膿前。癰有膿裏火毒之滯。疽有膿裏寒痰之凝。既出膿後。癰有熱毒未盡。宜托。疽有寒凝未解。宜溫。既患寒疽。酷暑仍宜溫。暖如生熱毒。嚴冬尤喜寒涼。然陰虛陽實之治。迥別古書未詳。因立其自備覽焉。諸疽白陷者。乃氣血虛寒凝滯所致。其初起毒陷陰分。非陽和通勝。何能解其寒凝。已潰而陰血乾枯。非滋陰溫暢。何能厚其膿漿。蓋氣以成形。血以華色。故諸疽平塌不能化毒者。陽和一轉。則陰分凝結之毒。自能化解。血虛不能化毒者。尤宜溫補排膿。故當潰膿毒氣未盡之時。通其腠裏之藥。仍不可緩。一容一縱。毒即逗遛。一逐一逐。毒即消散。開腠裏而不兼溫補。氣血虛寒。何以成膿。猶無米之炊也。滋補而不兼開腠。僅可補其虛弱。則寒凝之毒。何能覓路行消。且毒盛者。則反受其助。猶車粟以助盜糧矣。滋補不兼溫。則血凝氣滯。孰作醱膿之具。猶之造酒不暖。何以成漿。造飯無火。何以得熟。

世人但知一藥清火以解毒。殊不知毒即是寒。解寒而毒自化。清火而毒愈凝。然毒之化。必由膿膿之來。必由氣血氣血之化。必由溫也。豈可涼乎。況清涼之劑。僅可施於紅腫癰癤。若遇陰寒。陰穴之疽。溫補尚虞不暇。安可妄行清解。反傷胃氣。甚至陽和不振。難潰難消。毒攻內腑。可不畏歟。蓋脾胃有關生死。故首貴止痛。次宜健脾。痛止則惡氣自化。脾健則肌肉自生。陽和轉盛。紅潤肌生。當投補養氣血之劑。若犀角羚羊連翹等性寒之藥。咸當禁服。

陰疽論名

陰毒之證。皆皮色不異。然有腫與不腫者。有痛與不痛者。有堅鞭難移者。有柔輒如綿者。不可不為之辨。腫而不堅。痛而難忍者。流注也。腫而堅鞭微痛者。貼骨鶴膝橫痃骨槽等類也。不腫而痛。骨節麻木。手足不仁者。風溼也。堅鞭如核。初起不痛者。乳岩瘰癧也。不痛而堅。形大如拳者。惡核失榮馬刀也。不痛不堅。鞭而漸大者。癰癤也。不痛而堅。堅如金石。形大如升斗者。石疽也。此等症候。盡屬陰虛。無論平塌大小。毒發五臟。皆曰陰疽。如其初起。癰癤者。易消重按不痛而堅者。毒根深固。消之不易。治之之法。集有一定不易之方在焉。

部位論名

毒生頭頂。有髮疽之名。頸項有落頭。對口。腦疽之號。鴨卵因毒夾於腋中。魚肚緣患生於腿肚。失榮獨在項間。夾疽雙發喉側。夾棍原因。腳背潰有驢眼之稱。牛程毒匿。腳皮正有湧泉為號。腹癰指腹筋袋云。偏臭田鼠。大母指之爛名。扁擔怪。肩穴中之癰毒。鬚前疽。耳後發。腿曰腿癰。下稱跨馬。白謂冬瓜。手發背。腳

又疽。偷養老鼠。又號惡瘡。漏稱海底。指說蛇頭。甲謂甲疽。麻蓋。腫云。鶴膝。腎子癰。云子癰。馬刀癰。於腋上。骨槽風。於牙牀。并泉。疽。龜登。心口。貼骨。疽。毒。漏。環。跳。腎。尖。毒。則。曰。腎。疽。腎。上。癰。乃。云。臂。毒。諸。名。由。部。位。以。推。治。法。務。憑。紅。白。初。起。未。潰。當。觀。現。在。之。形。已。潰。久。須。問。初。起。之。色。初。起。色。紅。仍。施。癰。藥。初。發。色。白。當。用。疽。丹。奏。效。如。響。凡。大。癰。潰。後。世。人。多。投。其。灰。草。或。用。半。灰。半。生。殊。不。知。托。裏。散。內。用。人。糞。者。並。非。以。養。補。虛。不。過。以。養。助。其。採。其。托。毒。之。力。卻。無。補。毒。之。害。矣。其。止。補。氣。而。不。能。托。毒。矣。章。止。補。中。而。不。能。解。毒。癰。毒。氣。未。盡。誤。投。其。灰。草。或。用。保。元。十。全。等。湯。致。毒。反。得。補。助。毒。攻。內。腑。則。如。之。何。凡。遇。初。潰。大。癰。宜。止。其。痛。癰。患。則。毒。散。其。腫。亦。退。色。轉。紅。活。體。虛。年。老。者。投。養。其。草。皆。矣。也。如。體。旺。家。貧。者。無。養。亦。易。收。功。

治法

爛潰不斂治法

如爛潰不堪之患。以洞天救苦丹三服。每服三錢。陳酒送服。醉蓋取汗。隔兩日。又送一服。再隔兩日。再送一服。所空隔之兩日。以醒消。凡每日一服。服後毒水流盡。七日後再服醒消。凡兩次。接服大棗丸。每日早晚各進五錢。最危險者。可奏奇效。

患孔毒根治法

爛孔有惡肉突起。名曰毒根。往往有用降藥爛去者。此乃殺之欲速也。獨不知弱體豈可增痛。况爛去仍又長出。安可再爛耶。唯平安餅專貼毒根外。以陽和解凝膏貼掩。一日一易。輕者二三日重者六七日不癢不癰。毒根自落。貼餅時。日服托毒散。俟毒根落後。當服保元四物二湯收功。

翻花起肛治法

年久不斂。定翻花起肛。堅韌。取老蟾破腹連肚雜。以蟾身刺數孔。蓋貼患口。輕者日易一次。重者日易兩次。貼蟾之日。日服醒消。凡止其癢痛。三日後毒盡。再服醒消。凡每服三錢。陳酒送服。消其翻花。轉其鞭肛。功效不凡也。如大患初潰者。亦如前法。毒從蟾孔而出。備肛口。便患孔深。取活牛蒡草根枝葉。或取紫花地丁嫩草。搗爛塗入肛內。皆拔毒平肛。牛蒡草即大力子草。俗呼氣殺醫生草。

毒氣攻心治法

凡受降藥毒。定致神昏嘔吐。此係毒氣攻心。急用護心散。綠豆粉一兩。乳香末五錢。燈芯炭三錢。研和生甘草一兩。煎濃汁。調末。令病者時刻呷嚙。嚙至大半。自然止嘔。神氣清爽。然後接服。

醒消凡以平其勢

癰癤治法

凡患色紅腫癰癤根盤寸餘者是癰發毒三四日尚未作膿以嫩膏圍外內以醒消凡熱陳酒送服三錢即止其痛夜間得睡次日患皮起皺再服全消如過四五日患將作膿亦以醒消凡與服消其四圍腫癰癰息毒散患平此以大變小之法有膿之患取咬頭膏貼加以代刀散三錢酒服穿之或以刀點分許穿之以洞天膏貼不幾日收功如患盤數寸者或居背心膈後腰腹肚腋陰囊等險之穴用五通凡醒消凡早晚以敗毒湯輪送一次皮皺癰息再服至癰癰潰即用托毒散醒消凡亦早晚輪服如患盤不滿一寸亦紅腫者是癰蟬蛭凡梅花點舌丹皆消腫止痛

陰疽治法

初起之形闊大平塌根盤散漫不腫不痛色不明亮此疽中最險之證儻誤服寒涼其色變如隔宿猪肝毒攻內腑神昏即死夫色之不明而散漫者乃氣血兩虛也患之不痛而平塌者毒痰凝結也治之之法非麻黃不能開其腠裏非肉桂炮薑不能解其凝結此三味酷暑不能缺一也癰裏一開凝結一解氣血能行行則凝結之毒隨消矣治疽之方悉列於後照方治無不癒如增減定無功效

石疽治法

此疽初起如蟻核漸大如拳急以陽和湯犀黃凡每日輪服可消如遲至大如升斗者仍如石癰不痛又日久患現紅筋則不治再久患生斑片自潰在即之證也潰即放血三日而斃如現

青筋者可治內服陽和湯外以活蔞陸根搗爛加食鹽少許敷塗數日作癰半月破皮日敷日換而有膿袋下以銀鍼穿之當用千金托裏散加熟地生芪各一兩煎湯煎藥服十劑後以陽和解毒膏貼滿患上空出鍼穿之眼使其外皮血活因皮膜中似成膿須用布捲膏外綁緊使皮膜相連內服大補保元等湯謹其忌食服至收功如其毒氣未盡忌投補劑

惡核治法

大者名惡核小者名痰核與石疽初起相同然其寒凝甚結毒根最深卻不易潰未潰之前忌貼涼膏忌服涼藥內服陽和凡犀黃凡可消亦有以大田麻搗爛敷塗消之者大忌開刀開則翻花起肛口用大蟾破腹刺數孔連雜蓋患拔毒輕肛內服溫補托毒消痰之劑犀黃凡儘可收功凡內有麝香孕婦忌服

流注治法

流注色白腫痛者是也毒發陰分蓋因痰塞情道氣血虛寒凝結一曰寒痰一曰氣毒其初起皮色不異唯腫唯癢雖身體發熱內未作膿以二陳湯加陽和凡同煎數服全消消後接服小金丹七凡杜其續發如皮色稍變極痛難忍者須服陽和湯以止其痛消其未成膿之毒氣使已成膿者至不痛而潰此乃以大疽變小之法如患頂便即為穿之膿多白色以陽和膏日貼但此症潰後定增毒痰流走患生不一故初潰之後五日內仍服小金丹十凡以杜後患接用犀黃凡陽和湯每日早晚輪服使毒痰消盡不補可必收功儻幼孩不能服煎劑者初起以小金丹化服至消乃止但成膿者亦日服以消其餘膿使患不痛口穿俟其毒氣去盡用保元湯其草宜生忌炙加入肉桂五分

日服收功如孕婦患之當問懷胎月數備未滿六箇月犀黃丸有麝香不可服用服防墮胎當以陽和湯療之瘡後再服三四劑以代小金丹杜其流走

疔毒治法

疔毒其毒最速生面目耳鼻之間顯而易見生肩足衣遮之處隱而不知知覺早者晨醫夕瘳遲者枉死甚多故婦女而患暗疔者誤認傷寒致毒攻心走黃不救如頭面脣鼻肩臂手足等處生一炮或紫紅或黃黑者疔也初起刺擠惡血見好血而止取拔疔散插入以膏掩之次日疔毒化膿而瘳

紅絲疔治法

手小臂足小腿生如紅線一條者名曰紅絲疔要在紅絲始末兩頭刺破毒隨血出而瘳遲則毒入腸胃不救凡屬疔毒宜服奪命湯

刀鐮疔治法

疔形闊如韭菜長有寸餘肉色紫黑者名曰刀鐮疔忌行鍼刺以生磐三錢慈白七根共搗爛作七塊慈湯逐塊送下蓋汗如無汗再飲慈湯催之汗出爲度取爛雞矢塗患立瘳遲至毒歸心肺致命

走黃治法

疔毒發腫神昏謂走黃如在將昏之間急取回疔散二錢白濁送服少刻大痛痛則許救毒化黃水痛止命活

諸瘡治法

夫瘡疥之生本由於溼故南方卑下之地患者最多諸書皆言溼熱所致方中皆用生地涼血未見瘡者或以熏燂爲法熏燂

雖瘡致毒歸腹定成瘡鼓凡患諸瘡宜戒沐浴則溼氣愈重難以速痊痊後再戒月餘庶免復發忌食雞羊蝦蟹一應發毒新鮮等物及房事其名有膿瘰癧疥癩風猴瘡瘡淫風頑癬疥瘡小兒疳肥瘡蠟梨火珠瘡瘰癧爛腿漆瘡諸證後列之方皆瘡諸證

瘡鼓治法

其證當以紅棗又治之備遇瘡鼓危甚不及待藥與服當覓大蟹四五隻約重斤餘令其白湯煮食飲酒蓋暖睡不兩時身上發瘡更甚於前而鼓全消仍以瘡治至瘡夫瘡鼓危證也至瘡則易瘳

楊梅結毒治法

楊梅瘡又謂結毒花廣豆廣瘡因形而名然其感毒無二以化毒爲貴奪命爲忌瘡定復發難治初發以三黃丸每日五鼓取四錢熱陳酒送服醉蓋取汗或以瀉肝湯每日早晚輪服昔書所載升藥爲丸雄黃爲衣粥飲送服或點藥條一根口含冷水之法萬不可因此不費藥資害人性命自召天誅如有因服升藥並藥條薰燂復發在五日之前日服三黃丸再取忍冬藤牛蒡草紫花地丁白甘藷煎湯當茶時飲如漬以渣煎湯日洗兩度接服聖靈丹可祛毒盡色轉紅活用桐天膏貼收功如下疳蠟燭笑等毒總不離此前治諸法儼瘰癧難忍以聖靈丹五分數服奏功如潰爛候毒退痛止色轉紅活當以藥撒生肌如陽物梗而不萎白精流出此乃加精用破故紙韭菜子各一兩爲末每服六錢水一椀煎半服如見瘡宜以藥刺儼毒重服聖靈丹無不全瘳

痘毒治法

幼孩出痘多服涼藥血寒氣滯乘流發毒故其色皆白。醫家每以痘後火毒治致流走患生不一久則生管成癰竝內生多骨害人不小應以流注法治以小金丹消之

赤遊治法

初生幼孩因胎中受毒腿上一患色紅腫成片身熱名曰赤遊遊者遊走也遊走偏身而死取哺退雞子內臭水拂上一二次全瘡或有幼孩口內生疳或額內生一紅塊名曰錢眼子皆胎毒也用生地五錢大黃一錢陳酒浸取出共搗爛塗兒足心男左女右用絹縛好乾即易瘡乃止洞天嫩膏塗亦效

漆瘡治法

取杉木屑煎湯溫洗接以蟹黃滑石二末白蜜調敷

火珠治法

用生蘿蔔搗爛好醋浸敷遲治妨命

湯火治法

地榆磨細香油浸敷破損者乾末撒敷潰爛不斂者取竈心土炭火燒紅水飛曬乾再加研細人乳調敷今之治坊浸油一缸以備不虞拂上立刻止痛多則二次全瘡乃湯火傷之聖藥也

凍瘡治法

以陽和解凝膏貼一夜可瘡潰者貼三張收功

禁用千捶膏鯽魚膏

凡患一切大小白色等痘忌用洞天膏貼嫩膏敷敷則寒凝愈結最忌用千捶膏鯽魚膏貼以此二膏內皆有巴豆麝麻肉貼則提拔成毒每見橫痃乳岩貼至致命孕婦貼則墮胎凡諸痘

潰後宜貼陽和解凝膏

上部治法

癰貢頭及髮疽治法

孩童頭髮內患白色腫塊初起多有認是跌腫至高大作癰方始延醫醫以頭爲首陽唯用寒涼解毒是以潰者內膿復生增出者不一殊未知此患色白乃陰寒虛弱之證用小金丹初起三服而消潰服七丸而瘡外貼陽和解凝膏大人患之名曰髮疽以陽和湯瘡之夏秋頭面生紅癰名曰石癰初起取洞天膏貼周時全消潰者貼之亦瘡用連翹花粉赤芍銀花甘草煎滑石澤瀉煎湯溫服即無熱毒之男婦逢酷暑宜服

蛀髮癰治法

取生木鼈片浸數日入鍋煮透取湯將髮髻去用湯洗洗後預備取活蜈蚣三條浸菜油內三四日以油揉頭至瘡乃止或取草烏切片炙脆研粉醋調日塗三次數日瘡

蠟梨瘡治法

取獨核肥早分開去核以洋餡填實餡內入巴豆仁每片兩粒半仍將肥早合好外用線紮鹽泥包因火燬存性去泥研極細末加入輕粉檳榔末各八分再加力研香油調膩鬚頭後煎滾灰湯溫洗洗後以藥敷敷後不用再洗日以藥敷至瘡乃止

頭面肥瘡治法

白明礬研粉取紙捲作長條打成結子幾十箇入菜油內浸透取鐵篩放油結子用火燒結內油仍滴於所侵處內燒至枯以諸結研粉加製松香末約一半共調油內日以拂瘡早晚兩度三五日瘡戒食豬肉蝦蟹等發毒之物並煎炒熱油食則延

開難療

咽喉治法

咽喉之地尤為急證。頃刻而痛難忍。實係寒生。宛轉而痛方瘳。乃為熱病。譬之雷電之火。倏因陰生。燎原之火。熾由漸著也。內經云。驟起非火。緩起非寒。虛寒實熱。識透者獲濟。是在明達之士。知所區別。乃隨所投而無誤耳。視證有訣。咽喉證有七形。若筋頭蛾。無蛾喉欲閉。鎖喉證亦異。纏喉熱結內。麻瘋腫繞外。日前氣短促。厥冷喉閉。喉痺。肝痰。肺結。須治快。喉癰因虛鬱。微作瘡。癰態不腫。又不閉。淹纏最作怪。喉懸一粒珠。刀點命。頃害藥從鼻裏吹。珠破病即退。

喉痺治法

癰者。不仁也。驟起也。危急之證。痰在喉中作響。響如打肝。舌色白而不腫。諸書皆稱肺絕不救。蓋緣誤服寒涼以致死耳。如服桂枝湯。立瘳。桂枝湯專治頃刻而起。前無毫恙者。此虛寒陰火之證。肉桂。炮薑。甘草。各五分。共歸碗內。取滾水衝入。仍將碗傾於滾水。掉藥口許。慢以嚥下。立瘳。或以生川附切片。塗白蠟。火炙透。墨收貯。臨用取如細糲一粒。口含嚥津。亦立刻全瘳。

喉閉治法

喉閉兩三日。前氣急短促。手足厥冷。忽然痰壅氣閉。命懸頃刻者。是利服蘇子前胡等藥。

乳蛾治法

其形圓如筋頭。生於咽喉關上者。輕。生於關下者。重。或左右有。無。日單左右皆有。日雙。雙者輕。單者重。以土荳藤絞汁。含口。漫

喉癰治法

體虛多鬱者。患之。喉中不閉不腫。氣出如常。微微癰癢。飲食不遂者。是此係虛火。淹纏難瘳。忌刺畏補。○冰片牛黃各一分。麝粉三倍。入雄精。白梅三枚。去其核。雄等研茶山豆根。七味藥粉。三錢。七人梅共搗作丸。噙為凡十箇。含十日。喉癰方中。獨此尊。虛火不宜補。與刺總然醫瘳不除根。

喉珠治法

係膈門生一紅線如髮。懸一黑塊大如櫻珠。挂至咽門。如用刀點即死。取土荳藤活根。搗汁。以好醋二三滴和勻。滴入鼻中。三四次。絲斷珠破。吐出瘀血。立效。

鎖喉治法

喉內無蛾形。痰聲不響。而喉欲閉者是。後有藥訣。

總喉風治法

喉內熱結。喉外腫繞。且癰且麻者是。○喉內之痰塞滿。舌有痰。護此痰不出。牙齒作響如鼾。唯喉喉痺。誤服涼藥。有此證也。如再遲。痰塞鼻內。氣無出入。即死。儻遇此危急之證。取鷲毛一根。黏釐許桐油。入喉一搵。痰隨油吐。以桂枝湯。湯之。如於道路無人店之處。藥未備在者。遇有喉證。取鍼刺其兩指少商穴。無藥即瘳。

牙癰辨治

可根肉紅腫痛甚者是。刺出毒血。取真珠散吹之。內服瀉肝湯。而瘳。牙骨及額內癰。痛不腫。不紅。痛連臉骨者是。骨槽風也。儻以瘳治。則害之矣。

骨槽風治法

患在頤內牙根形同貼骨疽者是初起往往有誤認牙癰多服生地石膏以致成功爛至牙根延爛咽喉不救當用二陳湯加陽和丸煎服或陽和湯消之儘遇潰者以陽和湯厚黃丸每日早晚輪服如有多骨以推車散吹入隔一夜其骨不痛自行退出吹至次日無骨退出以生肌散吹入內服保元湯加肉桂當歸苦藥生黃芪生甘草收功而止

癰癰治法

癰癰生於項間初起一小塊不覺癰癰在皮裏膜外漸大如桃核旁增不一皮色不異者以子龍丸每服三分淡薑湯每日送服三次至消乃止儘幼孩不善服丸取小金丹每日一丸用布包放石上隔布敲細入杯取冷陳酒三四匙浸化用銀物研臨臥以熱陳酒衝服醉蓋暖取汗服消乃止數年內忌食香橙食則復患凡癰癰內有潰爛開有成膿未潰者亦有未成膿者須服犀黃丸止其已潰之痛鬆其成膿未潰之痕消其未成膿之核已成膿者用咬頭膏膏之日服溫補祛痰通脈活血壯氣之劑外貼陽和解凝膏而瘡其癰癰延爛至肩胸脇下不堪之極者須用嗣天救苦丹三服犀黃丸六服服有規法在前服完九日後皮色變白孔內紅活接服大棗丸肌肉漸長用生肌散日敷收功又癰癰爛至咽喉如飲熱湯外邊熱痛者乃危險至極儘稍遲則爛穿咽喉不救急取柴心一根量本人中指量其三指其積一薪隨其長短男左女右就手之左右即在手下突出之骨正中骨頂之處定準一直量上盡頭以墨記取艾團連灸三壯膏掩可保咽喉不穿收功之法前已列明敷藥有訣陳左未成膿者灸則可消爛潰者可斂赤貧人用之○癰癰爛潰不

堪言爛至胸腰連耳肩荊芥根煎溫復洗瘡中紫塊莫鍼穿犀黃大散丸神效日服日洗日敷痊瘡樟腦脂黃等細粉麻油調歸肉新鮮

遮顙發顙治法

患生於顙有曰遮顙者有曰發顙者當宜別治顙內痠痛者遮顙也取燉背敷上次日全瘡儘病後兩顙發腫不作痠痛者乃是發顙宜服表風散毒之劑當用白芷天麻防風荊芥各一錢陳酒煎半碗送服醒消丸三錢自癒

耳後銳毒治法

患發耳後又名耳後發宜別陽實陰虛治無一錯患色白者以陽和丸與二陳湯同煎服或以小金丹服消色如紅者醒消丸服消諸書不拘紅白繫以元澄牛旁連翹歸尾赤芍銀花等七味治之色紅者尚服不消儘色白者服遭其害矣

走馬牙疳治法

用生香附生半夏等分爲末雞子白調作如餅貼男左女右湧泉穴一周時瘡如小兒口內生毒塊不能食乳俗名螻蛄子用生地酒浸搗爛塗男左女右腳心自癒

鵝掌風治法

鵝掌風患於手足掌指皮上癢而癢燥烈者是用麻油一兩紅硃一錢敲細如酒入油煎至硃枯煙絕爲度去硃甯油有風之處日以火烘油擦二三次至瘡止

鵝爪風治法

卽油灰指甲日取白鳳仙花搗塗指甲上下包好日易風仙過時灰甲換好

天蛇頭治法

患生指上形似蛇頭而名紅痛者取白蘿蔔一段挖孔入雄黃三分蒸半熟套指或取烏梅仁嚼爛塗指嫩膏塗之皆消如患色白小金丹服療

甲疽治法

凡指甲邊生一赤肉突出時常舉發者甲疽也用狼毒一兩黃芪二兩醋浸一宿入豬脂五兩微火上煎取二兩絞去渣退火氣以封疽口日易三度毒消口斂

脫骨疽治法

凡手足之無名指患色白而痛甚者脫骨疽也諸書載云急用鎚去其指可保其命遲則腫延手足之背救無術矣殊不知此亦疽也大人以陽和湯幼孩以小金丹最狠者以犀黃丸皆可消之色紅者以熱癰蛇頭等法治之

中部治法

井泉疽治法

此疽生於心口又名慢心銳毒初起若心口內有塊漸大心口發高毒陷即死此醫皆縮手之證諸書亦無藥治之法唯以本人兩手十指以線量其長短共積其線在喉管正中處雙環至背脊之中看兩線頭盡處為中穴又以本人中指之中一節用柴心量準作一寸中穴之左右各遠一寸各以墨記分立三穴如灸每穴用艾三大壯一齊火灸灸畢全瘳

肺疽治法

諸患易識獨肺中患毒難覺兩腳骨癢痛者或腳骨不痛而舌下生如細豆一粒者再心口之上內作微痛及欬嗽口乾咽燥

此皆肺中生毒之證也即用甘草桔梗各三錢煎服服下如聲稍安肺之患毒無疑矣以犀黃丸十服服完全瘳此是預識預治百無一死之法世人但知肺癰醫脚欬嗽醫嗽舌下一粒便以刀刺且此一粒患未成膿定色淡患癰亦消患篤其色紫黑如用刀刺立害諸書皆載云口吐血痰胸中發腥作痛者肺癰也又稱證有三不治時吐臭痰久如糞米飯者不治呃膿不止者不治白面變赤者不治唯呃而膿自出者易治治之之藥唯地黃保生歸脾等湯輪服而已並無預知早治之法直至吐血痰發服始知肺癰猶小舟飄入大洋也每見此證吐膿膿色皆白故稱肺疽用犀黃丸治無不效有亦貧者患之以陳年醃芥菜滴每晨取半杯滾豆腐漿衝服服則胸中一塊塞上塞下塞至數次方能吐出連吐惡膿日服至瘳凡患此證者終身戒食鴨卵白蘆紅蘿蔔石首魚著甲魚食則復發難生

發背治法

發背乃癰疽中大患緣其患位對心對肺對臍耳偏曰搭手用手可搭而名紅腫痛甚者應稱背癰治法已列治癰法內如患色白腫痛者當以流注法治如平塌不痛者當以陰疽法治此皆陰發背也如誤敷涼藥誤貼涼膏定毒攻內腑不救

乳鬚治法

初起乳中生一小塊不痛不癢證與瘰癧惡核相若是陰寒結聚此因哀哭憂愁患難驚恐所致其初起以犀黃丸每服三錢酒送十服全瘳或以陽和湯加土黃五錢煎服數日可消儻誤以膏貼藥敷定主日漸腫大內作一抽之痛已覺遲治儻皮色變異難以挽回勉以陽和湯日服或以犀黃丸日服或二藥每