

國二十四年五月

西昆蟲調查報告書第一號

柳江區
南寧區
蒼梧區

廣西農林局


編印



PDG



(研究室之一隅)



(黃草又名石斛)



(毒 魚 藤 種 子)



(毒 魚 藤 之 根 莖 葉 種 子)



(松毛蟲之幼蟲及蛹)



(粉虱爲害甘蔗之情形)



(被害損壞之柑橘及其害蟲)



(剝枝蟲剝下之穀粒『興業』)



(柑橘被綿介殼蟲爲害之情形)

少化性螟蟲

多化性螟蟲



浮塵子



稚蟲



♂

成蟲



♀

稻飛蟲




短翅成蟲



成蟲




卵



金 龜 子



成蟲




成蟲



幼蟲

布分蟲螟—虫害要主稻水

Map showing the distribution of the rice borer (Cnephora pluvialis) and the main rice pests (水稲主要害虫) across the Yangtze River basin. The map is divided into numerous administrative districts, each labeled with its name in Chinese characters. The Yangtze River is depicted as a prominent black line winding through the center of the map. Major cities and towns are marked with dots and labeled. The map is color-coded with yellow and green to indicate different regions or levels of pest infestation. The title '布分蟲螟—虫害要主稻水' is written vertically on the right side of the map.




金龜分子佈圖



甘肅亭上



松毛蟲分佈圖



水稻主要害蟲——標葱分佈圖

