

定審部教育

漢譯

溫德華士代數學

宣城屠坤華譯述
紹興壽孝天校訂
駱師曾校訂

上海商務印書館印行

溫德華士代數學

序 言

溫德華士代數(Elementary Algebra by G. A. Wentworth)

爲美國近出之名著。甚爲我國中學及中學以上各學校所歡迎。蓋其包羅甚富。迥異因陋就簡之模。排列適宜。深合先易後難之旨。爲理論透澈計。參列圖解。以期貫通。爲練習純熟計。採集問題。無不豐富。斯誠教科之善本。抑亦獨修所必需也。本館同人。有鑒於此。旣將原書校訂付印。又恐僅用歐文研究。無譯本以資參考。則於我國固有之術語。慣用之文例。或未諳悉。因復譯爲漢文。處處與歐文相符合。學者得此。則習歐文者。可以對照而會其通。即未習歐文者。亦可藉此以覘新世界學術之一斑焉。譯本旣竣。誌數言以告讀者。

溫德華士代數學

目 錄

節 數		第	一	章		頁 數
1-46	界說及符號	第	二	章	...	1-17
47-62	一次方程	第	三	章	...	18-31
63-91	正負二數	第	四	章	...	32-47
92-100	加法減法	第	五	章	...	48-58
101-114	乘法除法	第	六	章	...	59-77
115-126	特式法術	第	七	章	...	78-89
127-148	生數	第	八	章	...	90-117
149-163	公生及公倍	第	九	章	...	118-134
164-187	命分	第	十	章	...	135-159
188-198	命分方程	第	十一	章	...	160-187
199-214	同局一次方程	第	十二	章	...	188-205
215-216	同局一次方程問題	第	十三	章	...	206-221
217-226	圖解	222-231

目 錄

	第十四章		頁數
節數	無定一次方程	...	232-235
227-228	偏程	...	236-240
229-241	乘方及開方	...	241-260
242-273	指數之理	...	261-268
274-285	根式	...	269-284
286-308	幻數	...	285-292
309-324	二次方程	...	293-332
325-351	同局二次方程	...	333-353
352-360	比例, 同理	比例, 對數	354-373
361-403	級數	...	374-390
404-425	變數及極限	...	391-399
426-441	雜級數	...	400-408
442-448	對數	...	409-435
449-476	錯列法及排列法	...	436-441
477-488	二項例	...	442-451
489-502	雜例題	...	452-461

溫德華士代數學

第一章

界說及符號

1. 量。凡可增可減者。統謂之量。同類之量。可以比。


可度之量云者。謂其量可視為等分所成也。欲量可之量。必先擇一同類之量。為之標準。以觀所度之量。為準量之幾倍。

2. 箖位。凡測量大小與計算各物時。所用之準。謂之箖位。

例如計算某校學童。其箖位為一學童。若以打數賣。其箖位為一打蛋。千數計磚。其箖位為一千磚。至於表記法。則箖位為寸為尺。表遠記法。則箖位為杆為里。

3. 數。箖位重複。則以數目示之。

將箖位逐次相加。則成單箖位與衆箖位之式。如下足以表之。



凡此衆羣。代表一二三四五六七八九十諸數。此等

表之衆羣。不論所計者爲何種箇位。其意恆同。

4. 幾何。任何具名箇位之數。俱爲幾何。幾何分爲二部。一爲箇位之名。一爲幾何所有箇位之數。

注意。幾何恆謂之帶名數。因其於所計箇位。附以名而記其數也。若但以數目表示箇位之倍數。則不論爲真數爲代數。俱謂之獨立數。

例如四桶麵粉。意卽四倍一桶麵粉。如十棵木。卽十倍一棵木。

5. 代數學。代數與算術同。亦論數之學也。

6. 算術數號。算術所用數號。非如前列直集衆羣之號。係用通行符號 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 卽亞拉伯之數目字。讀爲一，二，三，四，五，六，七，八，九。其十之號。乃將 1 字變換位置。令之表十而不表一。變換其位置時。須另用一 0 號。0 之數號。或稱零數。乃表虛無之數者也。

表箇位之一。則置 1 於第一位。如數繼續增加。達至十箇。則自右而左。置 1 之數號於第二位。至百箇。則置 1 於第三位。至千箇。則置 1 於第四位。餘可類推。

7. 代數學之數號。代數學非獨用算術數號表數。且以字母中之字目代表。定值之數。爲其數之公號。是以某字值量。對於某該問題。通前澈後俱等。

8. 算術中表數之數號。謂之數。代數中表數之字號。亦謂之數。用字爲號。謂之字目。用數爲號。謂之數目。凡字目所表之數。爲字之值。亦如數目所表之數。爲數之值也。

9. 算術與代數共用之名稱。算術與代數共用之名稱。即如加法和數，減法，被減數，減數，差，等等。二者所用命意相同。雖或代數間之命意有時推擴。然與算術之意符合。

代數通用符號

10. 演算符號。代數學通常之演算。亦如算術。含有加法，減法，乘法，除法，乘方，開方，等等。凡數經此演算。所示標記。謂之演算符號。

11. 加法符號， $+$ 。此 $+$ 符號。讀加。例 $4+3$ 讀4加3。意謂3箇加於4箇上。 $a+b$ 讀 a 加 b 。意謂 b 數加於 a 數上。

12. 減法符號， $-$ 。此 $-$ 符號。讀減。例 $4-3$ 讀4減3。意謂由4箇減去3箇。 $a-b$ 讀 a 減 b 。意謂由 a 數減去 b 數。

13. 乘法符號， \times 。此 \times 符號。讀乘或倍。例 4×3 讀4乘以3。意謂4箇被3箇乘。 $a\times b$ 讀 a 乘以 b 。意謂 a 數被 b 數乘。有時亦或用點代乘號。是故 $2.3.4.5$ 即 $2\times 3\times 4\times 5$ 。此二符號後。有數繼之者。俱可讀爲被乘。例 $\$a\times b$ 或 $\$a\cdot b$ 讀爲 a 圓被 b 數乘。

14. 除法符號， \div 。此 \div 符號。讀除。例 $4\div 2$ 讀4除以2。意謂4箇被2箇除。 $a\div b$ 讀 a 除以 b 。意謂 a 數被 b 數除。除法示號。亦可於橫線上書被除數。橫線下書除數。或用斜線將被除數與除數隔開。

例如 $\frac{a}{b}$ 或 a/b 適與 $a\div b$ 相同

注意。加 b 於 a , 由 a 減 b , 用 b 乘 a , 與夫 a 被 b 除等演算。若二字目所連符號適對，則必完全無訛。

15. 關係符號：

$=$, 讀等 等於 必等種種。

\neq , 讀不等種種。

$>$, 讀大於。如 $9 > 4$ 。

$<$, 讀小於。如 $4 < 9$ 。

\geq , 讀不大於。

\leq , 讀不小於。

$:$::, 比例符號。適與算術相同。

如 $a:b::c:d$ 或 $a:b=c:d$ 讀 a 比 b 如 c 比 d 。

16. 語詞符號：

\therefore , 讀故 於是。

\because , 讀因 既然。

例 $\therefore a=b$ 而 $b=c$, $\therefore a=c$ 。讀 a 既然等於 b 而 b 等於 c 。
故 a 等於 c 。

17. 相續符號…此…符號讀爲等等。

例 $1, 2, 3, 4, \dots$ 讀一, 二, 三, 四, 等等。 $a_1, a_2, a_3, a_4, \dots a_n$ 讀副一 a 副二 a 副三 a 等等直至副 na 。 a', a'', a''', \dots 讀第一 a 第二 a 第三 a 等等。

18. 結納符號。結納符號分爲括弧()括弓[]括帶{ }括線——括柱|。凡此演算符號。表明所示之數。從先算結。視其總結。如爲單數。

第一章 界說及符號

例如 $(a+b) \times c$ 。意謂 b 加於 a 之後。而其總結。被 c 所乘。
 $(a-b) \times c$ 。意謂由 a 減 b 。而 c 實乘其差。

凡式上書括線。即表其爲單數。

例如 $\overline{a-b+c}$ 適同 $a-(b+c)$ 。意謂 c 加於 b 。而後由 a 減其總結。

生 數，方，根

19. 生數。設某數爲二數或二數以上相乘之合數。則其各數或其二數相乘。及二數以上相乘之各合。均爲該數之生數也。

例 $2, a, b, 2a, 2b, ab$ 均爲 $2ab$ 之生數。

凡字目所示之生數。謂之字生。數目所示之生數。謂之數生。

20. 字生連串相乘。或數生與字生併乘。其間則無 \times 之符號。

例 abc 表示 $a \times b \times c$ 。 $63ab$ 表示 $63 \times a \times b$ 。

abc 之合不可混視爲 $a+b+c$ 之和。

設 $a=2, b=3, c=4$,

則 $abc = 2 \times 3 \times 4 = 24$,

但 $a+b+c = 2+3+4 = 9$.

注意。算術號法。惟省加法符號。至於代數號法。惟省乘法符號。

例 456 意謂 $400+50+6$. 然 $4ab$ 則謂 $4 \times a \times b$.

21. 設某合數。有一生數爲 0。則不論其餘各生數等於何值。其合必等於 0。凡生數爲 0 者。爲零生數。

溫德華士代數學

例如 a, b, c, d 其間有一爲 0，則 $abcd = 0$ 。

22. 係數。凡數目或字目。冠於幾何之首。以示該幾倍數者。謂之係數。

係數以字目代表者。謂之字係。以亞拉伯數目代表者。謂之數係。

例如 $7x$ 其 7 為 x 之數係。 ax 其 a 為 x 之字係。

幾何之首。如無係數。則其係數爲 1。

23. 方。數之方者。乃以該數自作乘數。以一爲其起始之被乘數。逐次自乘若干次之合也。凡此方法。謂之乘方。而其乘數名爲方之底數。陸續相乘次數。謂之方次。表方之次數者。謂之指數。書於底數上部右角之處。又以小字表之。

例 $1 \times a \times a$ 以 a^2 表之。(讀 a 平方)。 a 為底數。 2 為指數。 a^2 為之二次方。

1. $c \cdot c \cdot c$ 以 c^3 表之(讀 c 立方)。 c 為底數。 3 為指數。 c^3 為之三次方。

x^5 (讀 x 之第五次方)。 x 為底數。 5 為指數。 x^5 為 x 之五次方。

24. 指數既表底數自一陸續連乘之次。則 a^1 為 a 之一次方。可以 $1 \times a$ 表之。亦即 a 也。

故 a^0 為 a 之零次方。明示 a 不相乘。換言之。即謂此 a 不被乘數一。是以不論 a 值若何。 a^0 恒等於 1。

25. 凡合之方次式。被乘數一恆漏而不書。適與不一之係數相同。

第一章 界說及符號

例如不書 $x^3 = 1 \times x \times x \times x$ 。惟書 $x^3 = x \times x \times x$ 。此種表方法。指數恆示底數作爲生數自乘之方次也。

23. 方之相比。則以二次方大於一次方。三次方大於二次方。等等。

係數與指數。命意之不同。須當詳細釋明。

例 $4a = a + a + a + a$; $a^4 = a \times a \times a \times a$ 。

設 $a = 3$, $4a = 3 + 3 + 3 + 3 = 12$; $a^4 = 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 81$ 。

27. 根。與乘方相反者。謂之開方。開方云者。求數根次之演算也。數之根者。該數等生之一。如數開爲二相等生。則各爲平方根。如開爲三相等生。則各爲立方根。如開爲四相等生。則各爲四次根。等等類推。

根號爲 $\sqrt{}$ 。除平方根以外。餘皆於根號上書明數號。以示所求該數等生之次數。凡此數號。謂之根指數。

例如 $\sqrt{64}$ 意謂 64 之平方根。 $\sqrt[3]{64}$ 意謂 64 之立方根。

代 數 式

28. 代數式。代數式者。以代數號代表數也。代數式中可含一代數號。或以符號連結數代數號。

例如 a , $3abc$, $5a + 2b - 3c$ 為代數式。

29. 項。項者代數式之一號。亦或數號間無 $+$ $-$ 符號相連者。

溫德華士代數學

例 a , $5xy$, $2ab \times 4cd$, $\frac{3ab}{4cd}$ 各為一項之代數式。而項亦可以 \times 或 \div 符號分開為段。

30. 相似項。凡項之字目及其指數各各相等者。謂之相似之項。

例 $3x^2y^3$, $5x^2y^3$, $7x^2y^3$, 為相似項。

31. 簡式。祇含一項之代數式謂之簡式或獨項式。

例 $5xy$, $7a \times 2b$, $7a \div 2b$ 謂之簡式。

32. 複式。含括二項。或二項以上之代數式。謂之複式或多項式。

例 $5xy + 7a$, $2x - y - 3z$ 謂之複式。

33. 二項之多項式。謂之二項式。其三項者。謂之三項式。多項式亦名繁項式。

例 $3a - b$ 為二項式 $3a - b + c$ 為三項式。

34. 正負二項。項前冠有 $+$ 符號。謂之正項。如冠 $-$ 符號者。謂之負項。凡獨項或多項式首項之前。可以不書 $+$ 符號。

35. 設若正負二項所等之數相同。則此二項相連時。可以抵消。

36. 換入。如二幾何或二數或二演算。其於代數式間。可以互換。不致有妨式之數值者。則各相等。

37. 式之數值。如將式中各字之值換入。且按所示符號以行演算。則其所得之數。稱為式之數值。

簡式之數值

1. 設 $a=5$, 求 $4a$ 與 a^4 之數值。

$$4a = 4 \times a = 4 \times 5 = 20, \quad a^4 = a \times a \times a \times a = 5 \times 5 \times 5 \times 5 = 625.$$

2. 設 $a=3, b=4, c=5$, 求 $\frac{7}{15}abc$ 之數值。

$$\frac{7}{15}abc = \frac{7}{15} \times 3 \times 4 \times 5 = 28.$$

3. 設 $x=3, y=4$, 求 $2x^3y^2$ 之數值。

$$2x^3y^2 = 2 \times 3^3 \times 4^2 = 2 \times 27 \times 16 = 864.$$

4. 設 $x=4, y=5$, 求 $\frac{3}{4}xy^2$ 之數值。

$$\frac{3}{4}xy^2 = \frac{3}{4} \times 4 \times 5^2 = \frac{3}{4} \times 4 \times 25 = 75.$$

5. 設 $a=2, b=3, c=4$, 求 $8a^2b \div 3c^3$ 之數值。

$$\frac{8a^2b}{3c^3} = \frac{8 \times 2 \times 2 \times 3}{3 \times 4 \times 4 \times 4} = \frac{1}{2}.$$

6. 設 $x=3$, 求 (i) $\sqrt{4x^2}$, (ii) $2\sqrt{(9x^2)}$, (iii) $\sqrt[3]{4x^2}$ 之各數值。

$$(i) \quad \sqrt{4x^2} = \sqrt{4 \times 3^2} = \sqrt{36} = 6.$$

$$(ii) \quad 2\sqrt{(9x^2)} = 2\sqrt{(9 \times 3^2)} = 2 \times 9 = 18.$$

$$(iii) \quad \sqrt[3]{4x^2} = \sqrt[3]{4 \times 3^2} = 2 \times 9 = 18.$$

注意. 如無括線括弧, 根號祇與其右接近所示有關。

習問 1

設 $a=1, b=2, c=3, d=4, x=5, y=6, z=0$, 求下各式之數值。

1. $7x$.

4. $5bc$.

7. $14c^3yz$.

2. $8b^2$.

5. $6c^2d$.

8. b^3c^2y .

3. $7c^3$.

6. $2c^2dx$.

9. $3a^4b^2x$.

~~245
170~~

10. $\frac{2}{3}d^2x.$ 20. $\frac{7\ell^3x^2}{4by^2}.$ 28. $\sqrt[3]{x^2y^3z^3}.$
 11. $\frac{2}{9}c^3d.$ 21. $\frac{x^2y^2}{5c^2\ell^2}.$ 29. $\sqrt[3]{9bcd}.$
 12. $\frac{8}{10}b^2xy.$ 22. $\frac{9cdz}{dy}.$ 30. $2\sqrt{c^2d\ell^2}.$
 13. $\frac{5}{18}a^3dy^2.$ 23. $\frac{5a^5d^3}{4b^3x^2}.$ 31. $cd\sqrt{dy^2}.$
 14. $\frac{3}{3}x^2y^3z.$ 24. $\sqrt{b^2dx^2}.$ 32. $abc\sqrt{2cx^2y}.$
 15. $\frac{4}{15}c^2x^2.$ 25. $\sqrt{dy}.$ 33. $\frac{3}{4}d\sqrt{dy^2}.$
 16. $\frac{5}{12}xy^2.$ 26. $\sqrt[3]{27d^2}.$ 34. $abcdxyz.$
 17. $\frac{7}{10}d^2x^2.$ 27. $\sqrt{(bcy)}.$ 35. $cx\sqrt[3]{b^2cdy^2}.$
 18. $\frac{13}{12}c^2d^2.$ 28. $\sqrt[3]{27d^2}.$ 36. $b^2c\sqrt[3]{d^2z^2}.$
 19. $\frac{4b^4x^2}{5d^3}.$

複式之數值

38. 先須算結項間所示演算符號。然後按該項所冠符號而演算。

注意。各項須遵代數之式。凡二字生間 \times 符號，可以不書而數生與字生之間，其 \times 符號亦不書。

39. 項之各段，係按 \times 與 \div 之符號次序。由左而右以相合併。

式之各項，乃按 $+$ 與 $-$ 之符號次序。由左而右以相合併。

例 $60 - 40 \div 5 \times 3 - 20 = 60 - \frac{40}{5} \times 3 - 20 = 16.$

40. 二數之和。任爲第一加於第二。或爲第二加於第一。其和恆等。

代以字號。 $a+b=b+a$ 。此謂之加法交換定律。

41. 三數之和。任爲第二與第三之和數加於第一。或第三加於第一與第二之和數。其總恆等。

代以字號。 $a+(b+c)=(a+b)+c$ 。此謂之加法組合定律。

1. 設 $a=2, b=10, x=3, y=5$ 。求 $6b \div (b-y) - 3x + 2bxy \div 10a$ 之數值。

$$6b \div (b-y) - 3x + 2bxy \div 10a = \frac{6 \times 10}{10-5} - 3 \times 3 + \frac{2 \times 10 \times 3 \times 5}{10 \times 2}$$

$$= 12 - 9 + 15 = 18.$$

2. 設 $a=6, b=4$, 求 $(a+b)(a-b) + \frac{a+b}{a-b}$ 之數值,

$$(a+b)(a-b) + \frac{a+b}{a-b} = (6+4)(6-4) + \frac{6+4}{6-4}$$

$$= 10 \times 2 + \frac{10}{2} = 20 + 5 = 25.$$

習問 2

設 $a=1, b=2, c=3, d=4, e=5, f=0$ 。求下各式之數值。

1. $9a+2b+3c-2f$.

4. $\frac{4ac}{b} + \frac{8bc}{d} - \frac{5cd}{e}$.

2. $4e-3a-3b+5c$.

5. $7e+bcd - \frac{3bde}{2ac}$

3. $8abc-bcd+9cde-def$.

6. $abca^2+bcd^2-dea^2+f^3$.

$$7. \quad e^4 + 6e^2b^2 + b^4 - 4e^3b - 4eb^3.$$

$$8. \quad \frac{8a^2 + 3b^2}{a^2b^2} + \frac{4c^2 + 6b^2}{c^2 - b^2} - \frac{c^2 + d^2}{e^2}.$$

$$9. \quad \frac{d^c}{b^c}.$$

$$11. \quad \frac{b^c + d^c}{b^2 + a^2 - bd}.$$

$$10. \quad \frac{e^c - b^a}{c^b - b^c}.$$

$$12. \quad \frac{e^c + d^c}{e^2 + cd + d^2}.$$

設 $a=2$, $b=10$, $x=3$, $y=5$ 。求下各式之數值。

$$13. \quad xy + 4a \times 2. \quad 17. \quad (6b - 8y) \div 2y \times b + 2b.$$

$$14. \quad xy + 15b \div 5. \quad 18. \quad (6b - 8y) \div (2y \times b) + 2b.$$

$$15. \quad 3x + 7y \div 7 + a \times y. \quad 19. \quad 6b - (8y \div 2y) \times b - 2b.$$

$$16. \quad 6b - 8y \div 2y \times b - 2b.$$

括 弧

42. 括弧前冠 + 符號。設某有錢十元。其後收入三元。又後收入二元。如將三元與二元總結。加於十元。與夫先加三元於十元。而後再加二元。所得之數。無有差異。前法可以 $10 + (3 + 2)$ 表之。後法可以 $10 + 3 + 2$ 表之。故 $10 + (3 + 2) = 10 + 3 + 2$ 。

設某有錢十元。其後收入三元。又後付出二元。如由三元之中付出二元。以其所餘加於十元。與夫先加三元於十元。而後再由其和付出二元。所得之數。無有差異。

前法可以 $10 + (3 - 2)$ 表之。後法可以 $10 + 3 - 2$ 表之。
故 $10 + (3 - 2) = 10 + 3 - 2$ 。

設以公號代入(1)(2)諸式。則得。

$$a + (b + c) = a + b + c.$$

$$a + (b - c) = a + b - c.$$

括弧前冠 + 符號者之公法。

括弧冠有 + 符號者。及去該括弧時。其式中各項之符號。無所變更。

括弧以外任銜何種括號。俱以此法例之。

43. 括弧前冠 - 符號。設某有錢十元。付還二賬。一爲三元。一爲二元。其於十元之中同時取出三元二元。與夫逐次取出三元二元。所餘之數。無有差異。

前法可以 $10 - (3 + 2)$ 表之。後法可以 $10 - 3 - 2$ 表之。

故 $10 - (3 + 2) = 10 - 3 - 2$. (1)

設某有錢十元。係爲二張五元鈔票。用以付償三元之債。付出五元之票。收回二元。

此法可以 $10 - 5 + 2$ 表之。

所償之債既爲三元。即 $(5 - 2)$ 元也。則所餘之錢。又可以 $10 - (5 - 2)$ 表之。

故 $10 - (5 - 2) = 10 - 5 + 2$ (2)

設以公號代入(1)(2)諸式。則得

$$a - (b + c) = a - b - c,$$

$$a - (b - c) = a - b + c.$$