

明·徐春甫撰

明葛宋禮刊本

古今醫統大全

(二)

新文豐出版公司印行

景自中央圖書館珍藏善本書籍

明徐春甫撰 明葛宋禮刊本

古今醫統大全(一)

新文豐出版公司 印行

1985年12月24日

古今醫統大全卷之九十一目錄

痘疹淺秘

病機

痘疹三證表裏不同

痘疹

發熱透解散多痘疹必輕

痘本於胎毒

痘發於心經

出痘辯吉凶

痘疹不用服藥例

痘疹合用服藥例

驚搐

嘔吐

泄瀉

喘渴

脹秘

白塌



黑陷

痒

痛

痘疔

斑疹

斑爛

声啞水唅

寒戰咬牙

面目發腫

晝夜啼哭

不乳不食

痘瘡入目

不灌漿

不結痂

不脫痂

癰痕凸凹

痘後癰癤

痘後餘熱

觀候

蠟紅白黑四色辯

形證輕重

順逆險三候大要

順逆險按期候法

治法

鮮熱稀痘

始終調理

鮮表

攻裏

內托

養胃

痘瘡當看輕重緩急

首尾十二日證治條例

痘瘡治例

預防豆疹

痘瘡護眼法

首尾不可汗下辯

痘瘡避忌

不可治證例

藥方

痘藥正品

發熱三朝門劑

參蘇飲

升麻湯

消毒飲

托裏散

生油劑

抱龍丸

犀角地黃湯

惺惺散

敗毒散

三豆飲子

紅綿散

三酥餅

辰砂六一散

紫雪膏

6052

6056

藿香正氣散

導赤散

茵陳汁

牛勞子散

稀豆散

麻黃湯

五積散

五苓散

羌活散

奪命散

出痘三朝調劑

保元湯

補中益氣湯

四君子湯

六君子湯

八珍湯

十全大補湯

小承氣湯

化毒湯

胡荽酒

稀痘酒

活血散

無價散

無比散

人參白朮散

豆蔻餅

木香散

異攻散

珍珠膏

四順飲

秦皮湯

疾癘散

通神散

蟬菊散

甘桔湯

如聖湯

黃蘗膏

黃芩散

牛參散

葡萄酒

保嬰丹

傳春散

玄參葉湯

葛根湯

化斑散

人參竹葉湯

六味人參麥門冬散

犀角散

玳瑁湯

理中湯

胃氣散

通關散

救生散

滑石散

快毒丹

龍腦膏

牛黃散

南金散

硃砂膏

古今醫統大全卷之九十一

紅粉丹

紫金散

乳香猪血膏

脫殼散

宣毒膏

清涼飲子

大連翹飲

百祥丸

猪鬃膏

敗毒散

荆防敗毒散

甘露飲

搽牙散

聖胎散

安胎飲

家道法

避邪丹

古今醫統大全卷之九十一目錄

古今醫統大全卷之九十一

新安東臯徐春甫編集

太倉改齋支秉中校正

痘疹洩秘

病機

痘疹二證表裏不同

痘之與疹。雖皆中於胎毒。其源雖同。其證則異。厚乎成之初。先有
臟而後有腑。臟乃積受之地。腑乃傳送之所。臟屬陰為裏。故其受
毒為最深。而痘所以久熱而難出。腑屬陽為表。故其受毒淺而疹
所以暴熱而易生。

痘瘡出於臟。故在肌肉血脉之間。必先出紅斑。而後漸起如痘。故名曰痘。

疹子出於腑。故在皮膚之下。而出皮膚之上。其形如麻。一出而沒。俗名曰麻。

痘自裏而出於臟。故重。疹自表而出於腑。故輕。

痘證早晨身微熱。午後大熱。眼睛黃色。兩脇下吸吸然動。甚則發驚搐。此屬心臟病。稍有失治。或裏虛則青陷入而不能救。

疹證早晨微熱。午後亦大熱。眼白珠赤色而不黃。手足冷而吐逆。此屬肺臟病。隨熱發散。則易生易沒。而愈為不難。

甫按。痘難疹易之說。此則自其世俗常情而言之。其有所感入深。

胃氣原弱。又或因瀉痢而出之不快。或發之未透。而隨現隨隱。又之邪氣漸入於胃。必瀉不已。而復發加之喘促。為必死矣。若此者。亦不可以易言之耳。所以疹證。又何可以輕視之耶。凡覓出疹。畧見虛弱。當先補養脾胃。欲出不出。急宜托裏發表。以助之。首尾俱不可瀉。一如痘證同也。○支氏曰。疹證之發。多在流行癘氣傳染之時。沿門比屋相傳。輕重相等。發熱之間。或咳嗽噴嚏。鼻流清涕。眼胞浮腫。面腫腮赤。或竟淚汪汪。或惡心嘔噦。即是疹候。便宜用解毒發散之藥。依時令輕重。僅發出外。不使停留於中。自無後患。然其所發。但以六時即收為度。乃陽生陰成。陰生陽成。造化自然之妙。如午後出者。子後收之類。若一出即收者。失之太速。或一

出之後連延三四日不收者。此毒太甚。外發未盡。尚有餘邪所致。須與化斑解毒等湯。如玄參石膏之屬。○又有疹既收回。餘毒盡三日之外。又復發出。至五六次不已者。此因發熱之時。不避風寒。邪氣鬱於肌肉之間。雷連不散。雖得前解發之劑。終不舒暢。若出疹之際。有雜證。亦當隨證而治之。○凡疹證發熱之時。或嘔吐。或自利。或滯下者。皆火邪內迫。毒氣所行之地。而隨病也。吐者竹茹石膏湯。自利者升麻澤瀉湯。滯下者黃芩芍藥湯。加黃連枳殼。實者少加大黃微下之。虛者通加人參以佐之。

痘痧疹

痘瘡之發。常觸於天行時氣。疹之發。多中於時氣。風寒本非尋常。

並發者。或有齊發並出。此謂之兩感。歲氣臟腑擊動。表裏交征。皆為不順之候。如痘稀疎可用**升麻湯**解之。疹散豆出。隨證調治。若痘太盛。其疹雖解。氣血重傷。至於收斂。脫落終難痊。安惟以保養脾胃。調和氣血。庶幾能濟。

發熱久解散多痘疹必輕

凡小兒感時行發熱。當用解毒發表之劑為第一法。若能於發熱之初。用力則痘疹自稀。或稠亦勢輕也。何則。不知此義。失於解散。或一熱即出。此痘多危。蓋邪毒在中。未嘗敗縱。是正氣充完。亦終為之累。世謂服藥預先防之。則終身不出。斯亦理之所必無也。蓋痘毒為人身所必有。謂之所感有淺深。所發有遲早。固勢然也。

於其感發之際。解散毒邪。瘡疹自輕而得吉。如傷寒證治。失於其時。則有胃爛發斑。春溫證治。失於其時。則有溫毒發斑。由此而知發熱之初。若早為解散。不致熱鬱於內。而成痘疹有矣。若謂預防用藥。終身不出。豈其理乎。

凡小兒發熱如瘡狀。熱作有時者為潮熱。

潮熱

○發熱倍能飲食唇紅

面赤大小便秘。脇下有汗者為風熱。

風熱

○發熱面赤鼻流清涕手足

煩燥左額青筋自汗惡寒者為傷風熱。

傷風熱

○發熱而手足微冷面色

青慘耳鼻冷腮寒無汗左額有青紋者是陽熱。

陽熱

○發熱眼胞微

腫右額有青筋頭熱肚熱皆滿而腹脹者是陰熱。

陰熱

○發熱

眉心青紋手心有汗時發驚陽者為陰熱。

陰熱

○發熱多渴欲飲腹