

小兒家庭療法護法

郭壽鐸
楊竟芳
著

商務印書館發行

小兒家庭療法護法

郭壽鐸
楊竟芳
著

商務印書館發行

小兒病家庭療護法

著者 郭壽鐸 楊竟芳

發行者 商務印書館

上海河南中路三二一號

印刷者 商務印書館

上海及各地

發行所 商務印書館

★版權所有★

(69704)

1946年3月初版
1950年10月6版 基價3.5元

目次

序

第一章

新生兒的病患

一

第一節

早產嬰兒養育法

一

第二節

新生兒黃疸的治療與看護法

四

第三節

新生兒出血症的治療與看護法

四

第四節

先天性黴毒的治療與看護法

五

第五節

紅斑的治療與看護法

六

第二章

乳兒的營養障礙

七

第一節

急性消化不良症的治療與看護法

七

第二節

消化不良性中毒症的治療與看護法

八

第三節

營養失調症的治療法

九

第四節	慢性消化不良症的看護法	一〇〇
第五節	穀粉營養障礙的治療與看護法	一〇〇

第三章 小兒的消化器病 一二一

第一節	急性腸胃炎的治療與看護法	一二二
第二節	大腸炎的治療與看護法	一三
第三節	自體中毒症的看護法	一四
第四節	幽門痙攣症的治療與看護法	一五
第五節	神經性嘔吐的治療法	一七
第六節	經常便秘的治療與看護法	一七
第七節	腸閉塞症的治療法	一九
第八節	脫腸的治療法	二〇
第九節	盲腸炎的治療與看護法	二一
第十節	慢性腸膜炎的治療與看護法	二二
第十一節	腸寄生蟲的處理	二三
第十二節	口內炎的治療法	二五

第十三節	鵝口瘡的治療法	二五
------	---------	----

第四章	維生素缺乏症	二一七
-----	--------	-----

第一節	乳兒腳氣病的治療與看護法	二七
第二節	巴羅氏病的治療與看護法	二八
第三節	佝僂病的治療與看護法	二九

第五章	小兒的呼吸器病	三一
-----	---------	----

第一節	扁桃腺炎的治療法	三一
第二節	扁桃腺腫大的預防法	三一
第三節	喉頭扁桃腺腫大的處理	三三
第四節	喉頭後側膿瘍的處理	三三
第五節	急性頸部淋巴腺炎的治療法	三四
第六節	急性喉頭發炎的看護法	三四
第七節	支氣管發炎的看護法	三五
第八節	支氣管喘息的看護法	三七

第九節	枝氣管肺炎的治療與看護法	三八
第十節	喉炎性肺炎的治療與看護法	四一
第十一節	肋膜炎的看護法	四二
第十二節	膿胸的看護法	四二
第十三節	小兒結核病的看護法與預防法	四三

第六章 急性傳染病 四六

第一節	猩紅熱的治療與看護法	四六
第二節	麻疹的治療與看護法	四八
第三節	風疹的看護法	五〇
第四節	第四病的看護法	五〇
第五節	傳染性紅斑的看護法	五一
第六節	天然痘與種痘	五一
第七節	水痘的看護法	五三
第八節	膜狀炎的治療與看護法	五三
第九節	百日咳的治療與看護法	五五

第七章

小兒神經性病

六七

第十節	赤痢的治療與看護法	五七
第十一節	疫痢的處理	五八
第十二節	傷寒的治療與看護法	五九
第十三節	耳下腺炎的處理	六一
第十四節	流行性感冒的治療與預防法	六二
第十五節	霍亂的治療與預防法	六三
第十六節	瘧疾的治療與預防法	六五
第一節	乳兒鉛中毒的處理	六七
第二節	結核性腦膜炎的看護法	六七
第三節	流行性腦脊髓膜炎的治療與看護法	六八
第四節	慢性腦水腫的處理	六九
第五節	流行性腦炎的處理	六九
第六節	腦性小兒痲痺的治療法	七〇
第七節	脊髓性小兒痲痺的治療法	七一

第八節	癲癇的治療與看護法	七一
-----	-----------	----

第九節	聲門痙攣的治療與看護法	七二
-----	-------------	----

第十節	舞蹈病的治療法	七二
-----	---------	----

第十一節	局部痙攣痛的治療法	七三
------	-----------	----

第十二節	夜驚症的治療法	七四
------	---------	----

第十三節	神經質症的治療法	七四
------	----------	----

第十四節	小兒癲病的治療法	七五
------	----------	----

第八章	血液病和心臟病	七六
-----	---------	----

第一節	小兒貧血症的治療法	七六
-----	-----------	----

第二節	假性白血病的治療法	七七
-----	-----------	----

第三節	先天性心臟病的治療法	七七
-----	------------	----

第四節	急性心臟內膜炎的治療法	七七
-----	-------------	----

第九章	小兒泌尿器病	七九
-----	--------	----

第一節	急性出血性腎炎的治療與看護法	七九
-----	----------------	----

第二節	慢性腎臟炎的治療法·····	七九
第三節	尿毒症的療法·····	八〇
第四節	起立性蛋白尿的治療法·····	八一
第五節	膀胱發炎和膀胱炎的治療法·····	八一
第六節	遺尿病的治療法·····	八二

第十章

小兒皮膚病

·····	八四
-------	----

第一節	濕疹的療法·····	八四
第二節	傳染性膿痂疹的治療法·····	八六
第三節	疔癰的治療法·····	八七
第四節	丹毒的治療法·····	八八
第五節	癬的治療法·····	八九
第六節	疥瘡的治療法·····	九〇
第七節	凍傷的治療法·····	九一
第八節	火傷的治療法·····	九二
附錄一	救急法五則·····	九三

一	創傷的救急法	九三
二	擊傷的救急法	九四
三	骨折的救急法	九五
四	觸電的救急法	九六
五	異物梗喉窒息的救急法	九六
附錄二	家庭常用藥物材料一覽	九七

小兒病家庭療護法

第一章 新生兒的病患

兒童從脫離母體出生時起，到滿一年止，在這一年期間，通稱「乳兒」，自出生後剪落臍帶，一直到十天前後，稱爲「新生兒」，嬰兒的疾病，大都是先天羸弱、早產以及受自父母的遺傳病等等。

第一節 早產兒的處理

依產科學上的規定，凡懷孕未滿四十星期，而在二十八星期以至三十八星期中間即出生的嬰兒，才稱爲早產兒，但在小兒科方面，凡體重未足二千克（即四斤）而出生的，都可以看做早產兒而論。

早產原因

早產的原因，大多是由於孕婦患病，例如因患腎臟病、梅毒、肺病、糖尿病以及其他急性病而起，此外，孕婦的慢性中毒，譬如嗎啡中毒、酒精中毒，或者受外界刺激譬如跌倒等等，也能促成早產。

不論原因如何，因為早產兒未經充分孕成便脫離母胎，所以大都是體重輕，皮膚皺，元氣不足，生活力薄弱，死亡率很高，據統計，初生時體重在一千克至一千五百克之間者，死亡率為百分之八十，體重在一千五百克至二千克之間者，死亡率為百分之四十。所以必須慎為養育。

早產兒的安全育法。

【注意保暖】最要緊的事，便是保暖。因為嬰孩自身沒有保持體溫的能力，所以在冬天如果沒有充分的保暖，便有凍死之虞。

如果能夠買到或借到電暖育兒箱，最為簡便，又最安全，如果醫院有此設備，委託醫院代育更好。

在家庭裏養育早產兒，要依照季節寒暖情形，不時注意，在冬天裏，可取湯婆三個，用布小心包裹周密，放在腳下和身體兩旁，以資保暖，同時使室內溫度約在攝氏十七度左右，隨時防止溫度降到十七度以下。將近黎明時候，氣溫降低，往往易感風寒，尤須特別注意。

家庭裏所用的暖室器具，如係電爐，便沒有流弊，假如有煙囪設備，用木炭爐也很適宜。凡用火盆燃炭取暖的，須俟炭燒紅後，方可移入室內，否則有毒。不論採用那一種暖室設備，必須同時設法產生水汽，以防室內過於乾燥，並須將門頂的空氣窗打開，不斷換氣，使室內空氣保持清潔。但是，室內如果太熱，或是濕氣太多，嬰孩便將流汗不止，幼嫩的皮膚受了汗水的刺激，會生疔癰，所以要觀察嬰孩的態度，酌量調節溫度才好。

所用的尿片布，務須烘暖後包裹。

夏天炎熱的時節，須選擇涼爽的房间，如在室內放置冰塊，或在院子裏灑水，使室內保持涼爽，室溫約在攝氏十七度左右，最爲理想。但是不要使嬰孩被風直接吹着，風扇和電扇，也不宜使用。總之，要依照早晚氣溫變化的情形，不時留意室內的空氣和嬰孩的態度，勿使體溫太高或太低。

。每日入浴二次。

健康的嬰孩，大概每天洗澡一次，早產兒則可在午前十時和午後三時左右，洗澡兩次，使他全身溫暖血液流行，頗有益處。

洗澡水的溫度，在冬天約需攝氏三十九度，在夏天約三十七度，總以適宜爲度。並且，還要留意從門縫或窗縫吹進來的風，勿使感受風寒。

。餵奶應注意的事項。

生活力薄弱的早產嬰孩，吸奶的能力很小，大概每次所能吸的量，不過十克至十五克，所以中隔的時間，務須縮短，可以每隔一小時半以至兩小時餵一次，每日約餵十次以至十二次。不過，早產的嬰孩，大都時常入睡，所以時間一到便須喚醒餵奶，切勿因事遺忘。

如果嬰孩無力吸奶，可先將奶擠在茶杯裏，然後用小匙餵，或用玻璃滴管滴入口中，餵時須小心，勿使哽噎。所餵的奶以人奶爲限，萬不得已時，可用牛奶一份和水三仍，沖稀後餵。養育早產的嬰孩，應當注意以上幾點。最好常請小兒科醫師指導，以策安全。

第二節 新生兒黃疸的治療與護理法

症狀

【全身變成黃色……】 大概在嬰孩生後兩三日發生，輕則經過數日，重則經過三星期後，自然而愈，沒有經驗的人，往往不知所措，以致誤事，其實無關緊要，儘可放心。

治療與護理法

只要是有沒有發熱，便不妨按照康健的嬰孩，常常洗澡，如果發熱到攝氏三十七度半以上，或是經過三星期還未痊愈，一定有其他疾病併發，必須延醫診治。

第三節 新生兒出血症的治療與護理法

此種疾病的原因，尚未完全明瞭，大抵在生後兩三日前後，口腔和腸忽然多量出血，有時因出血不止，以致死亡。

症狀

【口內吐出多量血液，牙床、鼻孔、臍孔等處出血……】 大腸也同時出血，不過如果出血不多，血和大腸便相混成黑色排出，往往不易察覺。病發時，體溫降低，手脚冰冷，很像貧血的樣子，假如出血不止，便將危及心臟，以至不治。

治療與護理法。

迅速止血，這是營救嬰孩的關鍵，一旦發現出血，務須使他靜臥，一面迅速延醫診治。並且，延醫時最好先將大略的情形，告訴醫師，以便醫師隨帶止血的注射藥劑，及時療治。

如果住所交通不便，醫師一時未能請到，必須趕快做救急的措置，先取細碎的冰屑一把，用布包裹，放在病孩的胃部（靠近臍孔上部），等待醫師來診。

第四節 先天性梅毒的治療與護理

原因與預防法。

嬰兒的梅毒，有的是從祖父母遺傳而來，不過大都因為在母胎裏的時候，由血液流通而傳染，所以預防的方法，最好在妊娠期間即行徹底除黴的療法。

嬰兒染受梅毒的程度，重則死產、流產，輕則早產、平產，生時全身皮膚發生潰爛的症狀，但在一般的情形，往往分娩時還是健康狀態，經過一個月左右，才現出特殊的症狀。

症狀。

【皮膚呈蠟一般的顏色，鼻孔不通……】如請師醫診視，一見便知肝臟和脾臟都已腫脹。並且，啼哭發出無力的啞聲，鼻孔裏時常流出膿狀的鼻汁，有時鼻汁裏還混着血液，皮膚發疹潰爛，現出水疱，病再加劇，則手掌腳趾也漸紅腫，皮膚脫落，嘴唇破裂，看去是十分痛苦。

治療與護理法

因爲鼻孔不通，所以，起初往往誤認爲傷風，到了各種症狀陸續發生，才驚異注意，那時，除立刻延醫診治外，別無他法。在家庭裏應注意的事項，就是小心照料，使他不至傷風，腸胃不生毛病。

奶，務須餵母親自己的奶，不得已時，也可以雇用奶娘，或用人奶餵法。不過這種人工榮養法，易起消化不良的疾病，所以十分危險，最好不用。

家裏其他的小孩，勿使接近病兒，以防傳染。

第五節 紅斑的治療與護理法

症狀

【不發熱而發疹……】生後一星期左右，身上發生無數的紅色斑點，很像麻疹。大人往往以爲麻疹，於是保暖過甚，致使嬰孩汗流浹背，十分痛苦，其實既沒有發熱，自與麻疹不同，切勿誤認。

治療與護理法

至於紅斑，只須用氧化鋅藥粉塗敷，五六天後便會痊愈。在紅斑消去以前，最好暫不洗澡。