

1958年农业展览会上海市展览资料

2

上海市农业局編

上海市
几种优良蔬菜品种介绍

科技卫生出版社



目 录

一、 蘿卜.....	... 1
二、 胡蘿卜...	... 5
三、 馬鈴薯...	... 8
四、 薺菜.....	... 9
五、 青菜.....	...10
六、 塌菜.....	...12
七、 雪菜.....	...13
八、 甘藍.....	...15
九、 花椰菜...	...17
十、 茄子.....	...18
十一、 辣椒.....	...19
十二、 番茄.....	...20
十三、 絲瓜.....	...21
十四、 甜瓜.....	...22
十五、 西瓜.....	...22
十六、 毛豆.....	...23
十七、 刀豆.....	...24
十八、 豇豆.....	...25
十九、 豌豆.....	...27
二十、 洋蘑菇	...28

前 言

上海市蔬菜栽培历史悠久,种类繁多,目前初步調查有88个种类, 360 个品种。其中根菜类 5 个种类, 48 个品种; 莖菜类 10 个种类, 28 个品种; 叶菜类 25 个种类, 96 个品种; 花菜类 2 个种类, 14 个品种; 瓜果类 12 个种类, 72 个品种; 豆类 8 个种类, 76 个品种; 稀有蔬菜 26 个种类品种。这些品种大部分由国内外引进, 经过郊区农民較長期的栽培, 大多已适应本地风土, 今將其中主要优良品种的性狀及栽培要点介紹于后, 以供交換优良品种的参考。

本書所介紹的品种性狀、特征多为地方品种征集时的初步資料, 尚未經過品种观察对比, 但为农民在長期生产实践中的观察所得, 基本情况是正确的, 在栽培要点中所述施肥情况及产量, 均在今年增施肥料、增加單位面积产量的基础上提出, 故較原有产量均有所提高。

上海市农业局 1958 年 9 月

一、蘿 卜

1. 四季蘿卜

性狀 肉根圓錐形，皮厚色白，多纖維，肉微黃，無頸無肩，根1/3露地面，長1.2~1.3尺，葉片伏地，葉色濃綠，葉面有光澤，葉背有毛茸，缺刻深，葉厚中肋粗，耐旱，耐寒，略帶苦味，花淺藍色，早熟，春播不易抽苔，是長白蘿卜中唯一的四季栽培種。

栽培要點

(1)	播種期	收穫期	產量
春播	立春~雨水	芒種	80~100 担
秋播	寒露	驚蟄	

(2) 深耕：一般1.5~2尺，試驗田有深至3~4尺者，總之土層較深，對蘿卜生長發育有利。

(3) 施足基肥：用雜肥400~500担，或河泥數百担，做到分層均勻施肥，並適當增施磷、鉀肥。


(4) 適時追肥：依生長情況進行追肥，一般追肥3~4次（即間苗後1~2次，破肚時，收穫前2~3星期）每畝用人糞30~50担，與水對沖，加過磷酸鈣15斤，加肥田粉20~30斤。

(5) 及時灌溉：特別在破肚後直根開始生長膨大之時最重要。

(6) 嚴防病蟲：發現病株隨即拔除，蚜蟲用可濕性666或用223乳劑（1:300）防治；跳蟬用0.1%的敵百蟲防治。

2. 本地40早蘿卜

性狀 根圓柱，末端尖，無頸，長約1.5尺左右；皮、肉白色，



水分多，味較淡，成熟時有 $1/4$ 露出地面；葉柄短，葉色暗綠，有稀毛茸，性不耐寒。商品成熟期 40 天，過時收穫易空心，不耐貯藏，也能秋栽。芒種播種，7~8 月收穫，是解決淡季的品種。

栽培要點


(1) 播種期	收穫期	產量
芒種	大暑	50 担/畝
大暑	秋分	80~100 担/畝

(2) 栽培管理同四季蘿卜。

3. 本地 60 日早長白

性狀 長圓筒形，二端較圓，長 1~1.5 尺左右，有頸，根不露地面，皮、肉白色，不易空心，纖維少，水分多，味甜，葉柄長，葉片濃綠，耐寒性較差，生長期 60 天。


栽培要點



- | | | | |
|-----|-------|-------|---------|
| (1) | 播种期 | 收获期 | 产量 |
| | 立秋~寒露 | 寒露~冬至 | 60~80 担 |
- (2) 管理同四季萝卜。

4. 本地晚长白萝卜

性状 白皮、白肉，圆锥形，根端渐尖，皮光洁，须少，水多味



甜，品質好，微露地面。叶片大，色淡，叶柄長，但不耐熱，高溫易爛，宜秋栽，生長期 80 天即可采收。


栽培要点

- | | | | |
|-----|------------|-------|-------------|
| (1) | 播种期 | 收获期 | 产量 |
| | 立秋~秋分 | 霜降~立冬 | 100~120 担/亩 |
| (2) | 栽培管理同四季蘿卜。 | | |

二、胡蘿卜

1. 汕頭紅胡蘿卜

性狀 長圓錐形，長 1.3~1.4 尺，皮肉橙紅色，耐寒，耐貯藏，能在露地過冬。水分多，皮易裂，味甜，葉少，葉色淡，葉柄細，品質上等。




栽培要点

- | | | | |
|-----|-------|-------|---------|
| (1) | 播种期 | 收获期 | 产量 |
| | 小暑~大暑 | 立冬~小雪 | 60~80 担 |

- (2) 选砂質壤土, 深耕 1.5~2 尺。
- (3) 施足基肥, 用堆厩肥及垃圾 400~500 担。
- (4) 保証全苗, 掌握播种季节, 干旱时及时澆水, 保持土壤湿润, 利于出苗。
- (5) 及时間苗: 第一次在齐苗时, 第二次苗高 3~4 寸时。
- (6) 及时防虫: 用可湿性 2 2 3 毒可湿性 6 6 6 粉 4 两加水 80 斤喷射。

2. 本地紅長胡蘿卜

性狀 根橙紅色, 長柱圓錐形, 長 1.3 尺左右, 心細水多, 耐寒, 能于露地过冬, 不宜春播(易抽苔)。



栽培要点

- | | | | |
|-----|-------|-------|---------|
| (1) | 播种期 | 收获期 | 产量 |
| | 大暑~处暑 | 霜降~清明 | 50~70 担 |
- (2) 管理同汕头紅胡蘿卜。

3. 烟台五寸胡萝卜

性状 根長5~6寸,无頸,肩粗方,皮肉橙黃,肉堅心粗,水少,叶濃綠,性耐熱,春季栽培不易抽苔,秋季栽培能露地过冬至3月出售。是解凍淡季的品种。



栽培要点

(1)	播种期	收获期	产量
	立春	小滿~小暑	30~40担
	立夏~芒种	大暑~处暑	15~20担
	大暑	霜降~立春	70担

(2) 选高燥的砂壤土(特别是春季栽培的更应排水优良),深耕1~1.5尺。


(3) 每亩用堆厩肥400担,分期分次追肥,及早灌溉,特别在胡萝卜开始形成时不能缺水,否则对产量影响大。

(4) 早间苗,及时定苗:苗出齐后间苗,苗高3~4寸时第二

次間苗，苗距 2~2.5 寸見方，間苗時結合除草，定苗株行距 4~5 寸。

4. 烟台三寸×本地紅長第一代

性狀 長 6~7 寸，橫剖面直徑 1.5~2 寸，橙紅色，心細水多，可作夏季栽培。




栽培要点

- | | | | |
|-----|-------------|-------|---------|
| (1) | 播种期 | 收获期 | 产量 |
| | 小滿~芒种 | 处暑~白露 | 30 担 |
| | 小暑~大暑 | 霜降~立冬 | 30~40 担 |
| (2) | 管理同烟台五寸胡蘿卜。 | | |

三、馬鈴薯

江桥大白皮

性狀 薯块皮淡黃白色，肉淡黃白色，長圓形，植株較高、



春、秋栽培，春栽开花结实，块茎水分多，产量高，但不甚耐贮藏。

栽培要点

(1)	播种期	收获期	产量
	惊蛰	夏至	35~40 担
	处暑	立冬	20 担

(2) 深耕：1 尺左右，春季耕耙二次。

(3) 增施有机质肥料：每亩施河泥 500~600 担或堆厩肥 300~400 担，并增施过磷酸钙 20~50 斤，草木灰 500 斤。

(4) 严格选种，去病伤块薯，增加种薯重量，平均每个种薯重 2 两以上，并用 0.1% 过锰酸钾处理 3~4 小时，有杀菌与催芽作用。


(5) 进行土地轮作，防止病害传染，定期打波尔多液，用 1:1:160~100 的比例每星期防病 1 次。

(6) 摘除花蕾，减少养分消耗，促进块茎生长。

四、 薺 菜

板叶薺菜

性状 叶绿色，叶缘缺刻浅，一般为早熟栽培、耐热，产量比



散叶种高 1/3, 品質亦佳。

栽培要点

(1)	播种期	收获期	产量
	立春~春分	清明~小暑	30~40 担
	立夏~夏至	小暑~白露	15 担
	小暑~处暑	白露~清明	80~100 担

(2) 选粘壤土为宜, 播种后須保持土壤湿润, 以利出苗。

(3) 增施有机質肥料, 出二真叶时追肥, 以后每次收后, 追肥一次。

(4) 注意輕澆勤澆, 保証供給一定水分。

(5) 用 2 2 3 乳剂 1 斤加水 240 斤或魚藤精 1 斤加水 300 斤治蚜虫。

五、青 菜

1. 四月晚青菜

性狀 叶色濃綠, 較一般青菜抽苔迟。

栽培要点




(1) 播种期 定植期 收获期 产量
寒露~霜降 立冬~大雪 惊蛰~谷雨 80担/亩

(2) 适当增施有机质肥料,追肥、水分需不断供给。

(3) 治虫。如青虫、蚜虫、跳蚤,可用223乳剂1斤,加水200斤或可湿性666 1斤,加水240斤喷射,或以0.1%的敌百虫防治。

2. 矮莴苣菜

性状 叶色浓绿,抽苔迟。叶片鸭舌状,叶面平滑,黄绿色,叶肉薄,叶柄短阔、扁平、白色肉厚。株高0.7尺,节大有明显束



腰，纖維少，品質佳。

栽培要点

(1)	播种期	定植期	收获期	产量
	清明~立夏	直播	小滿~小暑	30~40担/亩
	芒种~小暑	直播	大暑~处暑	25~30担/亩
	大暑~立秋	处暑~白露	白露~寒露	100~120担/亩
	白露~寒露	霜降~小雪	冬至~雨水	40担/亩

(2) 整地要平整，做好深耕高畦，冬季用低溝种植，以減輕寒流为害；夏、秋栽培应采用条直播，以利通风。

(3) 适当增施有机質肥料作基肥；追肥輕施、勤施，使其均匀生長。

(4) 及时灌溉：天旱时用溝灌，切忌滿灌以免爛根，夏、秋采用水坑地栽培，效果良好。


(5) 勤治虫：同四月晚，

六、塌 菜

1. 油塌菜

性狀 叶橢圓形，濃綠色，叶面光滑，有光澤，叶柄扁短，平展塌地。耐寒，为春节供应的主要品种之一。

栽培要点



(1)	播种期	收获期	产量
	寒露~霜降	大寒~春分	30~40 担


(2) 施肥:基肥 100 担,河泥 200 担,用大粪作追肥,每次用量 20~30 担,对冲水澆。

(3) 間苗:三次,苗距第一次 2~3 寸;第二次 5 寸;第三次 8~9 寸。

(4) 治虫:用 666 或 223 防治蚜虫。

2. 小八叶烏塌菜

性狀 叶片圓形,深綠色,叶面多皺縮,有光澤,全叶向外反卷,叶柄細長,塌地輪生八叶交叉二輪,排列整齐,12~13 层时心叶突起,品質佳。



栽培要点

(1)	播种期	收获期	产量
	寒露	小雪~立春	40~60 担/亩

(2) 栽培管理同油塌菜。

七、雪 菜

黃种八叶齐雪菜

性狀 叶子細而尖,缺刻淺,叶色黃綠,适宜夏、秋栽培。耐熱,又适醃漬,味佳,受市場欢迎。生長期 60~90 天,可作火雪



菜及秋雪菜。

栽培要点

(1)	播种期	定植期	收获期	产量
	芒种	小暑	立秋~秋分	25~30 担
	大暑	处暑	寒露~小雪	70~80 担
	雨水~惊蛰	清明~谷雨	立夏~夏至	60 担
	谷雨	直播	小暑~处暑	15~20 担

(2) 进行移植者,需做好苗床,床底用堆厩肥使土壤疏松肥沃。1~2 張真叶时間苗,苗期不超过 30 天。

(3) 整地施肥:定植前半月深耕土壤,施入基肥,定苗一月需追分蘖肥 1 次,最为重要,每亩用猪粪水 30~40 担,此外再追肥 2~3 次即可。


(4) 及时中耕除草,以利根系发育。

(5) 治虫:蚜虫及黄条跳虾为害用魚藤精、223 乳剂及敌百虫等防治。

八、甘 藍

1. 楊行大甘藍

性狀 外叶深綠色，叶形如蒲扇，叶脉凸出，結球扁圓形，顆緊密，球重4~5斤。



栽培要点

(1)	播种期	定植期	收获期	产量
	寒露	立春	小暑~秋分	60~80担

(2) 培育壯苗：稀播勤間，施足苗床基肥，及时治虫，苗期不要过長，使苗壯不徒長。

(3) 施肥：每亩施堆厩肥 100~200 担，河泥 300 担，分期追肥，特別在开始卷心时及卷心后应及时追肥，共計追肥3~4次。

(4) 及时治虫：地老虎用毒餌或堆草誘杀。青虫用可湿性 666 或 223 乳剂防治。

(5) 結球后，促进通风透光，可适当除老叶，雨后于老叶上打孔，防积水引起腐爛。

2. 本地黑叶小平头

性狀 外叶少，耐热，能作夏季栽培；秋栽結球緊密，且耐貯藏。