

全国卫生专业技术资格考试丛书

护理学专业（主管护师） 资格考试历年考题汇编及精解

北京大学护理学院 编写

免费赠送70元
网上学习费用

- ✓ 汇集主管护师资格考试历年真题
- ✓ 北京大学护理学院专家详解试题
- ✓ 透析命题规律，提高应试技巧
- ✓ 在线模考和网络课程增值服务，考前冲刺



北京大学医学出版社

中国医药出版社 中国医药出版社集团

护理学专业（主管护师） 资格考试历年考题汇编及精解

中国医药出版社集团 编著

- ★ 全国卫生专业技术资格考试大纲
- ★ 全国卫生专业技术资格考试指南
- ★ 最新考试大纲、最新考试大纲
- ★ 最新考试大纲、最新考试大纲、最新考试大纲



中国医药出版社集团

全国卫生专业技术资格考试丛书

护理学专业（主管护师）
资格考试历年考题汇编及精解

北京大学护理学院 编写

北京大学医学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

护理学专业 (主管护师) 资格考试历年考题汇编及精解/北京大学护理学院编写. —北京: 北京大学医学出版社, 2010. 1

ISBN 978-7-81116-834-1

I. 护… II. 北… III. 护理学—资格考核—解
题 IV. R47-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 217562 号

护理学专业 (主管护师) 资格考试历年考题汇编及精解

编 写: 北京大学护理学院

出版发行: 北京大学医学出版社 (电话: 010-82802230)

地 址: (100191) 北京市海淀区学院路 38 号 北京大学医学部院内

网 址: <http://www.pumppress.com.cn>

E-mail: booksale@bjmu.edu.cn

印 刷: 莱芜市圣龙印务有限责任公司

经 销: 新华书店

责任编辑: 许立 药蓉 曹霞 王智敏 责任校对: 金彤文 责任印制: 张京生

开 本: 787mm×1092mm 1/16 印张: 36.25 字数: 735 千字

版 次: 2010 年 1 月第 1 版 2010 年 1 月第 1 次印刷 印数: 1-5000 册

书 号: ISBN 978-7-81116-834-1

定 价: 68.00 元

版权所有, 违者必究

(凡属质量问题请与本社发行部联系退换)

出版说明

2004年，北京大学医学出版社组织北京大学护理学院的专家编写了全国首套全国卫生专业技术资格考试丛书（护理学专业）。此套丛书分执业护士含护士、护师、主管护师三个层次。五年里，此套丛书经广大考生广泛传阅与使用，经专家们几次改版与修订，在考生中建立了良好的口碑，并以其权威性和实用性成为全国卫生专业技术资格考试的品牌图书。

全国卫生专业技术资格考试丛书（主管护师）

◎ 护理学专业（主管护师）资格考试应试指导

紧扣最新大纲，精炼展现大纲内容。帮助考生系统复习大纲知识点。

◎ 护理学专业（主管护师）资格考试习题集

习题质量高，题量丰富，涵盖大纲全部考点。帮助考生在复习“应试指导”的基础上，利用做题来巩固知识点。

◎ 护理学专业（主管护师）资格考试全真模拟及精解

全真模拟考试情景，使考生熟悉答题思路。答案后附有解析，帮助考生了解考题难易度和考点分布。

◎ 护理学专业（主管护师）资格考试历年考题汇编及精解

汇总历年考试真题，专家解析。根据真题会重复出现的规律，反复练习可帮助考生透析命题规律，提高应试技巧。

答题说明

A1 型题：每道考题有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案。

A2 型题：每道考题是以一个小案例出现的，其下有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案。

A3 型题：提供一个案例，下设若干道考题。在每道考题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案。

A4 型题：提供一个案例，下设若干道考题。每道考题会逐步增加新的信息，根据题干及新增信息，在考题下的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案。

B 型题：提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个与问题关系最密切的答案。某个备选答案可以被选择一次、多次或不被选择。

目 录

第一篇 内科护理学

第一章	呼吸系统疾病病人的护理·····	(3)
第二章	循环系统疾病病人的护理·····	(20)
第三章	消化系统疾病病人的护理·····	(36)
第四章	泌尿系统疾病病人的护理 ·····	(52)
第五章	血液及造血系统疾病病人的 护理·····	(66)
第六章	内分泌与代谢性疾病病人的 护理·····	(77)
第七章	风湿免疫性疾病病人的护理 ·····	(89)
第八章	理化因素所致疾病病人的 护理·····	(94)
第九章	传染病病人的护理·····	(100)
第十章	神经系统疾病病人的护理 ·····	(117)

第二篇 外科护理学

第一章	水、电解质、酸碱代谢失调 病人的护理·····	(131)
第二章	外科休克病人的护理·····	(134)
第三章	多器官障碍综合征·····	(137)
第四章	麻醉病人的护理·····	(139)
第五章	复苏·····	(141)
第六章	外科重症监护·····	(143)
第七章	外科围手术期护理·····	(145)
第八章	疼痛病人的护理·····	(148)
第九章	外科营养支持病人的护理 ·····	(149)
第十章	外科感染病人的护理·····	(151)

第十一章	损伤病人的护理·····	(154)
第十二章	器官移植病人的护理·····	(156)
第十三章	肿瘤病人的护理·····	(157)
第十四章	颈部疾病病人的护理·····	(159)
第十五章	乳房疾病病人的护理·····	(163)
第十六章	腹外疝病人的护理·····	(165)
第十七章	急性化脓性腹膜炎 病人的护理·····	(167)
第十八章	腹部损伤病人的护理·····	(170)
第十九章	胃、十二指肠疾病 病人的护理·····	(172)
第二十章	肠疾病病人的护理·····	(175)
第二十一章	直肠肛管疾病病人的 护理·····	(180)
第二十二章	门静脉高压症病人的 护理·····	(182)
第二十三章	肝脏疾病病人的护理 ·····	(184)
第二十四章	胆道疾病病人的护理 ·····	(186)
第二十五章	胰腺疾病病人的护理 ·····	(188)
第二十六章	外科急腹症病人的护理 ·····	(191)
第二十七章	周围血管疾病病人的 护理·····	(193)
第二十八章	颅内压增高病人的护理 ·····	(195)
第二十九章	颅脑损伤病人的护理 ·····	(198)
第三十章	常见颅脑疾病病人的护理 ·····	(200)
第三十一章	胸部损伤病人的护理 ·····	(202)

第三十二章	脓胸病人的护理·····	(205)
第三十三章	肺部疾病外科治疗 病人的护理·····	(207)
第三十四章	食管癌病人的护理·····	(209)
第三十五章	心脏疾病病人的护理 ·····	(210)
第三十六章	泌尿、男生殖系统疾病的 主要症状和检查·····	(211)
第三十七章	泌尿系损伤病人的护理 ·····	(214)
第三十八章	泌尿系结石病人的护理 ·····	(216)
第三十九章	泌尿、男性生殖系结核 病人的护理·····	(217)
第四十章	泌尿系梗阻病人的护理 ·····	(219)
第四十一章	泌尿、男生殖系肿瘤 病人的护理·····	(221)
第四十二章	男性功能障碍、节育者的 护理·····	(223)
第四十三章	肾上腺疾病外科治疗 病人的护理·····	(224)
第四十四章	骨科病人的一般护理 ·····	(225)
第四十五章	骨与关节损伤病人的护理 ·····	(227)
第四十六章	骨与关节感染病人的 护理·····	(230)
第四十七章	腰腿痛及颈肩痛病人的护理 ·····	(232)
第四十八章	骨肿瘤病人的护理·····	(234)

第三篇 妇产科护理学

第一章	女性生殖系统的解剖与生理 ·····	(239)
第二章	妊娠期妇女的护理·····	(243)
第三章	分娩期妇女的护理·····	(249)
第四章	产褥期妇女的护理·····	(256)

第五章	新生儿保健·····	(261)
第六章	高危妊娠妇女的护理·····	(263)
第七章	妊娠期并发症妇女的护理 ·····	(267)
第八章	妊娠期合并症妇女的护理 ·····	(273)
第九章	异常分娩的护理·····	(279)
第十章	分娩期并发症妇女的护理 ·····	(282)
第十一章	产后并发症妇女的护理 ·····	(284)
第十二章	遗传咨询与产前诊断·····	(287)
第十三章	妇科护理病历·····	(287)
第十四章	女性生殖系统炎症病人的 护理·····	(288)
第十五章	月经失调病人的护理·····	(297)
第十六章	妊娠滋养细胞疾病病人的 护理·····	(303)
第十七章	妇科恶性肿瘤化疗病人的 护理·····	(306)
第十八章	妇科腹部手术病人的护理 ·····	(308)
第十九章	外阴、阴道手术病人的护理 ·····	(316)
第二十章	不孕症妇女的护理·····	(321)
第二十一章	计划生育妇女的护理 ·····	(325)
第二十二章	妇女保健·····	(331)
第二十三章	妇产科常用护理技术 ·····	(332)
第二十四章	妇产科诊疗及手术病人的 护理·····	(333)

第四篇 儿科护理学

第一章	绪论·····	(339)
第二章	生长发育·····	(339)
第三章	小儿保健·····	(344)
第四章	小儿营养与喂养·····	(347)

第五章	小儿心理、用药护理及护理技术	(350)
第六章	新生儿及新生儿疾病患儿的护理	(352)
第七章	营养性疾病患儿的护理	(358)
第八章	消化系统疾病患儿的护理	(362)
第九章	呼吸系统疾病患儿的护理	(367)
第十章	循环系统疾病患儿的护理	(371)
第十一章	血液系统疾病患儿的护理	(375)
第十二章	泌尿系统疾病患儿的护理	(379)
第十三章	内分泌系统疾病患儿的护理	(383)
第十四章	神经系统疾病患儿的护理	(387)
第十五章	免疫缺陷病和结缔组织病患儿的护理	(390)
第十六章	遗传性疾病患儿的护理	(393)
第十七章	常见传染病患儿的护理	(394)
第十八章	结核病患儿的护理	(398)
第十九章	寄生虫病患儿的护理	(402)
第二十章	急性中毒和常见急症患儿的护理	(403)

第五篇 社区护理学

第一章	社区护理学概论	(409)
第二章	社区护理基本工作方法	(412)
第三章	社区家庭护理	(419)
第四章	社区重点人群保健	(427)
第五章	社区常见慢性疾病的护理与管理	(432)
第六章	社区常见精神疾病病人的护理	

	与管理	(439)
第七章	社区常见传染病病人护理与管理	(443)
第八章	社区急重症病人的急救与转诊	(448)
第九章	社区病残者的康复护理	(453)
第十章	社区临终病人关怀与护理	(459)

第六篇 护理健康教育学

第一章	健康教育与健康促进	(465)
第二章	人类行为与健康相关行为	(465)
第三章	健康传播的方法与技巧	(475)
第四章	健康教育的步骤	(487)
第五章	医院健康教育	(487)

第七篇 医院感染护理学

第一章	医院感染护理学绪论	(501)
第二章	医院感染的微生物学原理	(503)
第三章	医院感染监测	(506)
第四章	消毒与灭菌	(510)
第五章	手、皮肤的清洁和消毒	(516)
第六章	医院环境的消毒	(520)
第七章	隔离与防护	(524)
第八章	合理使用抗感染药物	(528)
第九章	医院感染与护理管理	(532)
第十章	特殊病原菌的感染途径及消毒	(535)

第八篇 护理管理学

第一章	绪论	(543)
第二章	管理理论在护理管理中的应用	(545)
第三章	计划工作	(546)

第四章	组织工作·····	(550)	第八章	冲突与协调·····	(565)
第五章	护理人力资源管理·····	(554)	第九章	控制工作·····	(566)
第六章	领导工作·····	(558)	第十章	护理质量管理·····	(567)
第七章	组织沟通·····	(564)			

第一篇

内科护理学

第一章 呼吸系统疾病病人的护理

A1/A2 型题

1. 下列关于左、右主支气管的描述错误的是
- A. 气管在隆凸处分为左、右主支气管
 - B. 右主支气管较左主支气管粗、短、直
 - C. 进行气管插管时，若插入过深时易误插入右主支气管
 - D. 异物易吸入左主支气管
 - E. 肺脓肿好发于右肺与右主支气管的结构特点有关

【答案】D

【解析】气管在隆凸处分为左、右主支气管，右主支气管较左主支气管粗、短而陡直，因此异物或吸入性病变（如肺脓肿）多发生在右侧，气管插管过深时亦易误入右主支气管。

2. 关于慢性支气管炎的描述，哪项错误
- A. 指气管、支气管黏膜的慢性感染性炎症
 - B. 主要表现为咳嗽、咳痰或伴喘息
 - C. 常并发阻塞性肺气肿
 - D. 吸烟是其主要病因
 - E. 临床可分为单纯型、喘息型

【答案】A

【解析】慢性支气管炎是指气管、支气管黏膜及其周围组织的慢性非特异性炎症，可由感染或非感染因素（如理化刺激）引起，故 A 选项表述有误，其他选项均为慢性支气管炎的临床特点，护士应注意掌握。

3. 与慢性支气管炎发生与发展有关的重要因素是

- A. 过敏
- B. 感染
- C. 气候
- D. 吸烟
- E. 烟雾

【答案】B

【解析】慢性支气管炎的发病与吸烟、感染、大气污染、理化因素、气温突变、过敏及遗传等因素均有关。其中，吸烟为重要的发病因素，而感染是慢性支气管炎发生和发展的重要因素之一，慢性支气管炎患者急性发作最多见的原因因为细菌或病毒感染。

4. 慢性阻塞性肺疾病（COPD）最确切的定义是指

- A. 单纯性慢性支气管炎合并阻塞性肺气肿
- B. 喘息性慢性支气管炎合并阻塞性肺气肿
- C. 以气流受限为特征的肺部疾病
- D. 慢性支气管炎合并阻塞性肺气肿及肺心病
- E. 支气管哮喘合并阻塞性肺气肿及肺心病

【答案】C

【解析】此题考查 COPD 的定义。COPD 的确切定义是一种以气流受限为特征的肺部疾病，其气流受限不完全可逆，呈缓慢进行性发展，故此题正确答案为 C。从选项设置来看，该题旨在考查 COPD 与慢性支气管炎和肺气肿的关系，COPD

与慢性支气管炎或肺气肿密切相关，当慢性支气管炎或肺气肿患者肺功能检查出现气流受限并且不完全可逆时，则诊断为 COPD，考生应明确概念。

5. 阻塞性肺气肿患者最通常的主诉是

- A. 胸及胸骨后痛
- B. 发热和咳嗽
- C. 咳嗽和咳痰
- D. 气短
- E. 体重减轻

【答案】D

【解析】出现逐渐加重的呼吸困难是阻塞性肺气肿的标志性症状，初期仅在劳累时出现症状，随病情进展，静息时也感到呼吸困难，患者常主诉气短，故此题正确答案为 D。其他选项如咳嗽、咳痰、体重减轻等都可能出现，但均非阻塞性肺气肿患者特异性的最常见的主诉。

6. 阻塞性肺气肿肺功能检查最有价值的是

- A. 潮气量
- D. 肺活量
- C. 流量-容积（V，V）曲线测定
- D. 残气量（RV）及残气量/肺总量（RV/TLC）百分比测定
- E. 二氧化碳结合力升高

【答案】D

【解析】阻塞性肺气肿时，肺过度充气，肺内残气量增加，残气量占肺总量的百分比增高，因而肺功能检查肺总量（TLC）、残气量（RV）及残气量/肺总量（RV/TLC）百分比增加，对诊断有参考价值。

7. 指导慢性阻塞性肺气肿患者做腹式呼吸时，吸气与呼气时间之比为

- A. 1 : 1

B. 1 : 1.5

C. 1 : 2 或 1 : 3

D. 2 : 1

E. 1.5 : 1

【答案】C

【解析】正常的吸呼比是 1 : (1.5~2)，阻塞性肺气肿患者肺内过度充气，含气量增加，因此指导患者呼吸训练时，应延长呼气时间，一般为 1 : (2~3)，以利肺内气体的呼出。

8. 阻塞性肺气肿出现下列哪种情况即可诊断为呼吸衰竭

- A. 发绀、呼吸困难
- B. 出现神经精神症状
- C. 二氧化碳结合力升高
- D. 心慌、多汗、血压升高
- E. 动脉血氧分压低于 7.98kPa (60mmHg)

【答案】E

【解析】阻塞性肺气肿患者出现呼吸衰竭时，可表现为呼吸困难、发绀、神经精神症状及心血管系统的表现等，然而诊断呼吸衰竭的金标准是动脉血气分析，当动脉血氧分压低于 60mmHg 伴（或不伴）动脉血二氧化碳分压高于 50mmHg 时即可诊断呼吸衰竭。

9. 患者，男性，60 岁，咳嗽 3 年，每年冬季发作，每次持续 3 个月，有吸烟史，本例病情继续发展，最常见的并发症是

- A. 肺部感染
- B. 自发性气胸
- C. 肺心病
- D. 阻塞性肺气肿
- E. 支气管哮喘

【答案】D

【解析】根据题干描述，考虑该患者为慢性支气管炎，随病情进展，可并发慢性阻塞性肺气肿和慢性肺源性心脏病。

10. 肺炎链球菌肺炎出现铁锈色痰的最主要原因是

- A. 痰里有大量红细胞
- B. 痰里混有大量肺泡巨噬细胞
- C. 是纤维蛋白和红细胞结合的产物
- D. 红细胞破坏后释放含铁血黄素
- E. 痰里有大量血红蛋白

【答案】D

【解析】肺炎链球菌肺炎患者的痰液典型者呈铁锈色，主要原因是红细胞破坏后释放含铁血黄素所致，近年由于抗生素的应用，典型的铁锈色痰已不多见，此考点考查机会较少，考生了解即可。

11. 社区获得性肺炎最常见的病原菌是

- A. 军团菌
- B. 葡萄球菌
- C. 肺炎克雷伯杆菌
- D. 肺炎链球菌
- E. 铜绿假单胞菌

【答案】D

【解析】此题考查肺炎的病原学特点。按照感染来源，肺炎可分为社区获得性肺炎和医院获得性肺炎，社区获得性肺炎最常见的病原菌为肺炎链球菌，而医院获得性肺炎常见致病菌为革兰阴性杆菌（铜绿假单胞菌、肺炎杆菌等），其次为金黄色葡萄球菌、真菌等。

12. 肺真菌病诊断主要依靠

- A. 临床表现
- B. X线典型表现
- C. 血清学试验
- D. 抗原皮肤试验
- E. 痰真菌培养及菌型鉴定

【答案】E

【解析】近年来，由于人口老化和广谱抗生素等药物的广泛应用，肺真菌感染有逐渐增多趋势，应引起重视，然而本

病症状、体征及X线征象多无特征性，诊断较为困难，此题对护士而言难度较大，但考生在答题的过程中，应注意方法，肺真菌感染作为肺炎的一种类型，也遵循肺炎诊断的一般原则，即痰涂片或痰培养见到病原体可提示诊断。

13. 关于医院获得性肺炎，哪项不正确

- A. 多继发于有各种原发疾病的危重患者，治疗困难
- B. 革兰阳性球菌所占比例最高，常为混合感染
- C. 耐药细菌日益增多
- D. 一些非致病菌亦常导致医院获得性肺炎
- E. 在医院内感染的肺炎

【答案】B

【解析】此题从定义、易患人群、病原学及治疗等方面考查医院获得性肺炎的临床特点，应注意医院获得性肺炎常见致病菌为革兰阴性杆菌。

14. 关于肺炎链球菌肺炎，下列哪项错误

- A. 可表现为大叶性肺炎或小叶性肺炎
- B. 一般不引起肺组织坏死或形成空洞
- C. 肺炎消散后，多留有纤维瘢痕
- D. 治疗首选青霉素
- E. 少数患者可并发脓胸

【答案】C

【解析】此题从肺炎链球菌的病理变化和治疗方面考查考生对该病的掌握情况，但这道题可从总体上把握。常见的病原体所致肺炎中除了金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌和肺炎克雷伯杆菌等可引起肺组织的坏死性病变更易形成空洞外，肺炎治愈后多不遗留瘢痕，肺的结构和功能均可恢复，由此可知肺炎链球菌肺炎待肺炎消散后，一般不遗留瘢痕。

15. 关于肺炎链球菌肺炎的临床表现，下列哪项是错误的

- A. 最常见的症状是突发的寒战、发热、咳嗽、咳痰与胸痛
- B. 咳痰呈红棕色胶冻状
- C. 可出现呕吐、腹痛、腹泻
- D. 严重者可出现昏迷
- E. 可出现发绀与口周疱疹

【答案】B

【解析】肺炎链球菌肺炎作为一个典型的病原体感染所致肺炎，是历年考查的重点，护士应重点掌握其病理变化、临床特点及治疗要点。此题考查肺炎链球菌肺炎的临床特点，其最常见的症状是突发的寒战、发热、咳嗽、咳痰与胸痛，典型的痰液呈铁锈色，多有上呼吸道感染（可见口周疱疹）的前驱症状，可出现呕吐、腹痛、腹泻，严重感染时可因伴发休克、ARDS 等而出现呼吸困难、发绀、昏迷等表现。红棕色胶冻状痰是肺炎杆菌肺炎痰液的典型表现，故此选项错误。

16. 最常见的成人肺结核是

- A. 原发型肺结核
- B. 血行播散型肺结核
- C. 浸润型肺结核
- D. 慢性纤维空洞型肺结核
- E. 结核性胸膜炎

【答案】C

【解析】此题是关于肺结核分型常见的考查内容。原发型肺结核多见于少年儿童和初进大城市的成年人，而成人最常见的肺结核类型是浸润型肺结核。

17. 肺结核大咯血最主要的致死原因是

- A. 失血性休克
- B. 重度贫血
- C. 窒息

D. 心力衰竭

E. 呼吸衰竭

【答案】C

【解析】大咯血患者主要的并发症是窒息和失血性休克，其中窒息是咯血致死的主要原因，此考点是历年考查的重点，考生应重点掌握。

18. 为预防肺结核的发生和流行，在下列措施中最为关键的一项是

- A. 自出生后开始定期接种卡介苗
- B. 隔离排菌结核患者
- C. 合理化疗治愈排菌患者
- D. 加强营养，锻炼身体，增强抵抗力
- E. 为易感者及密切接触排菌患者预防性投药

【答案】C

【解析】关于肺结核的预防，在肺结核流行的各个环节均应重视，如传染源的隔离、化疗，痰液的消毒处理，易感人群的预防接种，密切接触者的预防性化疗等，其中最为关键的措施是对传染源即排菌患者的合理化疗，这是最为有效和积极的控制肺结核流行的措施。

19. 最简便的杀灭结核分枝杆菌的方法是

- A. 阳光暴晒 2 小时
- B. 煮沸 1 分钟
- C. 70%酒精接触 2 分钟
- D. 来苏水接触 2~12 小时
- E. 直接焚烧带有病菌的痰纸

【答案】E

【解析】此题考查肺结核病人的消毒隔离，是历年考查的重点，护士应熟练掌握。痰菌阳性的病人是肺结核主要的传染源，患者的痰液干燥后结核菌随尘埃飞扬引起结核感染，而结核分枝杆菌对外界的抵抗力较强，但在烈日暴晒下 2 小时，与 70%酒精接触 2 分钟或煮沸 5

分钟均能被杀死。痰液较多时也可在痰杯内加入等量的1%消毒灵浸泡1小时后弃去,来苏水(5%石炭酸)则需24小时才能杀灭病菌,而将痰液吐在纸上直接焚烧相对以上方法而言最为简便。

20. 关于结核菌素试验检查的意义,不正确的是

- A. 阴性提示肯定没有结核分枝杆菌感染
- B. 阳性仅表示感染,不一定患病
- C. 结核分枝杆菌感染的4~8周内,结核菌素试验可为阴性
- D. 应用免疫抑制剂者可为阴性
- E. 严重结核病患者对结核菌素试验可无反应

【答案】A

【解析】该题考查对结核菌素试验结果的判断。结核菌素试验阴性除提示没有结核分枝杆菌感染外,还见于结核分枝杆菌感染的4~8周内及人体免疫力和变态反应暂时受抑制的情况,如应用糖皮质激素、严重结核病、各种危重病患者和老年人;阳性仅表示结核感染,并不一定患病。

21. 关于原发型肺结核,下列哪项是错误的

- A. 初次感染部位多在上叶底部、中叶和下叶上部
- B. 结核分枝杆菌可引起淋巴管炎和淋巴管炎
- C. 容易出现空洞和排菌
- D. 症状多轻微而短暂
- E. 多发生于儿童

【答案】C

【解析】此题考查原发型肺结核的临床特点,考生应结合继发型肺结核,区别记忆。原发型肺结核多发生于儿童和初进城市的成年人,原发病灶通常可见于

肺上叶底部、中叶或下叶上部,结核分枝杆菌从原发病灶通过淋巴管到达肺门淋巴结,引起淋巴管炎和肺门淋巴结炎,称为原发综合征,症状多轻微而短暂;与其相区别,继发型肺结核多发生在成人,其常见类型浸润型肺结核病灶多在肺尖和锁骨下,继发型肺结核有明显的临床症状,易出现空洞和排菌。

22. 关于慢性呼吸衰竭的患者,下列哪项处理不利于呼吸道通畅

- A. 糖皮质激素
- B. 采用快速利尿剂
- C. 口服或雾化祛痰剂
- D. 痰液黏稠者补液
- E. 无力排痰者翻身拍背

【答案】B

【解析】呼吸衰竭患者的首要治疗是保持气道通畅。慢性呼吸衰竭常见于COPD等患者,多存在痰液黏稠,导致气道堵塞,因而其通畅气道的措施应以稀释痰液、促进痰液排出为目标,通过祛痰、抗炎、补液及翻身拍背等措施,可达到清除气道分泌物,保持气道通畅。而快速利尿则会使痰液黏稠,堵塞气道,不利于气道的通畅,故B选项错误。

23. 严重Ⅱ型呼吸衰竭不宜高浓度给氧的原因是

- A. 缺氧不是主要原因
- B. 可引起氧中毒
- C. 降低颈动脉窦化学感受器的兴奋性
- D. 促使二氧化碳排出过快
- E. 诱发代谢性碱中毒

【答案】C

【解析】此题考查Ⅱ型呼吸衰竭患者低浓度($<30\% \sim 35\%$)给氧原则的依据。其原因为慢性Ⅱ型呼吸衰竭病人呼