

中等學校用

葛·斯·密·平面三角學

全一冊

葛蘭維爾 原著

密克許 斯密 訂修

立金 藩譯述

中華書局印行

民國三十五年九月三版

中等學校用

葛斯密平面三角學（全一冊）

（郵運匯費另加）

原著者

葛蘭維爾

修訂者

密斯密

譯述者

立克密許斯

有不著准作翻印權

發行人

金姚載

發行處

各埠中華書局

上海澳門路四六九號

中華書局有限公司代表

中華書局永寧印刷廠

序　　言

本書原名 Granville's Plane Trigonometry(葛氏平面三角學),係美國名數學家 W.A.Granville 原著, P. F. Smith 及 J. S. Mikesh 二氏修訂。葛氏原著不特風行全美,即我國各中學採用其原版及譯本者,亦指不勝屈。近來我國新編之三角學,亦率以葛氏原著為藍本及參考。江蘇省教育廳所頒布之三角學進度錄,大體即依該書之順序。葛氏原著之價值,於此可見一斑。惟原著尚有數處未能令人滿意者:如論三角函數時,將銳角及任意角分別論述,易滋初學者之誤解;敍述三角恆等式不甚透徹,且取材稍嫌簡略;對於有效數值及表之準確度未曾論及;正切定律及由邊求半角正切公式等均係用和差公式證明,不能提前應用;此外尚有不經意之錯誤數處。今修訂本中,此等缺陷已全由斯密二氏一一詳為修正補足,堪稱完璧矣。至原著中之優點,如說理詳明,選材適當,習題豐富,條分縷析,井然有序,且多用歸納法,以養成學者之理解力;注重基本觀念,以啟發自動研究之心理;凡此種種,修訂本仍能全部保存。茲更將修訂本之特點舉述於下:

- (1) 次序已完全重行排列,較之原本更為合理化(詳見原序)。
- (2) 三角函數一章,將銳角及任意角同時討論,藉免隔閡。
- (3) 第六章三角分析,關於三角恆等式及三角方程式,均已重行演述,使初學者更易瞭解。
- (4) 關於有效數值及表之準確度,均有詳細之說明。
- (5) 應用問題及對數均另列一章,增加伸縮之彈性。

(6) 例題增多，提供初學者以解題時最簡明之範式。

(7) 習題增加約五分之一，不特材料豐富，且取材頗合實用，多為測量及物理學中之實際問題。

修訂本中雖仍有二三處不經意之錯誤，譯者已為之更正，並加附註說明。惟譯者學識謬陋，錯誤難免，深望海內鴻博不吝賜教，俾於再版時更正，則獲益者當不止譯者已也。

本書於迄譯時，承程青心先生鼓勵敦促，譯竣後又詳為校訂，不勝感激，敬附數語，以致謝惱！

譯者謹識於東吳大學

原序

葛氏平面三角學之所以能風行一時，而為教師及學生所樂於採用者，其特點在簡明之解釋，豐富之例題，以及大量廣遍之應用問題。此等特點，著者於修訂此書時未敢或忘也。本書中所有更改之處，目的在變更其着重之點——即着重三角函數之由於直角三角形所演化者。修訂本中於函數之形式，以簡潔明晰之方式表明之。解釋函數之後，即繼以第四及第五兩章“應用問題”，一章以對數求解，另一章不用對數求解。其後更繼以“三角分析”一章。尤可注意者，此章有數處更改，更足以引起學生之興趣；而於“三角恆等式”及“三角方程式”等，均已重為修訂。此項編制可使學者在未習三角分析以前，將應用問題完全修畢。

本書與初版同，仍沿用四位數值表。但於葛氏四位數值表中，更加入第IV及第V兩表；表IV係正弦及餘弦之自然值，表V係正切及餘切之自然值。此外更加入各表用法之說明。此二表上所列之數值，均與原有其他諸表一致，在計算上可至四位準確度。另一着重點，即在原有諸表與新加入二表中，凡未將四位有效數字表出者，均加以如何求得此四位有效數字方法之說明。

本書所有習題內之角度，仍根據初版之意旨，用度及分

數或度及度之小數部份表明之。至量角之方法，則悉憑教師選擇，蓋表中之數值，對於任何一種習題均能引用也。

目 次

第一章 三角函數

節 數	頁 數
1. 三角學	1
2. 變數; 常 數	1
3. 函 數	1
4. 銳角之三角函數	1
5. $45^\circ, 30^\circ, 60^\circ$ 之函數	5
6. 作圖; 量角器	10
7. 三角函數之數值表	10
8. 角之產生	13
9. 正角與負角	13
10. 任何量之角	14
11. 四象限	14
12. 平面內一點之直坐標	16
13. 任意角三角函數之定義	18
14. 三角函數之代數符號	20
15. 應用	20
16. 以一三角函數表其餘五三角函數	28

第二章 基本關係式; 減角公式

17. 基本關係式	31
18. 任一函數以其他五函數之每個表之	33
19. 一數被零所除; 無窮數	37

20.	$0^\circ, 90^\circ, 180^\circ, \text{及 } 270^\circ$ 等角之函數	38
21.	角之量度	41
22.	弧制	41
23.	化三角函數為銳角之函數	47
24.	餘角之函數	47
25.	第二象限內角之減角公式	48
26.	第三象限內角之減角公式	52
27.	第四象限內角之減角公式	55
28.	負角函數之化法	58
29.	化任意角函數為銳角函數之總則	59

第三章 線值定義及圖解

30.	三角函數之線值定義	65
31.	變角之函數變值	67
32.	函數之圖形	71
33.	三角函數之圖形	73
34.	三角函數之週期性	76
35.	用單位圓作三角函數之圖形	77

第四章 應用

36.	本章之目的;近似值之計算	82
37.	根據直角三角形之習題	84
38.	正弦及餘弦之數值表;補插法	92
39.	正切及餘切之數值表	95
40.	三角問題內常用之名詞	96

41.	斜三角形之解法.....	102
42.	正弦定律.....	103
43.	已知兩邊及一對角之疑款.....	106
44.	正切定律.....	112
45.	餘弦定律.....	116
46.	以三角形之邊表其半角之三角函數.....	120
47.	求斜三角形面積之公式.....	127
48.	結論.....	130

第五章 對數之理論及應用

49.	對數在三角學上之需要.....	131
50.	對數性質之定理.....	134
51.	常用對數系.....	137
52.	定常用對數定位部之規則.....	139
53.	對數表.....	141
54.	求一已知數之對數法.....	142
55.	求與一已知對數相當之數.....	147
56.	對數在計算上之應用.....	148
57.	餘對數.....	151
58.	對數底之變換.....	154
59.	指數方程式.....	156
60.	三角函數對數表之用法.....	158
61.	表 II 之用法, 其已知角或所求角皆以度及分表示者.....	159
62.	以度及分表示一角時, 求其函數之對數法.....	160

63. 已知一角函數之對數求此角之度及分數.....	162
64. 表 III 之用法,其已知角或所求角以度及度之小 數部份表示者.....	167
65. 對數在解直角三角形上之應用.....	172
66. 對數在解斜三角形上之應用.....	180
67. 應用對數求斜三角形之面積.....	199
68. 陸地面積之測量.....	203
69. 平行航海.....	204
70. 平面航海.....	206
71. 中緯航海.....	208

第六章 三角分析

72. 兩角和及差之函數.....	211
73. 兩角和之正弦及餘弦.....	211
74. 兩角差之正弦及餘弦.....	215
75. 兩角和及差之正切及餘切.....	217
76. 以一角之函數表其二倍角之函數.....	221
77. 倍角之函數.....	222
78. 以半角之函數表其一角之函數.....	225
79. 以一角之餘弦表其半角之函數.....	225
80. 函數之和及差.....	226
81. 三角恆等式.....	231
82. 三角方程式.....	236
83. 解三角方程式之通則.....	237
84. 已知一函數,求其角之通式.....	243

85. 反三角函數.....	246
----------------	-----

第七章 近於 0° 或 90° 之銳角

86. 定理.....	252
87. 近於 0° 及 90° 諸正銳角之函數.....	253
88. 求近於 0° 諸銳角函數之規則.....	254
89. 求近於 90° 諸銳角函數之規則.....	255
90. 求近於 0° 及 90° 諸角函數之對數之規則.....	256

第八章 公式摘要

平面三角學中之公式：

直角三角形.....	266
函數間之基本關係式.....	266
正弦定律.....	266
正切定律.....	266
餘弦定律.....	267
以三角形之邊表其半角之函數.....	267
三角形之面積.....	267
兩角和及差之函數.....	267
二倍角之函數.....	268
以半角之函數表其一角之函數.....	268
半角之函數.....	268
函數之和及差.....	269
索引.....	270

[附 錄] 四 位 數 值 表

表 I

頁數

1—5

自然數之對數.....	1—5
求近於 0° 及 90° 諸角三角函數之對數之規則.....	6

表 II

三角函數之對數,其角度以度及分數表示者.....	7—16
角量變化表.....	17

表 III

三角函數之對數,其角度以度及度之小數部份表示者.....	19—37
------------------------------	-------	-------

表 IV

正弦及餘弦之自然值.....	40—41
----------------	-------	-------

表 V

正切及餘切之自然值.....	42—43
----------------	-------	-------

葛·斯·密·平面三角學

第一章 三角函數

1. 三角學。在三角學中，吾人所研究之數量，常稱之為三角函數(trigonometric functions)。本章之目的，即在說明此等函數之定義，及其初步應用之方法。

2. 變數;常數。問題中所含有之數量，非為變數，即屬常數。吾人對於此二種數量之意義，必須得一明晰之區別。變數(variable)者，可視為無限個多之數量，在問題中可代表任何數值。通常以英文字母之末尾數字，如 x, y, z 等表示之。

常數(constant)之值，在一個問題中，固定不變。數值常數或絕對常數(numerical or absolute constants)，在任何習題中，其所表之值常屬一定，如 $2, 5, \sqrt{7}, \pi$ 等。此等常數，恆以英文之首數字母，如 a, b, c 等表示之。

3. 函數。變數之函數者，其數值恆隨此變數之值而改變。正方形之面積，為其一邊長度之函數；球形之體積，為其直徑之函數。同理，三項式 $x^2 - 7x - 6$ ，亦為 x 之函數。因此一三項式之數值，須視 x 之值而定。在三角函數中，其變數即為角之度量，因此等函數之值，常隨其所設角之大小而定也。目前，吾人暫以度制表示角之大小；以後，再討論角之第二種量度法。

4. 銳角之三角函數。兩線間交角之概念，諒讀者已熟習之矣；此與初等平面幾何學中所示者，其意義相同。本節吾人即就銳角而論列之。

設令 EAD 為小於 90° 之角，此即為一銳角。自此角之一邊上，任取一點 B ，向其他一邊作一垂線，即成一直角三角形，如 ABC 。在此三角形中，以英文之大寫字母 A, B, C 表各角之度量，以小寫字母 a, b, c 表其相對邊之長度*。吾人在幾何學中，已習知此一三角形之邊與角均有相互之關係。三角學之發軔，即在研究此項邊角關係之準確性，並使用邊之比值以達此目的。此等邊之比值，即稱為三角函數。茲將任一銳角如 A 之六個三角函數舉之如下：

$\sin A$ ，讀作“ A 之正弦”；

$\cos A$ ，讀作“ A 之餘弦”；

$\tan A$ ，讀作“ A 之正切”；

$csc A$ ，讀作“ A 之餘割”；

$\sec A$ ，讀作“ A 之正割”；

$\cot A$ ，讀作“ A 之餘切”。

此等三角函數(比值)之定義，可述之如下(參閱上圖)。


$$(1) \quad \sin A = \frac{\text{對邊}}{\text{斜邊}} (= \frac{a}{c}); \quad (4) \quad \csc A = \frac{\text{斜邊}}{\text{對邊}} (= \frac{c}{a});$$

$$(2) \quad \cos A = \frac{\text{鄰邊}}{\text{斜邊}} (= \frac{b}{c}); \quad (5) \quad \sec A = \frac{\text{斜邊}}{\text{鄰邊}} (= \frac{c}{b});$$

$$(3) \quad \tan A = \frac{\text{對邊}}{\text{鄰邊}} (= \frac{a}{b}); \quad (6) \quad \cot A = \frac{\text{鄰邊}}{\text{對邊}} (= \frac{b}{a}).$$

在上述之定義中，有一顯而易見而又極重要之事項；即上列任一函數之數值，祇視 A 角之大小而定，與垂線之端點

*除特別情形外，普通恆以小寫字母 c 表直角三角形之斜邊，以大寫字母 C 表直角。



B 之位置無關。

令 B' 為 AD 上之其他任一點，而 B'' 為 AE 上之任一點。作 $B'C'$ 及 $B''C''$ 各垂直於 AE 及 AD ，則此三個三角形 $ABC, AB'C', AB''C''$ ，因皆含有一直角及一公共角 A ，故均為互等角三角形而相似，且有相似比：

$$\frac{BC}{AB} = \frac{B'C'}{AB'} = \frac{B''C''}{AB''}.$$

上列諸比式，均為“ A 之正弦”。吾人可由同法證明其他諸函數亦有此相同之性質。由此可知三角函數與直角三角形之大小無關，蓋三角函數之意義，乃各邊相對長度之比值，故各邊之真實長度，並不視為重要。

惟讀者所宜注意者，即以上六個比值中之每一數值，均隨 A 角之數量而更變。


以上所述之六個三角函數（比值），實為研究三角學之重要基礎。讀者於上述六個函數之定義，若不徹底了解，而欲作進一步之探討，實不可能。然苟能注意第一縱行之三函數各為第二縱行三函數之逆數，則記憶亦甚簡易。因

$$\sin A = \frac{a}{c} = \frac{1}{\frac{c}{a}} = \frac{1}{\csc A}; \quad \csc A = \frac{c}{a} = \frac{1}{\frac{a}{c}} = \frac{1}{\sin A};$$

$$\cos A = \frac{b}{c} = \frac{1}{\frac{c}{b}} = \frac{1}{\sec A}; \quad \sec A = \frac{c}{b} = \frac{1}{\frac{b}{c}} = \frac{1}{\cos A};$$

$$\tan A = \frac{a}{b} = \frac{1}{\frac{b}{a}} = \frac{1}{\cot A}; \quad \cot A = \frac{b}{a} = \frac{1}{\frac{a}{b}} = \frac{1}{\tan A}.$$

若應用定義(1)至(6)於上圖之銳角 B 上，則對邊 $= AC =$



b , 鄰邊 $= BC = a$. 故

$$\sin B = \frac{b}{c};$$

$$\csc B = \frac{c}{b};$$

$$\cos B = \frac{a}{c};$$

$$\sec B = \frac{c}{a};$$

$$\tan B = \frac{b}{a};$$

$$\cot B = \frac{a}{b}.$$

設與 A 角之諸函數比較之, 可知

$$\sin A = \cos B; \quad \csc A = \sec B;$$

$$\cos A = \sin B; \quad \sec A = \csc B;$$

$$\tan A = \cot B; \quad \cot A = \tan B.$$

因 $A+B=90^\circ$ (此即 A 與 B 互為餘角), 故上列之結果, 可簡述之如下:

定理. 一銳角之函數等於其餘角之餘函數* (co-function.)

上述定理可錄之如下:

$$\sin A = \cos(90^\circ - A); \quad \csc A = \sec(90^\circ - A);$$

$$\cos A = \sin(90^\circ - A); \quad \sec A = \csc(90^\circ - A);$$

$$\tan A = \cot(90^\circ - A); \quad \cot A = \tan(90^\circ - A).$$

例 1. 一直角三角形 $a=3$, $b=4$; 試計算 A 角之諸函數.


解. $c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5.$

應用公式(1)至(6),

$$\sin A = \frac{3}{5}; \quad \csc A = \frac{5}{3};$$

$$\cos A = \frac{4}{5}; \quad \sec A = \frac{5}{4};$$

$$\tan A = \frac{3}{4}; \quad \cot A = \frac{4}{3}.$$



*正弦與餘弦謂之互為餘函數. 同理, 正切與餘切以及正割與餘割, 亦均互為餘函數.

試再求 B 角之諸函數，並比較其結果。


例 2. 一直角三角形 $a=3$, $c=4$; 試計算 B 角之諸函數。

$$\text{解. } b = \sqrt{c^2 - a^2} = \sqrt{16 - 9} = \sqrt{7}.$$

$$\sin B = \frac{\sqrt{7}}{4} = 0.66; \quad \csc B = \frac{4}{\sqrt{7}} = \frac{4\sqrt{7}}{7} = 1.51;$$

$$\cos B = \frac{3}{4} = 0.75; \quad \sec B = \frac{4}{3} = 1.33;$$

$$\tan B = \frac{\sqrt{7}}{3} = 0.88; \quad \cot B = \frac{3}{\sqrt{7}} = \frac{3\sqrt{7}}{7} = 1.14.$$



試再求 A 角之諸函數，並比較其結果。

例 3. 一直角三角形中， $a=2mn$, $b=m^2-n^2$; 試計算 A 角之諸函數。

$$\text{解. } c = \sqrt{a^2 + b^2}$$


$$= \sqrt{4m^2n^2 + m^4 - 2m^2n^2 + n^4}$$

$$= \sqrt{m^4 + 2m^2n^2 + n^4} = m^2 + n^2.$$

$$\sin A = \frac{2mn}{m^2 + n^2}; \quad \csc A = \frac{m^2 + n^2}{2mn};$$

$$\cos A = \frac{m^2 - n^2}{m^2 + n^2}; \quad \sec A = \frac{m^2 + n^2}{m^2 - n^2};$$

$$\tan A = \frac{2mn}{m^2 - n^2}; \quad \cot A = \frac{m^2 - n^2}{2mn}.$$



例 4. 設一直角三角形中， $\sin A = \frac{4}{5}$, $a=80$; 試求 c 。

解. 由公式(1)知

$$\sin A = \frac{a}{c}.$$

以 $\sin A$ 及 a 之值代入，則得

$$\frac{4}{5} = \frac{80}{c},$$

解之， $c=100$. (答).

5. $45^\circ, 30^\circ, 60^\circ$ 之函數. 用三角法解習題時， $45^\circ, 30^\circ$, 及 60° 之角為最常遇到，故必須求得此等角度之三角函數值而熟