

2010年 **全国卫生专业技术资格考试**

护理专业初级（护士） **全真模拟题·考纲精解**

协和护理考试编写组 编

HULI
ZHUANYECHUJI(HUSHI)
QUANZHENMONITI·KAOGANGJINGJIE

- 吃透2010最新考纲，事半功倍通过考试
- 6套完整试卷，真实模拟考试实战
- 500道试题解析，重点、难点深入讲解
- 附赠考纲精编，提纲挈领把书读薄
- 资深考试专家全天候网络答疑

福建科学技术出版社
FUJIAN SCIENCE & TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE

2010 年 全国卫生专业技术资格考试

护理专业初级（护士） 全真模拟题·考纲精解

协和护理考试编写组 编

福建科学技术出版社
FUJIAN SCIENCE & TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

2010 年全国卫生专业技术资格考试护理专业初级 (护士)
全真模拟题·考纲精解/协和护理考试编写组编. —福州:
福建科学技术出版社, 2010.1
ISBN 978-7-5335-3486-8

I. 2… II. 协… III. 护理学—医药卫生人员—资格考
核—自学参考资料 IV. R47

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 197785 号

书 名	2010 年全国卫生专业技术资格考试护理专业初级 (护士) 全真模拟题·考纲精解
编 者	协和护理考试编写组
出版发行	福建科学技术出版社 (福州市东水路 76 号, 邮编 350001)
网 址	www.fjstp.com
经 销	各地新华书店
排 版	福建科学技术出版社排版室
印 刷	人民日报社福州印务中心
开 本	787 毫米×1092 毫米 1/16
印 张	24.75
字 数	695 千字
版 次	2010 年 1 月第 1 版
印 次	2010 年 1 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-5335-3486-8
定 价	38.00 元

书中如有印装质量问题, 可直接向本社调换

前 言

护理专业执业资格考试，不论对即将走上护理岗位的卫生院校应届生，还是对面临晋升的护士和护师而言，都十分重要。因为护理专业的执业资格考试涉及临床内、外、妇、儿方方面面的医学知识，对于各种临床常见疾病都有不同程度的要求，如不能吃透护理执业资格考试的考试大纲，复习的难度会相当大，并容易走入误区，反而事倍功半。为了让读者能有针对性地进行复习，并在较短的时间内完成考试准备，我们组织了北京协和医学院和北京大学医学部等医学高校有经验的作者共同编写了这套护理专业执业资格考试辅导丛书。

在此，我们对准备护理执业资格考试的读者提几点建议。

1. 对考试的复习，一定要围绕考试大纲进行。虽然每年考纲的变化基本上只是微调，但也需要做到心中有数。对于新增加的内容要格外重视，使用的习题应能体现新的考试大纲内容。

2. 历年的真题是复习的切入点。读者首先要明白执业资格考试总是围绕着临床护理最重要、最基础的知识点，这是出题的基本原则。因此在历年的护理考试中，每年必考的知识点占了 50%，这说明对以往真题所涉及的考点需要牢固地掌握，并对相关和类似的知识点要进行全面复习。自我测试使用的模拟题的难度和风格，要接近历年真题。

3. 复习须找准薄弱环节。若读者主要从事内科护理，自然内科是强项，相对而言其他科就是弱项。由于考试并不是按照内、外、妇、儿分成四个单元，而是按照基础知识、相关专业知识、专业知识和专业实践能力分成四个单元，因此有必要在备考过程中针对性地进行学习。从历年考试成绩统计看，专业实践能力的通过率接近 70%，而相关专业知识通过率不到 40%，所以，建议读者要在相关专业知识即有关临床辅助检查、诊断方面的知识多花些精力。

4. 要保证有 3 个月的复习时间，并须完成一定题量的习题以及模拟题训练。复习要以一定的题量为保证，这点毋庸置疑，少于 5000 题的训练量，是难以达到考试要求的。此外，在完成本书习题和自测题的过程中，读者要注意对考点（知识点）灵活地去理解和掌握，而不能仅仅简单地去背题。

我们相信，结合上面总结的复习建议，在完成本书习题的基础上有计划地进行复习，通过考试并不困难。

编者

2009 年 12 月

题型示例

(一) A1 型题 (单句型最佳选择题)

题型说明：每一道考试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

1. 南丁格尔首创科学的护理事业的时间是

- A. 16 世纪中叶
- B. 17 世纪中叶
- C. 18 世纪中叶
- D. 19 世纪中叶
- E. 20 世纪中叶

答案：D

(二) A2 型题 (病例摘要型最佳选择题)

题型说明：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案从中选择一个最佳答案。

1. 王某，患十二指肠溃疡，突然呕血，面色苍白，脉搏 120 次/分，血压 60/45mmHg。医嘱输血 400ml。给患者输血的目的是补充

- A. 凝血因子
- B. 血红蛋白
- C. 血小板
- D. 抗体
- E. 血容量

答案：E

(三) A3 型题 (病例组型最佳选择题)

题型说明：提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。根据考题所提供的信息，在每一道考题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案。

(1~3 题共用题干)

女性，35 岁，患风湿性心脏病二尖瓣狭窄，心房颤动 5 年，近来体力活动后心慌气短，下肢水肿，在门诊给予地高辛药物治疗。

1. 为减轻心脏负荷采取的护理措施是

- A. 照常活动
- B. 稍事活动，增加间歇休息时间
- C. 绝对卧床休息
- D. 限制活动，多卧床休息
- E. 逐渐增加活动量

答案：B

2. 给地高辛的主要目的是

- A. 减慢心率
- B. 扩张动脉

- C. 扩张静脉
 - D. 增强心肌收缩力
 - E. 利尿作用
- 答案: A

3. 在服药过程中出现下列哪种情况考虑地高辛中毒
- A. 脉率减慢为 78 次/分
 - B. 脉律转规则
 - C. 水肿消退
 - D. 无心慌、气短
 - E. 体重减轻
- 答案: B

(四) A4 型题 (病例串型最佳选择题)

题型说明: 提供若干个案例, 每个案例下设若干道考题。根据考题所提供的信息, 在每一道考题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案。

(1~3 题共用题干)

男性, 65 岁, 突然出现原因不明的上腹痛, 恶心、呕吐、血压下降

1. 应首先考虑可能发生
- A. 急性胃肠炎
 - B. 食物中毒
 - C. 胃癌
 - D. 急性心肌梗死
 - E. 急性胰腺炎
- 答案: D

2. 护理上述病例, 下列哪项措施不需要
- A. 监测血压
 - B. 监测心电图
 - C. 拍 X 线胸片
 - D. 抽血查心肌酶
 - E. 查血、尿、便常规
- 答案: C

3. 护理上述病例, 首要的护理措施是
- A. 吸氧
 - B. 监测生命体征
 - C. 建立静脉通路
 - D. 绝对卧床休息
 - E. 心理护理
- 答案: D

编者按: 在表面形式上 A4 与 A3 无差别, 差别在具体医学知识的考察方式上。一般不做区分。

(五) B1 型题 (标准配伍题)

题型说明: 提供若干组考题, 每组考题共用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。从中选择一个与问题关系最密切的答案, 某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(1~2 题共用备选答案)

- A. 贫血重而出血轻
- B. 贫血与出血相一致
- C. 贫血轻而出血重
- D. 有贫血而无出血
- E. 无贫血而有皮下出血

1. 慢性再生障碍性贫血的特点是

答案: A

2. 缺铁性贫血的特点是

答案: D

(六) X 型题 (多选题)

题型说明: 每一道考试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个或多个符合题意的答案。

1. 急性特发性血小板减少性紫癜的临床特点是

- A. 儿童多见
- B. 多有病毒感染史
- C. 血小板明显减少
- D. 不能自行缓解
- E. 不可能出现内脏出血

答案: A、B、C

编者按: 从 2007 年起护士师类考试删除了 10% 的 X 型题。书中真题部分 X 型题进行了保留, 习题部分只选编了 A 型题和 B 型题。

目 录

模拟试卷一	(1)
基础知识	(2)
相关专业知识	(8)
专业知识	(15)
专业实践能力	(21)
答案与解析	(37)
基础知识	(37)
相关专业知识	(41)
专业知识	(44)
专业实践能力	(48)
模拟试卷二	(51)
基础知识	(52)
相关专业知识	(58)

相关专业知 识	(188)
专业知 识	(192)
专业实践能力	(194)
模拟试卷五	(199)
基础知识	(200)
相关专业知 识	(207)
专业知 识	(213)
专业实践能力	(220)
答案与解析	(237)
基础知识	(237)
相关专业知 识	(240)
专业知 识	(243)
专业实践能力	(246)
模拟试卷六	(249)
基础知识	(250)
相关专业知 识	(257)
专业知 识	(264)
专业实践能力	(270)
答案与解析	(287)
基础知识	(287)
相关专业知 识	(290)
专业知 识	(293)
专业实践能力	(296)
考纲精解	(299)
基础护理学	(299)
内科护理学	(318)
外科护理学	(341)
妇产科护理学	(360)
儿科护理学	(373)

模拟试卷一

基础知识

A1/A2 型题

答题说明：每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应字母所属的方框涂黑。

1. 下列哪项不属于护理体检前准备
 - A. 工作人员准备
 - B. 用物准备（检查）
 - C. 环境准备
 - D. 病人准备
 - E. 家属准备
2. 听诊时于心尖部可闻及舒张期隆隆样杂音的是
 - A. 二尖瓣狭窄
 - B. 二尖瓣关闭不全
 - C. 主动脉瓣狭窄
 - D. 主动脉瓣关闭不全
 - E. 三尖瓣关闭不全
3. 指压后可见局部组织轻度凹陷，且恢复较快，应判断为
 - A. 黏液性水肿
 - B. 轻度凹陷性水肿
 - C. 中度凹陷性水肿
 - D. 重度凹陷性水肿
 - E. 非凹陷性水肿
4. 舟状腹常见于
 - A. 胃扩张
 - B. 肝硬化
 - C. 肠梗阻
 - D. 恶病质
 - E. 胃排空不良
5. 直接角膜反射消失，间接反射存在，见于
 - A. 患侧面神经瘫痪
 - B. 深昏迷
 - C. 浅昏迷
 - D. 患侧三叉神经病变
 - E. 患侧动眼神经麻痹
6. 最能反映贫血程度的实验室检查指标是
 - A. 红细胞计数
 - B. 血红蛋白测定
 - C. 网织红细胞计数
 - D. 红细胞沉降率(血沉)
 - E. 血清蛋白测定
7. 尿液呈酱油色见于
 - A. 阻塞性黄疸
 - B. 肝细胞性黄疸
 - C. 急性溶血
 - D. 急性肾炎
 - E. 慢性肾炎
8. 患者内生肌酐清除率 (Ccr) 为 4ml/min，提示
 - A. 肾小球滤过功能轻度降低
 - B. 肾小球滤过功能中度降低
 - C. 早期肾功能不全
 - D. 肾衰竭晚期
 - E. 肾衰竭终末期
9. 血清白蛋白降低，球蛋白升高最常见于
 - A. 营养不良
 - B. 慢性肝病
 - C. 慢性胃肠道疾病
 - D. 类风湿关节炎
 - E. 急性肝炎
10. 人体浆膜腔不包括
 - A. 胸膜腔
 - B. 心包腔
 - C. 腹膜腔
 - D. 侧脑室
 - E. 关节腔
11. 组成肺纹理的主要成分是
 - A. 肺动脉分支阴影
 - B. 肺静脉分支阴影
 - C. 支气管阴影
 - D. 淋巴管阴影
 - E. 结缔组织阴影
12. 需空腹抽血的检查是
 - A. 甲胎蛋白 (AFP) 测定
 - B. 绒毛膜促性腺激素测定
 - C. 血型鉴定
 - D. 血气分析
 - E. 癌胚抗原测定
13. 癫痫病人的发作类型，临床上最常见的是
 - A. 简单部分性发作
 - B. 复杂部分性发作
 - C. 单纯失神发作
 - D. 强直阵挛发作
 - E. 癫痫持续状态
14. 肺炎时可减轻胸痛的最常用体位是
 - A. 患侧卧位
 - B. 仰卧位
 - C. 坐位
 - D. 健侧卧位
 - E. 俯卧位
15. 茶碱类药物平喘的主要作用原理是
 - A. 刺激腺苷环化酶
 - B. 稳定肥大细胞膜
 - C. 抑制磷酸二酯酶
 - D. 抑制变态反应过程
 - E. 阻断迷走神经，抑制肥大细胞释放递质
16. 左心衰竭可出现
 - A. 下肢水肿
 - B. 腹腔积液
 - C. 交替脉
 - D. 颈静脉怒张
 - E. 肝大

17. 心肌梗死的特征性心电图改变为
A. T波倒置, ST段抬高, 深而宽的异常Q波
B. P波 $>0.25\text{mV}$
C. 电轴 $<-30^\circ$
D. QT间期 $>0.40\text{s}$
E. $\text{Sv}_1 + \text{Rv}_5 > 4.0\text{mV}$
18. 心室颤动时的脉搏特点是
A. 快而规则 B. 快而不规则
C. 慢而不规则 D. 不规则, 与心率不一致
E. 消失而摸不到
19. 胃溃疡的发生原因是
A. 攻击因素加强而保护因素削弱
B. 胃壁血液供应丰富
C. 胆汁反流
D. 氧自由基
E. 精神紧张
20. 肾性高血压多为
A. 血管舒张型 B. 容量依赖型
C. 动脉舒张型 D. 血钠水过多型
E. 肾素依赖型
21. 化学药液浸泡消毒器械时, 不妥的是
A. 必须洗净擦干后浸泡
B. 松开关节并全部淹没在药液中
C. 经浸泡消毒的器械可直接使用
D. 不可用对金属有腐蚀作用的药液
E. 消毒液应定时更换
22. 有关高渗性脱水, 下列说法错误的是
A. 水分摄入不足 B. 多以失盐为主
C. 水分排出过多 D. 口渴为最早症状
E. 血清钠 $>145\text{mmol/L}$
23. 血钾正常值为
A. $1\sim1.5\text{mmol/L}$ B. $2\sim3\text{mmol/L}$
C. $3.5\sim5.5\text{mmol/L}$ D. $5.6\sim7.4\text{mmol/L}$
E. $7.5\sim8\text{mmol/L}$
24. 代谢性酸中毒常见的原因是
A. 肺气肿、哮喘 B. 肠痿、肠梗阻
C. 低钾血症 D. 急性胃扩张
E. 持续胃肠减压
25. 营养疗法中, 要素饮食的护理错误的是
A. 注意无菌操作
B. 滴注营养液保温在 $20\sim22^\circ\text{C}$
C. 鼻饲导管保持通畅
D. 保持口、鼻或造瘘的清洁
E. 详记出入量
26. 下列关于休克的护理不妥的是
A. 平卧位 B. 常规吸氧
C. 保暖, 给热水袋 D. 观察每小时尿量
E. 每15min测血压、脉搏1次
27. 急性肾功能衰竭病人的饮食护理, 哪一项是错误的
A. 高蛋白 B. 高热量
C. 充足维生素 D. 忌含钾丰富的食物
E. 控制入水量
28. 弥散性血管内凝血最早的表现是
A. 取血时不易抽出、血易凝
B. 皮肤黏膜下出血
C. 注射部位易出血
D. 伤口易出血
E. 咯血
29. 全身麻醉术后未清醒的病人, 最适宜的体位是
A. 仰卧位 B. 平卧位头偏向一侧
C. 头低足高位 D. 侧卧位
E. 半坐卧位
30. 早期判断心跳骤停的最重要指标是
A. 面色苍白
B. 瞳孔散大
C. 心音、脉搏消失
D. 颈动脉搏动不能摸到
E. 呼吸停止
31. 围手术期是指
A. 手术前期 B. 手术期
C. 手术后期 D. 以上三者均包括
E. 以上三者均不是
32. 关于脓性指头炎哪项是错误的
A. 抬高患肢
B. 理疗
C. 全身可用抗生素
D. 脓肿形成后, 切开引流, 手术宁晚勿早
E. 注意休息
33. 单侧肾脏功能衰竭的病人, 其监护级别为
A. 特级监护 B. 1级监护
C. 2级监护 D. 3级监护
E. 普通监护

34. 烧伤创面包扎疗法, 在下列哪一种情况, 应立即改为暴露疗法

- A. 敷料湿透 B. 病人发热
- C. 创面疼痛 D. 敷料渗液呈绿色伴霉味
- E. 血检白细胞增高

35. 头、面、颈部的缝合伤口一般的拆线时间为

- A. 4~5 天 B. 7~8 天
- C. 14 天 D. 10~12 天
- E. 10 天

36. 恶性肿瘤的病理特点是

- A. 细胞分化低 B. 膨胀性生长
- C. 无转移 D. 危害较小
- E. 界限清楚

37. 下列哪种移植不属吻合移植

- A. 肝移植 B. 皮瓣移植
- C. 心脏移植 D. 断肢再植
- E. 肾移植

38. 地方性甲状腺肿常发生在

- A. 沿海地区 B. 水土流失的山区
- C. 大都市 D. 工业发达地区
- E. 以上都不是

39. 宫颈癌的好发部位是

- A. 子宫颈口 B. 子宫颈外口
- C. 子宫颈解剖学内口 D. 子宫峡部
- E. 子宫颈外口的鳞柱状上皮交界处

40. 妇女一生各阶段中, 哪个阶段历时最长

- A. 新生儿期 B. 青春期
- C. 性成熟期 D. 围绝经期
- E. 老年期

41. 精子与卵子相遇结合为受精卵的部位是

- A. 子宫腔内 B. 输卵管壶腹部
- C. 输卵管间质部 D. 输卵管狭部
- E. 卵巢内

42. 人工流产术后的宣教下列哪项不妥

- A. 术后休息半个月
- B. 术后有轻微腹痛
- C. 少量阴道流血可持续 14 天
- D. 1 个月内禁止盆浴及性交
- E. 保持外阴清洁

43. 贯穿于分娩的全过程, 为临产后的主要产力的是

- A. 腹肌收缩力 B. 膈肌收缩力
- C. 子宫肌收缩力 D. 骨骼肌收缩力
- E. 肛提肌收缩力

44. 产褥期是指

- A. 全身各器官除乳腺外从胎儿娩出到恢复正常非孕状态所需的时间, 一般 4 周
- B. 全身各器官除乳腺外从胎盘娩出到恢复正常非孕状态所需的时间, 一般 6 周
- C. 从第二产程到生殖器官恢复正常
- D. 从胎儿娩出到全身恢复正常
- E. 从胎儿娩出到产露干净

45. 以下哪项不是新生儿的特殊生理现象

- A. 生理性体重下降
- B. 生理性黄疸
- C. 阴道有少量血性黏液流出
- D. 乳房肿块
- E. 皮肤有散在红疹

46. 确诊输卵管妊娠流产或破裂的首选方法是

- A. 腹部检查 B. 妊娠试验
- C. B 超检查 D. 血常规检查
- E. 阴道后穹窿穿刺

47. 对高危孕妇处理, 不正确的是

- A. 卧床休息 B. 增加营养
- C. 预防早产 D. 适时终止妊娠
- E. 如病情威胁母儿健康, 不管胎儿成熟程度即终止妊娠

48. 妊娠合并心脏病孕妇的护理, 不正确的措施是

- A. 休息取左侧卧位
- B. 避免过度疲劳
- C. 间断吸氧
- D. 为防止便秘, 必要时可使用缓泻剂
- E. 预防感染, 临产至产后 3 天遵医嘱给抗生素

49. 儿科护理学所涉及的范围, 以下提法哪项是错误的

- A. 从受孕开始直至青春期末
- B. 从新生儿期直至青春期末
- C. 儿科临床护理工作
- D. 护理科学研究
- E. 儿童时期卫生预防保健工作及护理科学研究

50. 新生儿期是指

- A. 从出生后脐带结扎到整 28 天
- B. 从出生后脐带结扎到整 30 天
- C. 从出生后脐带结扎到整 1 个月
- D. 从胎儿娩出到整 28 天
- E. 从胎儿娩出到整 1 个月

51. 儿科急诊中保证抢救质量最主要的要素是

- A. 医疗技术 B. 药品
- C. 仪器设备 D. 人
- E. 时间

52. 护理轻度臀红（表现皮肤潮红）的患儿，护理措施不妥的是

- A. 勤换尿布，保持臀部皮肤清洁干燥
- B. 排便后，可用温水洗净吸干涂拭植物油
- C. 可用肥皂洗臀及塑料布或油布包裹尿布
- D. 室温与气温允许，可直接暴露臀部于阳光下
- E. 可用红外线照射臀部以加速炎症吸收

53. 关于儿科护理的特点，错误的描述是

- C. 非甾体抗炎药 D. 甲状腺素
- E. 醛固酮

57. 女，29 岁，患急性再生障碍性贫血，突然出现头痛、呕吐、瞳孔大小不等，一侧肢体瘫痪，可能是

- A. 严重感染 B. 颅内出血
- C. 皮肤黏膜出血 D. 胃黏膜出血
- E. 脑血栓

58. 沈小姐，25 岁，上腹部疼痛伴恶心、呕吐已 8 天，考虑为“急性胰腺炎”。此时，最具诊断价值的实验室检查是

- A. 血清淀粉酶 B. 尿淀粉酶
- C. 血清脂肪酶 D. 血钙
- E. 血糖

59. 夜间值班遇一突然喘息的 60 岁男性病人，有以下表现，其中哪项最有助于考虑为心源性呼吸困难，而不是支气管哮喘引起的呼吸困难

- A. 体温 37.8℃ B. 咳出泡沫痰

62. 王先生, 36岁, 与他人抬举重物时, 不慎将重物滑脱, 砸在王先生左半身上, 急诊入院; 体格检查: 意识清楚, 面色苍白, 左上、下肢明显肿胀、淤血、压痛、不能自主活动; X线摄片提示左肱骨、左股骨骨折。护理中应特别注意观察的并发症是

- A. 缺血性骨坏死
- B. 神经损伤
- C. 骨髓炎
- D. 筋膜室综合征
- E. 休克

63. 男, 20岁, 从3米高处跌下, 骑于木杆上, 经检查阴茎、会阴和下腹壁青紫肿胀, 排尿困难, 尿道口滴血。应考虑为

- A. 会阴部挫伤
- B. 下腹部挫伤
- C. 前尿道损伤
- D. 后尿道损伤
- E. 膀胱损伤

64. 一外伤性大量血胸的病人, 受伤后第5周仍有伤侧肺受压萎缩, 采用下述哪种治疗方法最合适

- A. 输血、输液
- B. 胸腔穿刺抽血
- C. 胸腔闭式引流
- D. 开胸清除凝血块
- E. 胸膜纤维板剥脱术

65. 患者男性, 65岁, 搬运工人, 右下肢静脉曲张十余年, 小腿部有一溃疡已有月余, 现拟行手术治疗, 下列处理哪项是错误的

- A. 术前加强换药
- B. 局部包扎
- C. 术前2~3天用70%乙醇擦拭周围皮肤, 每天1~2次
- D. 待溃疡完全愈合后再行手术治疗
- E. 严格备皮

66. 某病人阵发性腹部绞痛, 并在床上翻滚, 应由哪科处理

- A. 外科
- B. 内科
- C. 妇科
- D. 传染科
- E. 神经科

67. 男性, 44岁, 门静脉高压症多年, 拟行分流术, 术前如何灌肠

- A. 术日晨肥皂水灌肠
- B. 术日晨清洁灌肠
- C. 术前肥皂水灌肠
- D. 术前晚清洁灌肠
- E. 不灌肠

68. 男性, 50岁, 阑尾切除术后5天。切口红肿, 触之有波动感, 穿刺抽到脓液, 其最佳的处理是

- A. 用雷佛奴尔(依沙吖啶)纱布换药
- B. 局部理疗
- C. 全身应用抗生素
- D. 拆去缝线, 伤口敞开引流
- E. 以上都不是

69. 李女士, 29岁, 正常分娩后6个月, 哺乳期, 避孕方法宜采取

- A. 口服避孕药
- B. 阴道隔膜
- C. 宫内节育环
- D. 安全期避孕
- E. 经腹输卵管结扎术

70. 患者29岁, 滴虫阴道炎治疗不当而反复发作, 现因妊娠2个月就诊。护士指导措施中哪项是错误的

- A. 保持外阴清洁
- B. 夫妇双方同时治疗
- C. 复查白带常规找滴虫, 3次均为阴性方为治愈
- D. 滴虫检查阴性后继续用药1疗程以巩固疗效
- E. 妊娠早期不宜局部用药, 可采取口服甲硝唑

71. 患者23岁, 孕38周头位, 估计胎儿4.1kg, 临产16h, 宫口开1cm, 静脉滴注缩宫素4h, 宫口开9cm, 产妇烦躁不安, 疼痛难忍, 见脐下1横指处呈环状凹陷, 有压痛, 胎心132次/分钟, 此时最适宜的处理是

- A. 停静脉滴注, 待宫口全开后阴道助产
- B. 即行产钳助产术
- C. 即行胎头吸引术
- D. 停静脉滴注立即行剖宫产术
- E. 肌肉注射哌替啶(度冷丁)

72. 某患儿日龄16天, 近2日口腔黏膜上有白色乳凝块样物, 强拭去可见红色疮面, 吃奶好, 睡眠佳。可能的诊断是

- A. 鹅口疮
- B. 疱疹性口腔炎
- C. 溃疡性口腔炎
- D. 单纯性口腔炎
- E. 麻疹黏膜斑

73. 患儿, 男, 4个月, 出现发热、头疼、呕吐、烦躁, 诊断为化脓性脑膜炎, 其不正确的护理措施为

- A. 严密观察患儿生命体征及瞳孔的变化
- B. 记录24h出入量, 防止体液不足
- C. 保持室内安静, 避免一切刺激
- D. 为防止患儿呕吐, 应减少患儿食物的摄入
- E. 给予20%甘露醇, 降低颅内压

A3/A4 型题

答题说明：提供若干个案例，每个案例下设若干个考题。请根据各考题题干所提供的信息，在每题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(74~77 题共用题干)

患者，女，69 岁，心前区疼痛 5h，心电图示急性广泛前壁心肌梗死伴室性期前收缩。入院体格检查：气急不能平卧，血压 130/80mmHg (21.3/14.7kPa)，心率 120 次/分钟，期前收缩 10 次/分钟，并有奔马律，两肺散在细湿啰音，伴少许哮鸣音，肝颈静脉回流征阴性。

74. 入院后即查血清酶，下列哪种心肌酶在起病后最早升高

- A. 丙氨酸氨基转移酶 (ALT)
- B. 肌酸磷酸激酶 (CPK)
- C. 天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)
- D. 碱性磷酸酶 (AKP)
- E. 乳酸脱氢酶 (LDH)

75. 经吸氧仍气急，频繁咳出泡沫痰，该患者可能存在

- A. 右心衰竭 B. 左心衰竭
- C. 全心衰竭 D. 肺部感染
- E. 泵衰竭

76. 该患者的期前收缩应选用哪项治疗措施

- A. 同步电复律
- B. 口服美西律
- C. 静脉注射西地兰 D (去乙酰毛花苷)
- D. 静脉滴注利多卡因
- E. 安置抗心律失常起搏器

77. 若经心电监测发现患者室性期前收缩转为室颤，则选用哪项措施

- A. 同步电复律 B. 非同步电复律
- C. 口服美西律 D. 静脉注射利多卡因
- E. 安装临时起搏器

(78~80 题共用题干)

患者男性，55 岁，患胃炎 25 年，突然出现腹部剧烈疼痛并迅速波及全腹。体格检查：腹式呼吸减弱，腹肌紧张，全腹压痛及反跳痛，尤以上腹部为重；X 线检查示膈下游离气体。拟诊为胃十二指肠穿孔。

78. 该病人的处理不正确的是

- A. 禁食、输液 B. 胃肠减压

- C. 大剂量抗生素 D. 给予吗啡止痛
- E. 完善术前准备

79. 可减少腹腔毒素吸收的体位是

- A. 平卧位 B. 半卧位
- C. 俯卧位 D. 左侧卧位
- E. 右侧卧位

80. 病人术后留置胃管、胃肠减压，提示可以拔除胃管的指征是

- A. 体温正常 B. 管腔阻塞
- C. 肛门排气 D. 食欲增加
- E. 肠鸣音恢复

(81~83 题共用题干)

患者张某，35 岁，白带增多半年，近来出现性交后出血，妇科检查见宫颈糜烂，糜烂面约占宫颈面积的 2/3 以上，附件未见异常。

81. 最适宜的诊断为

- A. 正常范围 B. 轻度糜烂
- C. 中度糜烂 D. 重度糜烂
- E. 宫颈息肉

82. 为排除宫颈癌，首选的检查项目是

- A. 阴道分泌物悬滴检查 B. 宫颈活检
- C. 宫颈碘试验 D. 宫腔镜检查
- E. 宫颈刮片细胞学检查

83. 最适宜的处理是

- A. 口服抗生素 B. 宫颈锥切术
- C. 阴道用药 D. 电熨法
- E. 阴道灌洗

(84~86 题共用题干)

3 个月小儿，腹泻 2 天，每天约 10 余次，水样便，呕吐，尿少，前囟凹陷，浅昏迷状，呼吸深快，口唇樱红，血清钠 156mmol/L，口腔黏膜有白色点片状物，强拭去可见红色疮面。

84. 该患儿考虑腹泻伴有

- A. 休克 B. 酸中毒
- C. 中毒性脑病 D. 低钾血症
- E. 败血症

85. 该患儿患有哪种口腔疾病

- A. 鹅口疮 B. 溃疡性口腔炎
C. 疱疹性口腔炎 D. 口腔溃疡
E. 龋齿病

86. 该患儿为何种脱水

B1 型题

答题说明：提供若干组考题，每组考题共同使用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与考题关系密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(87~91 题共用备选答案)

- A. 肌肉松弛 B. 肌肉痉挛
C. 肌束颤动 D. 肌肉运动不协调
E. 四肢肌肉、关节僵硬

87. 急性巴比妥盐类重度中毒表现为
88. 急性有机磷农药中毒烟碱样症状表现为
89. 重症中暑痉挛表现为
90. 冻僵表现为
91. 急性乙醇中毒表现为

(92~95 题共用备选答案)

- A. 术后 24h 以内 B. 术后 4~6 天
C. 餐后 2~4h D. 术后数天至 2 周
E. 术后 6~12 个月内

92. 胃大部切除术后胃出血的发生时间为
93. 倾倒综合征的发生时间为
94. 倾倒综合征的消失时间为

- A. 轻度低渗性脱水 B. 中度等渗性脱水
C. 重度低渗性脱水 D. 重度高渗性脱水
E. 中度高渗性脱水

95. 十二指肠残端破裂的发生时间为

(96~98 题共用备选答案)

- A. 窥器检查 B. 双合诊
C. 三合诊 D. 肛查
E. 肛腹诊

96. 未婚妇女适用的妇科检查为
97. 检查后屈后倾位子宫宜用
98. 阴道闭锁患者适宜的妇科检查为

(99~100 题共用备选答案)

- A. “O”型腿 B. 方颅
C. 手足搐搦 D. 鸡胸
E. 出牙迟缓

99. 骨样组织增生可致
100. 血清钙降低可致

相关专业知识

A1/A2 型题

答题说明：每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应字母所属的方框涂黑。

1. 慢性肾上腺皮质功能减退症皮肤黏膜呈现
A. 苍白 B. 潮红
C. 发绀 D. 黄染
E. 色素沉着
2. 表现为严重呼气性呼吸困难的最重要的病变是
A. 慢性阻塞性肺气肿 B. 节段性肺不张
C. 结核性胸膜粘连 D. 支气管扩张症
E. 肺炎球菌性肺炎
3. 胸膜摩擦音可见于

- A. 自发性气胸 B. 胸膜粘连
C. 胸腹腔积液 D. 心包炎
E. 干性胸膜炎
4. 正常人腹部常可触及的脏器是
A. 胆囊 B. 脾脏
C. 肝脏 D. 胰脏
E. 肾脏

5. 镜下血尿指尿沉渣在每高倍镜视野中平均见到红细胞超过
A. 1 个 B. 2 个