

珍珠囊補遺藥性賦卷一

元 真定

李果東垣原編

清 吳門 王子接晉三重訂

總賦

寒性

諸藥賦性。此类最寒。犀角解乎心熱。羚羊清乎肺肝。澤瀉利水通淋而補陰不足。海藻散癰破氣而治疝何難。聞之菊花能明目而清頭風。射干療咽閉而消癰毒。薏苡理脚氣而除風濕。藕節消瘀血而止吐衄。桔梗子下氣潤肺喘兮。又且寬中。車前子止瀉利小便兮。尤能明目。是以黃芩瘡用。兜鈴嗽医。地骨皮有退熱除蒸之效。薄荷葉宜消癰清腫之施。寬中下氣。枳殼緩而枳寒速也。療肌解表。乾葛先而柴胡次之。百部治肺熱。喉嗽可止。梔子涼心腎。鼻衄最宜。玄參治結熱毒癰。清利咽喉。升麻消風熱腫毒。發散瘡癰。紫河膾粉抑肺而斂氣門。金箔鎮心而安魂魄。茵陳主黃疸而利水。瞿麥治熱淋之有血。朴硝通大腸。破血而止癰癬。石膏治头疼。解肌而消煩渴。前胡除內外之痰實。滑石利六腑之澀結。天門冬止嗽。补血潤而潤肝心。麥門冬清心。解煩渴而除肺熱。又開治虛煩、除噦嘔、須用竹茹。通秘結、導瘀血、必資大黃。宣黃連治冷熱之病。又厚腸胃而止瀉。淫羊藿療風寒之痹。且補陰虛而助陽。茅根止血與吐衄。石葦通淋于小腸。熟地黃補血且療虛損。生地黃宣血更医眼瘡。赤芍藥破血。

而療腹疼。煩熱亦解。白芍藥補虛而生新血。退熱尤良。若乃消腫滿逐水于牽牛。除毒火殺子理血氣。婦人之用。地屑子利膀胱。可洗皮膚之風。山豆根解熱毒。能止咽喉之痛。白蘚皮去風治筋弱。而療足頑痹。旋覆花明目治頭風。而消溼嗽壅。又況荆芥穗清頭目便血。陳風散瘧之用。括囊根療黃疸毒癰。消渴解癆之要。地榆療崩漏。止血止痢。昆布破瘀氣。散壅散癟。療傷寒、解虛煩。淡竹叶之功倍。除結氣、破瘀血。牡丹皮之用同。知母止嗽而骨蒸退。杜仲溫精而虛汗收。貝母清痰止咳嗽而利心肺。桔梗下氣利胸膈而治咽喉。若夫黃芩治諸熱。兼主五淋。槐花治腸風。亦医痔瘡。常山理痰結而治溫瘧。葶苈瀉肺喘而通水氣。此六十六種藥性之寒。又當考圖經以博其所治。觀夫方書以參其所用焉。其庶几矣。

热性

藥有溫熱。又當審詳。欲溫中以裏緩。用發散以生姜。五味子止嗽痰。且滋腎水。腫脹腹脹勞瘵。更壯元陽。原夫川芎祛風濕。補血清頭。續斷治崩漏。益筋強脚。麻黃表汗以療喉逆。韭子助陽而醫白濁。川烏破積。有消瘀治風癆之功。天雄散寒。為去湿助陽精之藥。觀夫川椒达下。乾姜暖中。葫蘆巴治虛冷之疝氣。生卷柏破癰癧而血通。白朮消痰壅。溫胃兼止吐瀉。菖蒲开心氣。散帶更治耳聾。丁香快脾胃而止吐逆。良姜止心氣痛之攻冲。肉蓯蓉

填精益腎。石硫黃暖胃驅虫。胡椒主去痰而除冷。秦椒主攻痛而治風。吳茱萸療心腹之冷氣。靈砂定心臟之怔忡。蓋夫散腎冷、助脾胃、須草澄茄。療心疼、破積聚、用蓬莪遠。縮砂止吐瀉安胎。化酒食之劑。附子療虛寒翻胃。壯元陽之力。白豆蔻治冷瀉。療癰止痛于乳香。紅豆蔻止吐酸。消血殺虫于乾漆。豈不知鹿茸生精血。腰脊崩漏之均補。虎骨壯筋骨。寒濕毒風之并祛。檀香定霍亂。而心氣之痛愈。鹿角秘精髓。而腰脊之疼除。消腫益血于米醋。下氣散寒于紫蘇。薑豆助脾。則酒有行藥破血之用。麝香开竅。則葱為通中發汗之需。嘗观五灵脂治崩漏。理血氣之刺疼。麒麟竭止血出。療金瘡之傷折。麋茸壯陽以助腎。當歸补虛而養血。烏賊骨止帶下。且除崩漏目翳。鹿角膠住血崩。能補虛羸勞絕。白花蛇治癱瘓。除風痒之癬疹。烏梢蛇療不仁。去瘡瘍之風熱。圖經云。烏藥有治冷氣之理。禹餘糧乃療崩漏之因。巴豆利痰水。能破積熱。獨活療諸風。不論久新。山茱萸治頭暈遺精之藥。白石英医咳嗽吐膿之人。厚朴溫胃而去嘔張。消痰亦驗。肉桂行血而療心痛。止汗如神。是則鯽魚有溫胃之功。代赭迺鎮肝之劑。沉香下氣補腎。定霍亂之心疼。橘皮開胃去痰。導壅滯之逆氣。此六十種藥性之熱。又當博本草而取治焉。

溫 性

溫藥總括。医家素譜。木香理乎氣滞。半夏主乎風痰。蒼朮治目盲。燥脾去湿宜用。蘿

勝。下氣。製煙尤善。况夫鍾乳粉補肺氣。緩癆肺虛。青鹽治腹疼。風濕腎水。山藥能
止。阿膠而痢疾皆止。赤石脂治精獨而止瀉。兼補崩中。陽起石暖子宮以壯陽。更療陰
虛。誠以紫苑治嗽。防風祛風。蒼耳子透腦止渴。威靈仙宣風通氣。細辛去頭風。止嗽而療
齒痛。艾叶治崩漏。安胎歸經。蕷朮明目驅風。除筋掣腎痛。白芷止崩治腫。療痔漏瘡
瘻。若乃紅藍花通經。治產后惡血之餘。劉寄奴散血。寒湯火令酒之苦。咸陳溫之痛則茵芋
葉。秦折傷之症。附骨碎補。桑杏叶辟惡氣。而定霍亂。草果仁溫脾胃而止嘔吐。巴戟天治陰瘻
白濁。補腎羌活。玄胡索理氣痛血凝。調經有助。雲門款冬花潤肺。去痰嗽以定喘。肉豆蔻
溫中。止霍亂而助脾。燕芎走經絡之病。何首烏治瘧疾之黃。姜黃能下氣。破瘀血之積。肺
己宣消腫。去風濕之施。棗本除風。走婦人陰痛之用。仙茅益腎。扶元氣虛弱之衰。乃曰破
故紙溫腎。补精髓与夢傷。宜木瓜入肝。療脚氣并水腫。杏仁潤肺燥止嗽之劑。茴香治疝氣
腎疼之用。阿子生精止渴。兼療滑泄之疴。秦艽攻風逐水。又除肢節之痛。懷榔治瘻而逐
水。殺寸白虫。杜仲益腎而潤精。去腰膝重。當知紫石英療驚悸崩中之疾。橘核仁治腰冷疝
氣之病。金樱子分澀還精。紫苏子分下氣逆。淡豆豉發傷寒之表。大小茴除諸血之歸。益智
安神。治小便之頻數。麻仁潤腸。利六腑之燥堅。抑又聞補虛弱、排瘀塊、莫若黃耆。強腰
健、壯筋骨、無如狗脊。菟絲子补腎以明目。馬蘭花治瘻而育髮。此五十四種藥性之溫。更宜
參閱溫雨默識也。

平 性

詳論藥性平和。惟在以硼砂而去積。用龍齒以安魂。青皮快膈除膨脹。且利脾胃。芡實益精治白濁。兼补真元。原夫木賊草去目翳。崩漏亦醫。花蕊石治金瘡。血行則却。決明和肝氣。治眼之劑。天麻主头眩祛風之藥。甘草和諸藥而解百毒。蓋以性平。石斛平胃氣而補腎虛。更医脚弱。觀夫商陸治腫。覆盆益精。琥珀安神而破血。硃砂鎮心而有靈。牛膝強足补精。兼療腰痛。龍骨止汗住泄。更治血崩。甘松理風氣而痛止。蒺藜療風瘡而目明。人參潤肺寧心。开脾助胃。蒲黃止崩治衄。消瘀調經。豈不以南星醒脾。去驚風痰吐之要。三稜破積。除血塊氣滯之症。沒石主泄瀉而神效。皂角治風痰而响应。桑螵蛸療遺精之泄。鴨頭血醫水腫之盛。蛤蚧治劳嗽。牛蒡子疏風壅之痰。全蠍主風癱。酸棗仁去怔忡之病。嘗聞桑寄生益血安胎。且止腰痛。大腹子去膨下氣。亦令胃和。小草遠志。俱有寧心之妙。木通猪苓。尤為利水之多。蓮肉有清心醒脾之用。沒藥任治瘡散血之科。郁李仁潤腸宣水。去浮腫之疾。茯神寧心益智。除驚悸之疴。白茯苓补虛勞。多在心脾之有眚。赤茯苓破結血。獨利水道以無毒。因知麥蘖有助脾化食之功。小麥有止汗養心之力。白附子去面風之游走。大腹皮治水腫之泛溢。椿根白皮主瀉血。桑根白皮主喘息。桃仁破瘀血兼治腰疼。神麩健脾胃而進飲食。五加皮堅筋骨以立行。柏子仁養心神而有益。抑又聞安息香辟惡。且止心腹之痛。冬瓜仁、青

脾。实为飲食之資。腫毒治諸風之喉頭。百合散肺劳之嗽藥。赤小豆解熱毒。瘡腫宜用。杷叶下逆氣。噦呕可醫。連翹排瘡膿与腫毒。石楠叶利筋骨与毛皮。穀薑養脾。阿魏除邪氣而破積。紫河車補血。大棗和藥性以升脾。然而鱗甲治勞瘧。兼破瘡瘕。龜甲堅筋骨。更療崩疾。烏梅主便血瘻病之用。竹瀝治中風聲音之失。此六十八種平和之藥。更宜參本草而求其詳悉也。

以上集諸藥品。總括成章。性分寒熱溫平。味主抑揚主治。臨症對藥。辭義了然。在習医者。固當審詳。而保身者。亦宜熟讀。庶凡無夭札之虞矣。

用藥發明

藥性陰陽論

夫藥有寒熱溫涼之性。酸苦辛鹹甘淡之味。升降浮沉之能。厚薄輕重之用。或氣一而味殊。或味同而氣異。合而言之。不可混用。分而言之。各有所能。本乎天者觀上。本乎地者觀下。經清成象。重濁成形。清陽發腠理。濁陰走五臟。清中清者。榮養精神。濁中濁者。堅強骨骼。辛甘發散為陽。酸苦澀泄為陰。氣為陽。氣厚為陽中之陽。氣薄為陽中之陰。薄則發泄。厚則發熱。味為陰。味厚為陰中之陰。味薄為陰中之陽。薄則疏通。厚則滋潤。升降浮沉之辨。豁然貫通。始可以言醫。而司人命矣。人徒知藥之神者。乃藥之力也。殊不知乃

用藥者之力也。人徒知辨真偽識藥之為難。殊不知分陰陽用藥之為尤難也。

标本論

夫用藥者。當知標本。以身論之。外為標。內為本。氣為標。血為本。陽為標。陰為本。六腑屬陽為標。五臟屬陰為本。以病論之。先受病為本。後傳變為標。凡治病者。先治其本。後治其標。雖有數病。靡弗去矣。若先治其標。後治其本。邪氣滋甚。其病益堅。若有中滿。無問標本。先治其滿。謂其急也。若中滿后有大小便不利。亦無問標本。先治大小便。次治中滿。謂尤急也。又如先病發熱。後病吐瀉。飲食不下。則先定嘔吐。後進飲食。方兼治瀉。待元氣稍復。乃攻熱耳。此所謂緩則治其本。急則治其標也。除大小便不利及中滿吐瀉之外。皆先治其本。不可不知也。假令肝受心火之邪。是從前來者為實邪。實則瀉其子。然非直瀉其火。入肝經藥為之引用。瀉火為君。是治實邪之病也。假令肝受腎邪。是從後來者為虛邪。虛則補其母。入腎經藥為引用。補肝藥為君是也。標本已得。邪氣乃服。醫之神良。莫越乎此。

用藥法

夫用藥之法。貴乎明变。如風會有古今之異。地氣有南北之分。天時有寒暑之更。稟賦有厚薄之別。受病有新旧之差。年寿有老少之殊。居養有貴賤之別。用藥之际。勿好奇。勿執一。勿輕妄。勿迅速。須慎重精詳。圓融活變。不妨沉會以期必妥。藥于是乎功成。昔先賢未有

發明。后學因而弗講。其誤也就不訛多乎。

失病有宜补。以瀉之之道补之。病有宜瀉。以补之之道瀉之。病有宜寒剂者。以热剂为响導之兵。病有宜热剂者。以寒剂为类从之引。病在上者治下。病在下者治上。病同也而藥異。病異也而藥同。其義至微。学者最宜深究。

用藥之忌。在乎欲速。欲速則寒熱溫涼行散。补瀉未免過當。功未獲奏。害已隨之。藥無次序。如兵無紀律。虽有勇將。適以更斬憤事。又如理絲。緩則可清其緒。急則愈堅其結矣。藥有君臣佐使。味有輕重厚薄。人尽知之矣。及其用藥也。令人復煎其滓。不知既經煎沸。則輕且薄者。業已無味。重且厚者。不減初煎。君臣佐使之宜。果安在哉。病淺者誠無大害。病深者切勿为之。

凡修丸劑。須每种各為細末。以末之輕重合之。則分兩方准。不然。易細者一磨無遺。難碎者三復不足。齒莽若此。何鑿其無効哉。

凡藥苦者直行而泄。辛者橫行而散。酸者束而收斂。鹹者止而軟坚。独是甘之一味。可升可降。可浮可沉。可內可外。有和有殺。有补有泄。蓋土味作甘。土位居中。而能兼乎五行也。凡藥之在土者。中半以上為根。其氣上行。病在中上焦者用之。中半以下為梢。其氣下行。病在下焦者用之。藥之出土者。中半以上為苗。其氣昧上升。中半以下為身為幹。其氣昧中守。下達咸宜。因其病而酌之。使萬物平陰陽也。

凡藥在上者。不厭頻而少。在下者。不厭頓而多。少服則滋藥于上。多服則峻補于下。
凡病在上者。先食而后藥。病在下者。先藥而后食。病在四肢者。宜餓食而在晝。病在骨髓
者。宜飽食而在夜。

凡煎藥用水。亦各有宜。如治濕腫浮脹之疾。而欲使利水道。則取長流水。以流長源遠。其
性通達。直引四肢之間也。如治二便不通。及足經以下風濕。則取急流水。以其湍急峻急。
其性速下也。如治痰飲鬱滯。而欲吐發升散。則取逆流水。以其性逆倒流。洄瀾涌決也。如
治中氣不足。則取春雨水。有陽道發生之意也。如治下元不足。則取井水。蓋清晨井中天一
之氣。浮結于面。以磁器輕取之。殊有补陰之功也。如治火熱陽証。則取雪水。能大退熱
也。如治寒陰証奔豚等疾。則取甘瀾水。蓋盛之于缸。揚過千遍。水珠沫液。盈溢于面。
其性柔順。其味甘溫。大能和氣也。如治脾胃虛弱。泄瀉不食等疾。則取池潦水。蓋土池中
停蓄既久。不流不動。殊有土氣。能助脾元也。如治陰不升、陽不降、乖隔諸疾。則取陰陽
水。河井各半。陰陽相成。可升可降。而使氣平者也。

古人用藥。如羿之射的。不第諳其理。尤貴擇其道地者製之尽善。不然。欲以溫惡之劑。冀
其功驗。虽扁鵲再起。其可得乎。
凡藥有畏惡相反。所謂畏者。畏其制我。不得自縱。如半夏畏生姜之類是也。所謂惡者。惡
其異我。不得自尽。如生姜惡黃芩之類是也。統而論之。彼所畏者。我必惡之。我所惡者。

彼亦畏我。相馬相惡之中。亦有相成者。在因病制方。輕重多寡之間耳。若所謂相反。則各懷酷毒。兩仇不共。其則必害事也。然有太毒之疾。又須用大毒之藥以劫之。如苦寒破
丸。用巴豆、牽牛同病。以力攻堅。破積之用。四物湯加人參、五靈脂以治血塊。二陳湯加藜蘆、
細辛以吐風痰。丹溪治尸瘡。運心散。以甘草、芫花同劑。而謂妙處在此。顧良工用之何如耳。

藥性升降浮沉補瀉法

足厥陰肝經

味辛补酸瀉。所以

手少陰心經 氣溫补涼瀉。手太陽小腸 味鹹补甘瀉。所以

手太陽肺經 氣熱补寒瀉。手太陽小腸 味鹹补甘瀉。所以

手太陽膀胱 氣寒补熱瀉。手太陽膀胱 味酸补辛瀉。所以

手太陽膀胱 氣寒补熱瀉。手太陽膀胱 味苦补鹹瀉。所以

甘补苦瀉。所以

氣溫补寒瀉。手太陽肺經 手太陽膀胱 味酸补辛瀉。所以

氣寒补熱瀉。手太陽膀胱 味酸补辛瀉。所以

氣寒补熱瀉。手太陽膀胱 味苦补鹹瀉。所以

氣寒补熱瀉。手太陽膀胱 味苦补鹹瀉。所以

氣寒补熱瀉。手太陽膀胱 味苦补鹹瀉。所以

五臟更相平也。一臟不平則病。故曰安穀則昌。絕穀則亡。仲景云。水入于經。其血乃成。
水入于胃。脈道乃行。故血不可不養。衛不可不溫。血溫衛和。榮衛將行。當有天命矣。

五臟所苦

肝欲散。急食辛以散之。以辛补之。以酸瀉之。心欲要。急食鹹以要之。以鹹补之。以甘瀉
之。脾欲緩。急食甘以緩之。以甘補之。以苦瀉之。肺欲收。急食酸以收之。以酸补之。以
辛瀉之。腎欲堅。急食苦以堅之。以苦补之。以鹹瀉之。

五臟所苦

肝苦急。急食甘以緩之。脾苦濕。急食苦以燥之。心苦緩。急食酸以收之。腎苦燥。急食辛

以潤之。肺苦氣上。急食苦以泄之。

五氣湊五臟例

燥氣入肝。腥氣入肺。香氣入脾。焦氣入心。腐氣入腎。

五行五色五味走五臟主禁例

東方之木。其色青。其味酸。其臟肝。肝主筋。木曰曲直作酸。酸走肝。筋病人無多食酸。南方之火。其色赤。其味苦。其臟心。心主血。火曰炎上作苦。苦走心。血病人無多食苦。西方之金。其色白。其味辛。其臟肺。肺主氣。金曰从革作辛。辛走肺。氣病人無多食辛。中央之土。其色黃。其味甘。其臟脾。脾主肉。土曰稼穡作甘。甘走脾。肉病人無多食甘。北方之水。其色黑。其味鹹。其臟腎。腎主骨。水曰潤下作鹹。鹹走腎。骨病人無多食鹹。

手足三陽裏引經主治例

太陽 <small>足膀胱 手小腸</small>	上羌活	下黃柏	少陰 <small>足腎 手心</small>	上黃連	下知母	少陽 <small>足膽 手三焦</small>	
上柴胡	下青皮	厥陰 <small>足肝 手心包絡</small>	上青皮	下柴胡	陽明 <small>足胃 手大腸</small>	上升麻	下石膏
太陰 <small>足脾 手肺</small>	上白芍	下桔梗					

諸藥濕熱之火器

黃連瀉心火。梔子、黃芩瀉肺火。白芍瀉脾火。柴胡、黃連瀉肝胆火。知母瀉腎火。木通瀉小腸火。黃芩瀉大腸火。柴胡、黃芩瀉三焦火。黃柏瀉膀胱火。

諸藥相反例

甘草反大戟、芫花、甘遂、海藻。烏头反半夏、桔梗、貝母、白芨、白蔹。藜蘆反細辛、芍藥、人參、沙參、苦參、丹參、元參。

十八反歌

本草明言十八反。半夏貝母藜蘆攻烏。蕷草遂芫俱战革。諸參辛芍叛藜蘆。

十九畏歌

硫黃原是火中精。朴硝一見便相爭。水銀莫與砒霜見。狼毒最怕蜜陀僧。巴豆性烈最为上。僵與牽牛不順情。丁香莫與郁金見。牙硝難合京三棱。川烏草烏不順犀。人參最怕五靈脂。官桂善能調冷氣。若逢石脂便相欺。大凡修合看順逆。炮煙瓦礫莫相依。

六 陳歌

枳殼陳皮半夏齐。麻黃狼毒及藜萸。六般之藥宜陳久。入藥方知奏效奇。

五臟補瀉主治例

肝虛者。陳皮、生姜之类補之。虛則補其母。腎者肝之母也。熟地、地黃、黃柏補之。如無他症。錢氏地黃丸主之。實則白芍瀉之。如無他症。錢氏瀉青丸主之。實則瀉其子。以甘草瀉心。心者肝之子也。

心虛者。炒鹽補之。虛則補其母。肝養心之母也。以生姜補肝。如無他症。錢氏安神丸主

之。實則甘草瀉之。如無他症。錢氏方中重則瀉心湯。輕則導赤散。

脾虛者甘草、大棗之類補之。實則黃連、枳實瀉之。如無他症。錢氏益黃散主之。虛則補其母。心乃脾之母。以炒鹽補心。實則瀉其子。肺乃脾之子。以桑白皮瀉肺。

肺虛者。五味子補之。實則桑白皮瀉之。如無他症。錢氏阿膠散主之。虛則补其母。脾乃肺之母。以甘草、大棗補脾。實則瀉其子。腎者肺之子。以澤瀉瀉腎。肺乃腎之母。以五味子補肺。

以上五臟補瀉。素問藏氣法時論。各有之矣。欲究其詳。再看本論。

用藥凡例

頭角痛。須用川芎。血枯亦用。頸項痛。須用藁本。遍身肢節痛。須用羌活。風濕亦用。腹中痛。須用白芍、厚朴。臍下痛。須用黃柏、青皮。心下痛。須用吳茱萸。胃脘痛。須用草豆蔻。脇下痛。須用柴胡。日晡潮熱變熱症來亦用。胸中痛。須用生甘草梢。氣刺痛。須用枳殼。血刺痛。須用當歸。心下痞。須用枳壳。胸中寒痞。須用去白陳皮。腹中牽。須用蒼朮。破血須用桃仁。活血須用當歸。补血須用川芎。調血須用玄胡索。补元氣須用人參。調諸氣須用木香。破滯氣須用枳殼、青皮。肌表熱須用黃芩。去瘀亦用。去痰用半夏。去風寒。

須用南星。諸虛熱須用黃耆。盜汗亦用。脾胃受濕用白朮。去痰亦用。下焦濕腫。用淡防己、草龍胆。中焦濕熱用黃連。下焦濕熱用黃芩。煩渴須用白茯苓、葛根。嗽者用五味子。咳有聲無痰者。用生姜、杏仁、防風。咳嗽有聲有痰者。用半夏、枳殼、防風。喘者。須用阿膠、天門冬、麥門冬。諸癰瘍。須用白芍、白朮。諸水瀉。用白朮、白茯苓、澤瀉。諸痢疾。須用當归、白芍藥。上部見血用防風。中部見血用黃連。下部見血用地榆。眼暴發。須用當歸、黃連、防風。眼久昏暗。用熟地黃、當归、細辛。解利傷風。須用防風為君。白朮、甘草為佐。解利傷寒。甘草為君。防風、白朮為佐。凡諸風。須用防風、天麻。諸瘡瘍。須用黃柏、知母為君。茯苓、澤瀉為佐。癰瘍。須用柴胡為君。隨所發之時。所屬經部分。以引經藥導之。

以上諸藥。此大略言之。以為处方之階。欲究其精。于第二卷主治指掌中求之。

珍珠囊補遺藥性賦卷二

元真定李杲東垣原編

清吳門王子接晉三重訂

主治指掌

羌活羌活君羌活氣雄獨活氣微

羌活、味苦甘平。性微溫無毒。升也。陰中之陽也。其用有四。散肌表八風之邪。利周身八節之痛。排陰陽肉腐之疽。除新旧風濕之癱。乃手足太陽表里引經藥也。

升麻形細而黑褐色者佳形大者味薄不堪用

升麻、味苦平。性微寒無毒。升也。陰中之陽也。其用有四。引葱白散手陽明之風邪。引石膏止足陽明之齒痛。引諸藥游行四經。升陽氣乎至陰之下。因名之曰升麻。

柴胡胡半夏为之使惡石英長女荊芥薑

柴胡、味苦平。性微寒無毒。升也。陰中之陽也。其用有四。左右兩傍脇下痛。日晡潮熱往来。在臟腑經內主血。在肌主氣上行經。手足少陽表裏四經之藥也。

白芷白芍之使惡藜蘆花

白芷、味辛。性溫無毒。升也。陽也。其用有四。去頭面皮膚之風。除皮膚燥癬之癥。止足陽明頭痛之邪。為手太陰引經之劑。

防風草 惠子雲說白蘚芫花制附子毒

防風、味甘辛。性溫無毒。升也。陽也。其用有二。以氣味能瀉肺金。以体用通療諸風。

細辛 貝母

昆蟲毒海藻鹽煎藥

當歸、味甘辛。性溫無毒。可升可降。陽也。其用有四。頭止血而上行。身養血而中守。梢破血而下流。全活血而不走。

細辛 滴黃突力之使

獨活、味甘平。性微溫無毒。升也。陰中之陽也。其用有二。諸風癱瘓。頸項難伸。風寒溫痹。兩足不用。乃為足少陰之引經。

本
機

木香、味苦辛。性溫無毒。降也。陰也。其用有二。調諸氣不可無。溫肺氣不可缺。

機
機君

檳榔、味苦辛。性溫無毒。降也。陰也。其用有二。墜諸藥。性若鐵石。治后重。驗如奔馬。

吳茱萸

葛丹參硝石長石英先以湯浸去辛味五六七次然后可用

吳茱萸、味苦辛。性熱有小毒。可升可降。陽也。其用有四。暖陰寒氣。噎塞而不通。胸中冷氣閉塞而不利。脾胃停滯。腹痛而不止。心氣刺疼成陣而不止。

機
機君

藿香叶、味甘。性温无毒。可升可降。阳也。其用有二。开胃口。能进饮食。止霍乱。伤除呕逆。

附草

川芎、味辛。性温无毒。升也。阳也。其用有二。上行头角。助元阳之气而止痛。下行血海。养新生之血以调经。

蕷、連翹、葛花、茺蔚、玄參、長故、冬葵、烏头、巴豆、薏苡。

黄连、味苦。性寒无毒。沉也。阴也。其用有四。泻心火。消心下痞满之状。主肠澼。除腹中混雜之物。治目疾暴發。宜用。療瘡瘍首尾俱同。

黃芩、葛根、蘿蔔子、丹砂、牡丹皮、蘆薈。

黄芩、味苦平。性寒无毒。可升可降。陰也。其用有四。中枯而羸者。泻肺火。消痰利气。細实而坚者。泻大腸火。养阴退陽。中枯而羸者。除風湿留热于肌表。細实而坚者。滋化源退热于膀胱。

大黃、蕷、葛根、茺蔚、玄參、長故、冬葵、烏頭、巴豆、薏苡。

大黃、味苦。性寒无毒。其性沉而不浮。其用有四。守土而通壅滞。定禍乱而致太平。因名之曰將軍。

黃、蘿蔔