

海南及广东沿海岛屿植物名录


吴德邻 主编



科学出版社

海南及广东沿海岛屿植物名录

陈耀庭 主编



海南及广东沿海岛屿植物名录

(国家自然科学基金资助项目)

主编 吴德邻

编者:邢福武 李泽贤

叶华谷 陈炳辉

钟 义

科学出版社

1994

(京)新登字 092 号

内 容 简 介

本名录收录我国海南及广东沿海岛屿野生及常见栽培的种子植物共 221 科, 1475 属, 3930 种, 12 亚种和 258 变种, 其中裸子植物 8 科, 15 属, 40 种和 2 变种。对每一种植物的性状、生境、地理分布等均有记载。本名录可供植物学、农学、林学、园艺学、药学工作者和有关专业院校的师生使用。

海南及广东沿海岛屿植物名录

主编 吴德邻

责任编辑 曾建飞

科 学 出 版 社 出 版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码: 100717

华南农业大学印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

1994 年 3 月第一版 开本: 787×1092 1/16

1994 年 3 月第一次印刷 印张: 24

印数: 1—1000 字数: 580 000

ISBN 7-03-004169-0/Q · 511

定价: 30.00 元

**A CHECKLIST OF FLOWERING PLANTS OF
ISLANDS AND REEFS OF HAINAN AND
GUANGDONG PROVINCE**

EDITOR IN CHIEF: WU TE-LIN

EDITORS: XING FU-WU LI ZE-XIAN

YE HUA-GU CHEN BING-HUI

ZHONG YI

SCIENCE PRESS

1994

编写说明

本名录是国家自然科学基金重大项目“中国种子植物区系研究”(9390010)中的“南海岛礁植物区系研究”专题的研究成果之一。课题组成员自1990年至1993年期间对南海岛屿地区的141个岛屿进行了科学考察,收集了大量的标本和文献资料。本名录是在《海南植物志》等专著的基础上,并收集近年文献上发表的新资料,结合近期调查资料汇编而成,共收载南海岛屿地区的野生或常见栽培种子植物221科,1475属,3930种,12亚种和258变种。其中裸子植物8科,15属,40种和2变种,被子植物213科,1460属,3890种,12亚种和256变种。

本名录收录的地理范围包括海南岛和广东沿海岛屿及西沙群岛等岛屿。内容包括科、属、种的拉汉名称,每种植物的性状、地理分布、生境,南海岛屿地区的产地写到县。科的排列,裸子植物按郑万钧1978年的系统《中国植物志》第七卷,被子植物按哈钦松(双子叶植物1926年,单子叶植物1934年)系统。属和种的排列按拉丁名首字母顺序。凡是栽培种均在中名前加“*”号,学名后注明的“特有种”均指南海岛屿特有。

本名录因编写工作量大,时间仓促,书中难免出现错漏和不妥之处,敬请读者批评指正。

编者

1993年11月

目 录

海南及广东沿海岛屿植物名录.....	(1)
植物科、属中名索引	(308)
植物科、属拉丁名索引	(320)

海南及广东沿海岛屿植物名录

苏铁科 Cycadaceae

苏铁属 *Cycas* Linn.

- 海南苏铁 *C. hainanensis* C. J. Chen (特有种)
木本。万宁、崖县、昌江。生于海拔 200—1000 米的疏林中。
- * 苏铁 *C. revoluta* Thunb.
木本。万宁、儋县、三亚、海口、西沙群岛和广东南澳岛、桂山岛、硃洲岛等岛屿常见栽培。福建、台湾、广东。日本南部、菲律宾、印度尼西亚。
- 华南苏铁 *C. rumphii* Miq.
木本。东方、乐东、崖县、保亭、琼中、屯昌、琼山等地。广东、广西、云南。印度尼西亚、澳大利亚北部、越南、缅甸、印度及马达加斯加。
- 台湾苏铁 *C. taiwaniana* Carruth.
木本。陵水、琼中、保亭等地。生于河边疏林中或岩石缝中。台湾。

* 南洋杉科 Araucariaceae

* 南洋杉属 *Araucaria* Juss.

- * 大叶南洋杉 *A. bidwillii* Hook.
乔木。儋县有栽培。原产大洋洲。
- * 南洋杉 *A. cunninghamia* Sweet
乔木。海口、琼山、文昌、万宁、儋县、三亚、西沙群岛等地有栽培。原产澳大利亚东南部沿海地区。
- * 异叶南洋杉 *A. heterophylla* (Salisb.) Franco
乔木。儋县、广东南澳岛有栽培。原产大洋洲诺和克岛。

松 科 Pinaceae

油杉属 *Keteleeria* Carr.

- 海南油杉 *K. hainanensis* Chun et Tsiang (特有种)
乔木。昌江(坝王岭)。生于海拔 900—1250 米的山地雨林中。

松 属 *Pinus* Linn.

- * 加勒比松 *P. caribaea* Morelet
乔木。儋县、屯昌等地有栽培。原产加勒比海地区、洪都拉斯、危地马拉、尼加拉瓜。
- * 湿地松 *P. elliottii* Engelm.
乔木。海南、广东南澳岛、桂山岛、海陵岛、硃洲岛等地广为栽培。适生于低地、丘陵地带。原产美国东南部。
- 海南五针松 *P. fenzeliana* Hand. — Mazz.
乔木。琼中、东方、昌江等地。生于海拔 1000—1700 米的山地雨林中。广西。
- * 思茅松 *P. kesiya* Royle ex Gord. var. *langbianensis* (A. Chev.) Gaussen

- 乔木。屯昌、昌江等地有栽培。云南。越南、老挝。
- 广 东 松 *P. kwangtungensis* Chun ex Tsiang
乔木。琼中。生于海拔 1600—1800 米的山顶矮林中。广东、湖南、贵州、广西。
- 南 亚 松 *P. latteri* Mason (*P. ikedai* Yamamoto) (建群种)
乔木。定安、临高、东方、保亭、儋县、屯昌。生于海拔 500—1200 米的山地。常见有纯林。马来半岛、中南半岛、菲律宾。
- 马 尾 松 *P. massoniana* Lamb.
乔木。广东南澳岛、桂山岛、上川岛、下川岛、海陵岛、硃洲岛及屯昌有栽培。江苏、安徽、河南、陕西及长江中下流各省。非洲南部。
- 雅 加 松 *P. massoniana* Lamb.
var. *hainanensis* Cheng et L. K. Fu. (建群种, 特有种)
乔木。昌江(雅加大岭)。生于海拔 1300 米的山地雨林中。
- * 火 炬 松 *P. taeda* Linn.
乔木。屯昌等地有栽培。原产北美东南部。
- * 黑 松 *P. thunbergii* Parl.
乔木。广东南澳岛、桂山岛、三灶岛及屯昌等地有栽培。原产朝鲜及日本海岸地区。

杉 科 Taxodiaceae

* 柳杉属 *Cryptomeria* D. Don

- * 柳 杉 *C. fortunei* Hooibrenk ex Otto et Dietr.
乔木。屯昌有栽培。浙江、福建。
- * 日本柳杉 *C. japonica* (Linn. f.) D. Don.
乔木。屯昌有栽培。原产日本。

杉 属 *Cunninghamia* R. Br.

- * 杉 木 *C. lanceolata* (Lamb.) Hook.
乔木。琼中、昌江、陵水、广东南澳岛、南水岛、桂山岛、下川岛等地有栽培。我国秦岭以南各地广为栽培。越南。

* 落羽杉属 *Taxodium* Rich.

- * 池 杉 *T. ascendens* Brongn.
乔木。屯昌有栽培。原产北美。
- * 落 羽 杉 *T. distichum* (Linn.) Rich.
乔木。屯昌有栽培。原产北美。

柏 科 Cupressaceae

翠柏属 *Calocedrus* Kurz

- 翠 柏 *C. macrolepis* Kurz
乔木。昌江、乐东、琼中。生于海拔 600—1000 米的山谷沟边。

* 柏木属 *Cupressus* Linn.

- * 柏 木 *C. funebris* Endl.

乔木。屯昌有栽培。浙江、福建、江西、湖南、湖北、四川、贵州、广东、广西、云南。

* 侧柏属 *Platycladus* Spach

- * 侧 柏 *P. orientalis* (L.) Franco
乔木。海口、万宁、儋县、屯昌、广东南澳岛、桂山岛有栽培。分布几遍全国各省。朝鲜。

* 圆柏属 *Sabina* Mill.

- * 圆 柏 *S. chinensis* (Linn.) Ant.
乔木。屯昌枫木、广东南澳岛、桂山岛、大三门岛、三灶岛等地有栽培。分布几遍全国各省。朝鲜、日本。
- * 鳞 柏 *S. squamata* (Buch. — Hamilt.) Ant.
灌木。儋县有栽培。西藏、云南、贵州、四川、甘肃、陕西、湖北、安徽、福建、台湾、缅甸。

罗汉松科 *Podocarpaceae*

陆均松属 *Dacrydium* Soland.

- 陆 均 松 *D. pierrei* Hickel (建群种, 优势种)
乔木。琼中、陵水、乐东、东方等地。生于海拔 800—1600 米的山地雨林中。越南、柬埔寨、泰国。

罗汉松属 *Podocarpus* L'Her. ex Person

- 海南罗汉松 *P. annamiensis* N. E. Gray
乔木。琼中、陵水。生于海拔 600—1700 米的山地林中。越南、缅甸。
- 小叶罗汉松 *P. brevifolius* (Stapf) Foxw.
小乔木。琼中、保亭、白沙。生于海拔 700—1200 米的山地雨林中。云南、菲律宾、加里曼丹。
- 长 叶 竹 柏 *P. fleuryi* Hickel
乔木。陵水、昌江、乐东、琼中等地。生于海拔 800—1200 米的山地雨林中。广西、云南、广东。越南、柬埔寨。
- 鸡 毛 松 *P. imbricatus* Bl. (优势种)
乔木。陵水、琼中、乐东、昌江、东方。生于海拔 600—1200 米的山地林中。广西、云南、广东。越南、菲律宾、印度尼西亚。
- 罗 汉 松 *P. macrophyllus* (Thunb.) D. Don
乔木。琼中、广东南澳岛、高栏岛、荷包岛、担杆岛、外伶仃岛、上川岛、大襟岛。江苏、浙江、福建、安徽、江西、湖南、四川、云南、贵州、广西、广东。日本。
- 竹 柏 *P. nagi* (Thunb.) Zoll. et Mor. ex Zoll.
乔木。万宁、陵水、崖县、保亭、琼中、屯昌、澄迈、广东南澳岛、上川岛。生于滨海冲积地或常绿阔叶林中。福建、台湾、浙江、江西、广东、广西、四川、日本。
- 百 日 青 *P. neriifolius* D. Don
乔木。琼中、东方、乐东、崖县、保亭、昌江、广东大万山岛。生于海拔 500—1200 米的山地林中。浙江、福建、台湾、江西、湖南、贵州、四川、云南、广西、广东。尼泊尔、锡金、不丹、缅甸、越南、老挝、印度尼西亚、马来西亚。

三尖杉科 Cephalotaxaceae

三尖杉属 *Cephalotaxus* Sieb. et Zucc.

- 三 尖 杉 *C. fortunei* Hook. f.
乔木。琼中、浙江、安徽、福建、江西、湖南、湖北、河南、陕西、甘肃、四川、云南、贵州、广西、广东。
- 海 南 粗 榧 *C. hainanensis* Li
乔木。琼中、乐东、昌江等地。生于海拔 700—1200 米的山地雨林中。广西、云南、西藏。
- 粗 榧 *C. sinensis* (Rehd. et Wils.) Li
乔木。乐东、昌江、陵水。生于海拔 800—1200 米的山谷林中。江苏、浙江、安徽、福建、江西、河南、湖南、湖北、陕西、甘肃、四川、云南、贵州、广西、广东。

买麻藤科 Gnetaceae

买麻藤属 *Gnetum* Linn.

- 海 南 买 麻 藤 *G. hainanensis* C. Y. Cheng
藤本。陵水、琼中等地。生于海拔 200—1000 米的山地林缘。广西。
- 买 麻 藤 *G. montanum* Markgr.
藤本。崖县、白沙、琼海、广东荷包岛、高栏岛、上川岛、海陵岛。生于海拔 200—700 米的山谷林中或林缘。云南、广西、广东。印度、锡金、缅甸、泰国、老挝、越南。
- 小 叶 买 麻 藤 *G. parvifolium* (Warb.) C. Y. Cheng
藤本。产崖县、保亭、儋县、澄迈、广东上川岛、大襟岛、海陵岛。生于海拔 150—800 米的山地或丘陵林中。广东、广西、湖南、福建。

木兰科 Magnoliaceae

木兰属 *Magnolia* Linn.

- 绢 毛 木 兰 *M. albosericea* Chun et. C. Tsoong (特有种)
乔木。保亭、陵水(吊罗山)。生于海拔 500—900 米的山谷溪旁或疏林中。
- 香 港 玉 兰 *M. championii* Benth.
灌木或小乔木。香港、广东上川岛。生于低海拔阔叶林中。广东南部及西南部。
- 夜 合 *M. coco* (Lour.) DC.
灌木。海南岛、广东高栏岛。我国南部。
- * 荷 花 玉 兰 *M. grandiflora* Linn.
乔木。海口及那大等地偶见栽培。我国长江以南常见栽培。原产北美洲东南部。
- 长 叶 木 兰 *M. paeneta* Dandy
灌木。海南各地常见。多生于海拔 1000 米以下的山谷沟边。广东、广西、贵州。越南。

木莲属 *Manglietia* Bl.

- * 灰木莲 *M. glauca* Bl.
乔木。屯昌有栽培。印度尼西亚爪哇、越南。
- 海南木莲 *M. hainanensis* Dandy (特有种)
乔木。海南各山区常见。生于海拔 400—1200 米的山地林中。

含笑属 *Michelia* Linn.

- * 白兰 *M. alba* DC.
乔木。海南岛、广东南澳岛、桂山岛、三灶岛、南水岛等地常见栽培。原产印度尼西亚。现广植于东南亚。
- 苦梓含笑 *M. balansae* (A. DC.) Dandy
乔木。海南各地常见。生于海拔 400—1200 米的山谷溪旁或疏林中。福建、广东、广西、云南。越南。
- 细毛含笑 *M. balansae* (A. DC.) Dandy var. *appressipubens* Law
乔木。定安、琼中、保亭、陵水。生于海拔 600 米以下密林中。广西、云南。
- * 黄兰 *M. champaca* Linn.
乔木。海南岛、广东南澳岛偶见栽培。云南。
- * 含笑 *M. figo* (Lour.) Spreng
灌木。海南岛、广东南澳岛、三灶岛、南水岛、桂山岛等地常见栽培。原产我国。
- 亮叶含笑 *M. fulgens* Dandy
乔木。临高、保亭、白沙、东方。生于山谷密林中。云南。越南。
- 香籽含笑 *M. hedyosperma* Law
乔木。乐东、琼中、昌江、白沙。生于海拔 300—800 米的雨林中。云南。
- 醉香含笑 *M. macclurei* Dandy
乔木。海南岛。生于海拔 1000 米以下的疏林中。广东、广西。越南。
- * 火力楠 *M. macclurei* Dandy var. *sublanea* Dandy
乔木。儋县、屯昌等地有栽培。广西。
- 深山含笑 *M. maudiae* Dunn
乔木。广东沿海岛屿。华南。
- 白花含笑 *M. mediocris* Dandy
乔木。定安、万宁、陵水、保亭、东方、广东下川岛。生于海拔 500—1600 米的山地雨林中。越南、柬埔寨。
- 石碌含笑 *M. shiluensis* Chun et Y. Wu (特有种)
乔木。东方、昌江、保亭等。生于海拔 800—1200 米的山地雨林中。

拟单性木兰属 *Parakmeria* Hu & Cheng

- 乐东拟单性木兰 *P. lotungensis* (Chun et C. Tsoong) Law
乔木。乐东、东方。生于海拔 800—1300 米的山地雨林中。广东、湖南。

观光木属 *Tsoongiodendron* Chun

- 观光木 *T. odorum* Chun
乔木。琼中。生于海拔 800—1000 米的山地雨林中。广东、广西、江西、云南、湖南、福建。越南。

八角科 Illiciaceae

八角属 *Illicium* Linn.

- 狭萼八角 *I. angustisepalum* A. C. Smith
小乔木。香港(大屿岛)。
- 红花八角 *I. dunnianum* Tutchter
灌木。广东上川岛。生于低海拔山地林中、山坡灌丛。福建、广西、湖南、贵州。
- 花叶八角 *I. leiophyllum* A. C. Smith
灌木。香港、广东上川岛。
- 少药八角 *I. oligandrum* Merr. et Chun
小乔木。保亭、乐东、定安。生于海拔 500 米以上的山顶密林中。广东、广西。
- 厚皮香八角 *I. ternstroemioides* A. C. Smith (优势种)
小乔木。保亭、陵水、乐东、昌江、东方、白沙、定安等地。生于海拔 800—1700 米的山地雨林中。广东。

五味子科 Schizandraceae

南五味子属 *Kadsura* Kaempf. ex Juss.

- 臭饭团 *K. coccinea* (Lem.) A. C. Smith
藤本。琼中、白沙、定安、东方、崖县、保亭、临高、广东三灶岛。多生于海拔 600—1000 米山地疏林中。云南、贵州、四川、湖南、江西、广东、广西。越南。
- 海风藤 *K. heteroclita* (Roxb.) Craib
藤本。崖县、陵水、保亭、琼中、乐东、东方、琼海、儋县、昌江、广东南澳岛、上川岛。生于海拔 500—1200 米的山地疏林中。云南、贵州、广西、广东。印度、斯里兰卡、中南半岛、马来西亚。
- 冷饭团 *K. oblongifolia* Merr.
藤本。琼中、琼海、保亭、临高、澄迈、儋县、广东南澳岛和上川岛。生于海拔 500—1200 米的山地疏林中。福建、广西。

番荔枝科 Annonaceae

藤春属 *Alphonsea* Hook. f. et Thoms.

- 海南藤春 *A. hainanensis* Merr. et Chun
乔木。东方、崖县、乐东、昌江、陵水等。生于海拔 800 米以下的常绿林中。广西、云南。
- 石密 *A. mollis* Dunn.
乔木。东方、乐东、保亭等地。生于密林中。广西、云南。
- 藤春 *A. monogyne* Merr. et Chun (建群种)
乔木。崖县、保亭、陵水、乐东、琼中、琼海、定安。生于海拔 800 米以下的常绿林中。广西、云南。

蒙高子属 *Anaxagorea* St. Hil.

- 蒙高子 *A. luzonensis* A. Gray
灌木。崖县、陵水、白沙、保亭、万宁。生于海拔 800 米以下的密林中。广西。亚洲热带地区。

* 番荔枝属 *Annona* Linn.

- * 毛叶番荔枝 *A. cherimolia* Mill
小乔木。海口有栽培。原产秘鲁。
- * 圆滑番荔枝 *A. glabra* Linn.
乔木。海口、儋县、香港有栽培。原产热带美洲。现亚洲热带地区有栽培。
- * 刺果番荔枝 *A. muricata* Linn.
乔木。儋县、海口、香港、广东南澳岛有栽培。原产热带美洲。
- * 牛心番荔枝 *A. reticulata* Linn.
乔木。海口有栽培。原产热带美洲。
- * 番荔枝 *A. squamosa* Linn.
乔木。海南、香港、广东南澳岛、横琴岛、桂山岛、内伶仃岛、荷包岛、上川岛、海陵岛、硃洲岛等有栽培。原产热带美洲。

鹰爪属 *Artabotrys* R. Br. ex Ker

- 狭瓣鹰爪 *A. hainanensis* R. E. Fries (特有种)
攀援灌木。乐东、崖县。生于海拔 800 米以下的密林中。
- 鹰爪花 *A. hexapetalus* (Linn. f.) Bhandari
攀援灌木。崖县、保亭、广东南澳岛(栽培)。生于低海拔 300 米以下的雨林中。广东、广西、云南、福建和江西。印度至菲律宾。
- 香港鹰爪 *A. hongkongensis* Hance
攀援灌木。香港、崖县、广东上川岛。生于海拔 300—1500 米密林下或山谷疏林中。湖南、广西、云南、贵州。越南。
- 毛叶鹰爪花 *A. pilosus* Merr. et Chun
攀援灌木。万宁、保亭、儋县、崖县、白沙、琼中。生于低海拔至中海拔的山地林中。广东。

* 依兰属 *Cananga* (DC.) Hook. f. et Thoms.

- * 依兰 *C. odorata* (Lamk.) Hook. f. et Thoms.
乔木。香港有栽培。原产马来西亚。
- * 小依兰 *C. odorata* (Lamk.) Hook. f. et Thoms.
var. *fruticosa* (Craib) Sincl.
乔木。香港有栽培。原产泰国、马来西亚、印度尼西亚。

皂帽花属 *Dasymaschalon* (Hook. f.) Dalle Torre et Harms

- 喙果皂帽花 *D. rostratum* Merr. et Chun
乔木。陵水、崖县、乐东、保亭、东方、昌江、白沙、儋县。生于海拔 200—800 米的山地密林中或山谷疏林中。广西、云南、西藏。越南。
- 皂帽花 *D. trichophorum* Merr.
灌木。白沙、乐东、昌江、陵水、崖县、保亭、东方、澄迈、儋县。生于海拔 500 米以下的疏林中。广东、广西。

假鹰爪属 *Desmos* Lour.

假 鹰 爪 *D. chinensis* Lour.

攀援灌木。海南岛、广东南澳岛、大三门岛、高栏岛、东澳岛、担杆岛、上川岛、海陵岛等。生于低海拔的旷地、荒野及山谷等处。云南、贵州、广西。亚洲热带地区。

瓜馥木属 *Fissistigma* Griff.

白叶瓜馥木 *F. glaucescens* (Hance) Merr.

攀援灌木。海南岛、广东荷包岛。生于山地林下或灌木丛中。广西、福建、台湾。

毛瓜馥木 *F. maclurei* Merr.

攀援灌木。崖县、定安、白沙、保亭、琼中、澄迈、陵水、乐东、万宁等地。生于中海拔至高海拔山地密林下，或水旁岩石上或灌丛中。广西、云南。

瓜 馥 木 *F. oldhamii* (Hemsl.) Merr.

攀援灌木。产广东下川岛。生于低海拔疏林或灌丛中。浙江、江西、福建、台湾、湖南、广东、广西、云南。越南。

长柄瓜馥木 *F. oldhamii* (Hemsl.) Merr. var. *longistipitatum* Tsiang

攀援灌木。东方、崖县、保亭、琼中、陵水、琼海、白沙、儋县等地。生于山谷林中或水旁的密林荫处。广西。

多花瓜馥木 *F. polyanthum* (Hook. f. et Thoms.) Merr.

木质大藤本。崖县、定安、保亭、儋县、白沙、澄迈、东方、琼中。常生于山谷或路旁林下。广东、广西、云南。印度、缅甸。

凹叶瓜馥木 *F. retusum* (Levl.) Rehd.

攀援灌木。崖县。生于山地疏林中或灌丛中。广西、云南、贵州、西藏。

天堂瓜馥木 *F. tientangense* Tsiang et P. T. Li

攀援灌木。乐东、保亭。生于山地疏林中。广西。

东方瓜馥木 *F. tungfangense* Tsiang et P. T. Li (特有种)

攀援灌木。东方。生于山地疏林中。

香港瓜馥木 *F. uonicum* (Dunn) Merr.

攀援灌木。儋县。生于丘陵、山地林下或灌木丛中。广西、贵州、湖南、福建。

哥纳香属 *Goniotalamus* (Bl.) Hook. f. et Thoms.

哥 纳 香 *G. chinensis* Merr. et Chun

灌木。万宁、陵水、保亭、崖县等地。生于低海拔山地林中。广西(十万大山)。

保亭哥纳香 *G. gabriacianus* (Bail.) Ast

灌木或小乔木。保亭。生于海拔 350—800 米的密林中。泰国、老挝、柬埔寨、越南。

长叶哥纳香 *G. gardneri* Hook. f. et Thoms.

直立灌木。保亭、陵水、琼中等地。生于中海拔至高海拔的山地密林中。印度、斯里兰卡、越南。

海南哥纳香 *G. howii* Merr. et Chun

乔木。保亭、陵水、崖县、琼中等地。生于中海拔山地密林中或沟谷中。云南。

鹿茸木属 *Meiogyne* Miq.

鹿 茸 木 *M. kwangtungensis* P. T. Li (特有种)

灌木。保亭、崖县。生于海拔 600 米的山地林谷中。

蚁花属 Mezzettiopsis Ridl.

蚁 花 *M. creaghii* Ridl.

乔木。东方、崖县、白沙、陵水、万宁等地。生于低海拔至中海拔林中。云南、印度尼西亚。

野独活属 Miliusa Lesch. ex DC.

野 独 活 *M. balansae* Finet et Gagnep.

灌木。崖县、保亭、琼中、陵水。生于山地密林中或灌丛中。广西、云南。越南。

中华野独活 *M. sinensis* Finet et Gagnep.

乔木。琼山。生于海拔 500—1000 米的山地密林或山谷灌木林中。广西、云南、贵州。

银钩花属 Mitrephora (Bl.) Hook. f. et Thoms.

山 蕉 *M. maingayi* Hook. f. et Thoms.

乔木。定安、琼中、保亭、乐东等。生于中海拔山地密林中。广西、贵州、云南。亚洲热带地区。

银 钩 花 *M. thorelii* Pierre

乔木。崖县、东方、陵水、琼海、昌江、保亭、万宁。生于低海拔至中海拔密林中。云南。越南、老挝、柬埔寨、泰国。

蕉木属 Oncodostigma Diels

蕉 木 *O. hainanense* (Merr.) Tsiang et P. T. Li

常绿乔木。崖县、昌江、白沙、陵水、东方、保亭、琼海。常生于山谷水旁密林中。广西。

澄广花属 Orophea Bl.

海南澄广花 *O. hainanensis* Merr.

乔木。崖县、乐东、白沙、昌江等地。生于山地密林中。广西。

毛 澄 广 花 *O. hirsuta* King

灌木。崖县、保亭、陵水等地。生于低海拔森林中。马来西亚、越南、柬埔寨、老挝、印度。

广西澄广花 *O. polycarpa* A. DC.

乔木。海南岛(五指山)。生于山地林中。广西、云南。孟加拉、泰国、老挝、柬埔寨、马来西亚等。

暗罗属 Polyalthia Bl.

细 基 丸 *P. cerasoides* (Roxb.) Benth. et Hook. f. ex Bedd.

乔木。海南岛。为低海拔疏林中极常见的植物。广东、云南。东南亚至南亚。

沙 煲 暗 罗 *P. consanguinea* Merr. (优势种, 特有种)

乔木。海南各地常见。生于海拔 500—1100 米的山地密林中。

海 南 暗 罗 *P. laui* Merr. (特有种, 优势种)

乔木。陵水、昌江、保亭、东方、白沙、乐东、万宁、崖县等地。生于海拔 150—1100 米的常绿阔叶林中。

陵 水 暗 罗 *P. nemoralis* A. DC.

灌木。乐东、崖县、陵水、保亭、万宁、白沙、东方、昌江等地。为海拔 800 米

- 以下森林中常见的植物。广东。越南。
- 斜脉暗罗 *P. plagioneura* Diels
乔木。东方、乐东、保亭、白沙、崖县。为海拔 800—1200 米常绿林中常见的植物。广东、广西。
- 香花暗罗 *P. rumphii* (Bl. ex Hensch.) Merr.
乔木。陵水、保亭、东方、崖县、万宁、琼中、白沙、儋县、昌江。生于海拔 1000 米以下的常绿林中。马来西亚、菲律宾、印度尼西亚。
- 暗罗 *P. suberosa* (Roxb.) Thw.
小乔木。海南岛、广东新寮岛。生于低海拔的疏林中或村边路旁。广西。东南亚至南亚。

嘉陵花属 *Popowia* Endl.

- 嘉陵花 *P. pisocarpa* (Bl.) Endl.
灌木或小乔木。定安、乐东、陵水、崖县、琼海、琼中、保亭、儋县。为低海拔森林中常见的植物。广东。亚洲东南部。

尖花藤属 *Richellia* A. Gray

- 尖花藤 *R. hainanensis* (Tsiang et P. T. Li) Tsiang et P. T. Li (特有种)
攀援灌木。保亭(白马岭)。生于山沟密林中。

囊瓣木属 *Saccopetalum* Benn.

- 囊瓣木 *S. prolificum* (Chun et How) Tsiang
乔木。保亭、崖县、东方、昌江等地。生于海拔 800 米以下的密林中。广东(阳春)。

紫玉盘属 *Uvaria* Linn.

- 光叶紫玉盘 *U. boniana* Finet et Gagnep.
攀援灌木。澄迈、东方、崖县、白沙、乐东、陵水、保亭、万宁等地。生于海拔 800 米以下的疏林中。广东、广西、江西。越南。
- 刺果紫玉盘 *U. calamistrata* Hance
攀援灌木。白沙、陵水、保亭、文昌、澄迈、万宁、崖县、东方、广东担杆岛、小万山岛等地。生于低海拔至中海拔森林中。广东、广西。越南。
- 那大紫玉盘 *U. dolichoclada* Hayata
攀援灌木。儋县。生于山谷疏林或山坡灌木丛中。广西、云南、台湾。
- 山椒子 *U. grandiflora* Roxb.
攀援灌木。东方、乐东、保亭、万宁、儋县、定安、崖县、昌江、广东大万山岛、南澳岛。生于低海拔疏林中或灌丛中。广东、广西。亚洲热带地区广布。
- 紫玉盘 *U. microcarpa* Champ. ex Benth.
攀援灌木。海南岛、广东南澳岛、汛洲岛、大洲岛、潯洲岛、荷包岛、大蜘洲岛、直湾岛、上川岛等地。生于低海拔疏林或灌丛中。广东、广西、台湾。越南、老挝。
- 小花紫玉盘 *U. rufa* Bl.
攀援灌木。保亭。生于山地疏林中。云南。亚洲东南部至南部。
- 乌藤紫玉盘 *U. tonkinensis* var. *subglabra* Finet et Gagnep.
攀援灌木。崖县、东方、乐东、临高等地。生于海拔 200—800 米的疏林中。越南。