



把医疗卫生
工作的重点放到
农村去。

毛泽东

广东中兽医常用草药

第二辑

广东农业科学院 华南农学院 编
中国科学院华南植物研究所 中南林学院

广东中兽医常用草药

(内部参攷)

· 第二辑 ·

广东省农业科学院 华南植物研究所
华南农学院 中南林学院
合 编

广东省农业科学院
广东省科学技术协会 出版

一九六八年十月·广州

前 言

伟大领袖毛主席教导我们说：“我们应该走到群众中间去，向群众学习，把他们的经验综合起来，成为更好的有条理的道理和办法，然后再告诉群众（宣传），并号召群众实行起来，解决群众的问题，使群众得到解放和幸福”。我省广大贫下中农及中兽医工作者，千百年来掌握草药对家畜疾病进行斗争，积累了丰富的经验，解放后，在毛泽东思想的光辉照耀下，中兽医工作得到很大的发展。我们遵照毛主席“从群众中来，到群众中去”的教导，从一九六〇年以来，对我省六十多个县的中兽医的经验进行调查总结，但一直受到陈规旧律的限制。在史无前例的无产阶级文化大革命中，广大革命群众高举毛泽东思想伟大红旗，狠批刘少奇的反革命修正主义路线，踢开了资产阶级的“专家”“权威”的束缚，使这本书得到了新生，与广大革命群众见面，及时地推广交流群众的宝贵经验，更好地为无产阶级政治服务。这是毛泽东思想的伟大胜利，是无产阶级文化大革命的丰硕成果。

由于我们学习毛泽东思想不够，对中兽医经验领会不深，编写中虽一再修改，错误之处在所难免，敬希广大读者批评指正。

编 者

一九六八年十月一日

凡 例

一、本书共收载广东中兽医草药 104 科 345 种分二辑出版，由于草药按疗效分类目前尚有困难，故暂依植物系统排列，以便分析比较各该药物来源、形态、成分及功效等各方面的联系。

二、本书蕨类植物和种子植物各科的排列顺序采用“海南植物志”（1964）所用的分类系统。

三、本书各种草药分述如下各项：

名称：系指每种草药的正名，命名方法如下：

1. 该药已收入历代本草者，尽可能采用最流行的本革命名。

2. 本草未收或本草已收而命名过僻者，一般按广东通称的地方名或原有的广东草药书用名而命名。

3. 本草未收亦无广东通称地方名及广东草药书用名，一般采取较为妥贴的各县地方名命名，如果各县地方名不够妥贴，则依种子植物名称命名，但种子植物名称命名不适用者（如福氏星蕨、福氏紫苑等），必要时另拟新名。

别名：包括有关名称及各县通称的土名。每个别名均注明出处。

学名：采用国际公认的拉丁名称。

形态：根据标本，依植物学方法加以描述，每种草药均附有一图，以资鉴识，便于采集。

分布及生长环境：指出主要分布地区及生长环境，以便

采集及提供栽培的需要。

采集季节：指出每年最适宜的采取季节。

药用部分：指出每种草药的药用部分，如：根、茎、叶、花、果或树皮等等；但广东中兽医对各种草药使用比较节省，某些植物泡制为熟药时仅用一部分，而中兽医往往并用全株。

性味：每种草药按四气五味记录，并多采淡涩二味，凡草药已收入历代本草者，一般按本草记载，但本草未收或本草已收而不切合实际者，以中兽医公认的为主。如中兽医意见有出入，则由编者尝味后而定取舍。

归经：凡本草已收的草药，一般按古籍记载，本草未收者以中兽医公认者为准，如中兽医意见有出入，则由编者按各该药味、形态、色泽、功用来衡量应入何经。

功效：记述各种草药的作用及其主治疾病。主要材料由中兽医介绍，并参考历代本草，广东原有草药书籍及现在一些药物志作为补充。所用病名，一般采用普通中兽医用名，但西兽医病名，如：出血性败血病、猪丹毒、炭疽、牛瘟、猪瘟等，目前也为中兽医所常谈。故本书也一并采用。

用量：指该草药鲜药的用量，广东中兽医专以治牛为传统，解放后才着手研究治猪；因此本项只载牛、猪用量，并以复方中该药所用的剂量为准，如单用一味，可以酌情加重。

附注：本项酌情记载下列各项：

1. 根据现有文献摘录各种草药成份、药理及其主治疾病（指人类疾病），以便西兽医或西医参考。

2. 该草药的特殊用途。

3. 某些草药的同名异物的鉴别方法。

4. 本书植物描写的长度采用公制，但用量仍用市制（以十六两为一斤）。

5. 书末附有、中名（包括正名、别名）索引及疗效索引以便参考。

6. 广东中兽医常用草药繁多，本册未及收载的草药以后陆续编写出版。有关中兽医草药验方正在整理之中，以另编：《广东中兽医诊疗经验》进行介绍。

7. 草药名称不少有四旧色彩，但沿用已久，目前为了避免误用起见，暂时保留，今后应在群众协商基础上予以纠正。

第二輯 目录索引

山毛榉科(壳斗科) 374	蔓胡颓子..... 410
栲栗..... 374	葡萄科..... 412
穿破石..... 376	蛇葡萄..... 412
毛叶穿破石..... 378	粤蛇葡萄..... 414
石榕树..... 380	白粉藤..... 416
水同木..... 382	三叶扁藤..... 418
对叶榕..... 384	扁藤..... 420
榕树..... 386	毛葡萄..... 422
琴叶榕..... 388	芸香科..... 424
薜荔..... 390	降真香..... 424
佛掌榕..... 392	酒饼簕..... 426
竹叶榕..... 394	柚..... 428
变叶榕..... 396	齿叶黄皮..... 430
桑..... 398	假叶黄皮..... 432
荨麻科..... 400	黄皮..... 434
苧麻..... 400	三桠苦..... 436
蔓苧麻..... 402	楝叶吴茱萸..... 438
冬青科..... 404	山小桔..... 440
秤星木..... 404	小芸木..... 442
鼠李科..... 406	九里香..... 444
铁包金..... 406	芸香..... 446
血宽筋..... 408	簕欌..... 448
胡颓子科..... 410	单面针..... 450

两面针.....	452
山花椒.....	454
鸦胆子.....	456
无患子科.....	458
天灯笼.....	458
无患子.....	460
清风藤科.....	462
清风藤.....	462
省沽油科.....	464
山香圆.....	464
盐霜柏.....	466
野漆树.....	468
牛栓藤科.....	470
红叶藤.....	470
五加科.....	472
白簕花.....	472
鸟不企.....	474
鸭脚木.....	476
伞形花科.....	478
积雪草.....	478
天胡荽.....	480
紫花前胡.....	482
杜鹃花科.....	484
杜鹃花.....	484
紫金牛科.....	486
朱砂根.....	486

走马胎.....	488
高脚罗伞.....	490
雪下红.....	492
酸味藤.....	494
马钱科.....	496
钩吻.....	496
牛眼马钱.....	498
木犀科.....	500
扭肚藤.....	500
山指甲.....	502
夹竹桃科.....	504
羊角拗.....	504
萝藦科.....	506
球兰.....	506
弓果藤.....	508
茜草科.....	510
水团花.....	510
风箱树.....	512
梔子.....	514
龙船花.....	516
百眼藤.....	518
羊角藤.....	520
玉叶金花.....	522
金草.....	524
耳草.....	526
白花蛇舌草.....	528

牛白藤.....	530
粗叶耳草.....	532
鸡矢藤.....	534
大沙叶.....	536
九节.....	538
满天星.....	540
忍冬科.....	542
土银花.....	542
接骨草.....	544
珊瑚树.....	546
常绿荚蒾.....	548
菊科.....	550
黄花蒿.....	550
五指艾.....	552
艾.....	554
无柄紫苑.....	556
东风菜.....	558
鬼针草.....	560
冰片艾.....	562
六耳铃.....	564
鹅不食草.....	566
野菊.....	568
小薊.....	570
旱莲草.....	572
苦地胆.....	574
羊蹄草.....	576

大泽兰.....	578
毛大丁草.....	580
白牛胆.....	582
千里光.....	584
一枝黄花.....	586
金腰箭.....	588
夜牵牛.....	590
苍耳.....	592
报春花科.....	594
星宿菜.....	594
蓝雪科.....	596
白花丹.....	596
桔梗科.....	598
土党参.....	598
羊乳.....	600
桔梗.....	602
半边莲科.....	604
半边莲.....	604
茄科.....	606
指天椒.....	606
曼陀罗.....	608
蜀羊泉.....	610
癩茄.....	612
假烟叶.....	614
旋花科.....	616
银丝草.....	616

玄参科.....	618
毛麝香.....	618
假马齿苋.....	620
泥花草.....	622
爵床科.....	624
大还魂.....	624
榄核莲.....	626
狗肝菜.....	628
大叶驳骨草.....	630
水蓑衣.....	632
马鞭草科.....	634
白棠子树.....	634
紫珠草.....	636
裸花紫珠.....	638
大青.....	640
灯笼草.....	642
塘虱角.....	644
铁马鞭.....	646
马鞭草.....	648
蔓荆.....	650
唇形科.....	652
防风草.....	652
益母草.....	654
薄荷.....	656
石荠苎.....	658
紫苏.....	660

血见愁.....	662
单子叶植物纲.....	664
谷精草科.....	664
谷精草.....	664
姜科.....	666
砂仁.....	666
七叶一枝花科.....	668
七叶一枝花.....	668
菝葜科.....	670
土茯苓.....	670
天南星科(芋科)...	672
麒麟尾.....	672
石蒜科.....	674
莽菜.....	674
薯蓣科.....	676
白薯蓣.....	676
露兜树科.....	678
露兜筋.....	678
仙茅科(小金梅科)	680
仙茅.....	680
莎草科.....	682
香附子.....	682
禾本科.....	684
川谷.....	684
白茅.....	686
淡竹叶.....	688
金丝草.....	690

山毛榉科(壳斗科)

187. 栲 栗(中国树木分类学)(图187)

【别名】 锥栗(唐本草); 锥子树(博罗、增城、罗定、阳江、五华、广宁、四会、德庆、封开、怀集); 杨锥子(乐昌); 山锥(高要、高鹤); 假荔枝(从化、番禺); 黑旦(文昌、澄迈、琼海); 勒翠(高州、茂名)。

【学名】 *Castanopsis chinensis* Hance

【形态】 乔木，高15—20米，胸径30—60厘米；树皮暗灰色，老时不规则的开裂；小枝有椭圆形的皮孔。叶革质，长7—12厘米，宽2—3.5厘米，基部常常稍偏斜；叶柄长1—2厘米。夏季开花，花细小而不显著，单性同株；雄花绿白色，排成直立、分枝的穗状花序，簇生于小枝的顶部；雌花每朵藏于一果壳内(总苞)，组成一短穗状花序；总苞直径2—2.5厘米，外面密生鹿角状的锐刺，成熟时开裂，内有坚果一个。坚果近卵形，直径8—12毫米，黄褐色，略带光泽，被小柔毛。

【分布及生长环境】 本省各地有分布。生于700米以下的山坡上，常和其他阔叶树混生成林，间有栽培成纯林或栽植于果园内。

【采集季节】 夏、秋。

【药用部分】 果壳、叶、种子。

【性味】 种子：甘，平；果壳及叶：苦、涩，平。

【功效】 1.种子益肾气、厚胃肠，治肾虚痿弱、脚

软、消瘦。2.果壳及叶可除湿热，治湿热腹泻。

【用 量】 牛4—6两。猪1—2两。



图187. 栲栗

1.花枝；2.果枝。

桑 科

188. 穿破石(广东通称)(图188)

【别名】 蓼芝(云谷杂记); 山荔枝(惠阳); 金蝉退壳、山枸杞、大力黄(化州); 猪肚筋(新兴); 假荔枝(广州); 黄蛇根、黄牛角、黄田鸡(普宁、陆丰、惠来)。

【学名】 *Cudrania cochinchinensis*(Lour.) Kudo et Massamume

【形态】 直立或攀援状灌木，长2—4米；根长而粗壮，深入泥土，支根很多，外皮黄白色，有横裂；茎和枝有白色皮孔和粗壮的刺；刺直或略弯曲，长5—15毫米，有时达3厘米。叶革质，形状变化颇大，有长圆形，椭圆形，有时倒卵形，长6—9厘米，宽2.5—3厘米；叶柄长6—10毫米。夏季开花，单性雌雄不同株，多数集成腋生的球形头状花序；雄花序直径约6毫米，雌花序开始时小至结果时直径约18毫米。果肉质，成熟时黄红色，直径3—5厘米。

【分布及生长环境】 本省大陆及海南岛大部分地区有分布。常见于原野、丘陵、山谷和村落路旁，坑边疏林也有生长。

【采集节季】 四季。

【药用部分】 根。

【性 味】 甘、微苦，温。

【归 经】 肝、肾。

【功效】 1.祛风去湿，破血散瘀，壮筋骨，治劳伤及跌打积瘀、风湿痹痛、四肢酸软、牛叉胛。2.补虚损，壮

腰肾，治腰肾虚冷、肺虚久咳。

【用 量】牛2—4两。猪1—2两。




图188. 穿破石

189. 毛叶穿破石 (新拟) (图189)

【别名】黄桑籐(河源、龙川、连平、兴宁、高要、鹤山); 穿破石(清远、湛江、广州、花县、从化、新兴、台山、顺德、增城、南海、番禺、东莞、博罗、阳江、阳春、高州、茂名、化州、惠阳); 金蛇退壳(电白、徐闻、海康、廉江、遂溪、化州); 金不换(广宁、四会、怀集、德庆、封开); 黄蛇根(潮安、潮阳、惠来、普宁、陆丰); 黄龙退壳(罗定); 黄品籐树(兴宁); 山枸杞(化州); 毛籐猪肚(清远)。

【学名】*Cudrania pubescens* Trec.

【形态】灌木或藤状灌木，长3—8米，有直或稍弯曲、长0.5—3厘米的刺；根长而深入泥土，外皮黄红色，内皮黄色；小枝有浅黄色的毛。叶薄革质，长5—10厘米，宽2.5—5厘米，上面被短柔毛，背面和叶柄均有浅黄色的绒毛，在脉上被毛更浓密；叶柄长1—2厘米。春末夏初开花，花单性，雌雄不同株，多数聚集成球形头状花序；花序腋生，有毛。果秋末冬初成熟，球形，直径2厘米，黄色。

【分布及生长环境】本省东、西、北三江流域的各县均有产。常见于山谷两旁的疏林或灌丛中。

【采集季节】四季。

【药用部分】根。

【性味】甘，温。

【归经】肝、肾。

【功效】与穿破石相同。

【用量】牛2—4两。猪1—2两。



图189. 毛叶穿破石

190. 石榕树 (海南植物志) (图190)

【别名】牛奶树 (从化、五华、高州、阳江、茂名、化州、陆丰、潮安)；水猫奶 (广宁、四会、怀集、德庆、封开)；山榕 (文昌、澄迈)；水桶树 (高要、鹤山)；鸡心箭 (电白、徐闻、海康、廉江、遂溪)；猪乳子 (乐东、琼中)；水石榴 (普宁)。

【学名】 *Ficus abelii* Miq.

【形态】直立灌木，高达2米，有乳状树液；小枝有环状托叶痕，幼时被毛。叶互生或近对生，纸质，长7—10厘米，宽1.2—2.5厘米，背面密被粗毛；叶柄长4—10毫米，被毛。春季开花；花小，单性，生于梨状的花序内；花序单生于叶腋或已落叶的枝上，长15—20毫米，直径14—17毫米，成熟时紫红色或褐红色，疏被短粗毛，顶部脐状凸起，基部渐狭成短柄与花序柄连接，并有3片苞片；花序柄短，长4—8毫米。

【分布及生长环境】本省除北部外各地均有分布。喜生于河流两岸、沙地及山谷潮湿地上。

【采集季节】春、夏、秋。

【药用部分】叶、根、嫩枝、树皮。

【性味】甘，凉。

【归经】肺、脾。

【功效】1.去湿热，治湿热腹泻并治小猪白痢。2.健胃，治消化不良。3.催奶，治乳汁不足。4.化气散瘀，治五劳七伤、跌打、咳嗽。5.清热解毒，有用以治疗牛炭疽。