



定價 5.10 元

東 醫 寶 鑑

書號: 1344 開本: 787×1092/18 印張: 43 $\frac{8}{9}$ 插頁8

許 浚 等 著

人 民 衛 生 出 版 社 影 印

(北京書刊出版業營業許可證出字第〇四六號)

• 北京崇文區綏子胡同三十六號 •

北京市印刷四廠印刷 • 新華書店發行

1955年11月第1版—第1次印刷

印數: 1—2,500 (北京版) 定價: 5.10 元

東醫寶鑑雜病篇卷之三

御醫忠勤貞亮 聖功臣崇祿大夫陽平君臣許浚奉教撰

寒下

傷寒煩渴 凡得病反能飲水此欲愈也。汗下後口乾

舌燥 凡得病反能飲水此欲愈也。汗下後口乾

日而渴 凡得病反能飲水此欲愈也。汗下後口乾

熱尚少 凡得病反能飲水此欲愈也。汗下後口乾

少與之 凡得病反能飲水此欲愈也。汗下後口乾

升咽乾 凡得病反能飲水此欲愈也。汗下後口乾

渴水飲 凡得病反能飲水此欲愈也。汗下後口乾

病入裏 凡得病反能飲水此欲愈也。汗下後口乾

腎主水 凡得病反能飲水此欲愈也。汗下後口乾

厥陰六 凡得病反能飲水此欲愈也。汗下後口乾

水欲愈 凡得病反能飲水此欲愈也。汗下後口乾

善經云 凡得病反能飲水此欲愈也。汗下後口乾

渴飲水 凡得病反能飲水此欲愈也。汗下後口乾

不陰盛 凡得病反能飲水此欲愈也。汗下後口乾

五苓散 凡得病反能飲水此欲愈也。汗下後口乾

傷寒發狂 凡得病反能飲水此欲愈也。汗下後口乾

三白飲 凡得病反能飲水此欲愈也。汗下後口乾

活龍散 凡得病反能飲水此欲愈也。汗下後口乾

破推湯 凡得病反能飲水此欲愈也。汗下後口乾

水漬法 凡得病反能飲水此欲愈也。汗下後口乾

火劫法 凡得病反能飲水此欲愈也。汗下後口乾

傷寒謔語 凡得病反能飲水此欲愈也。汗下後口乾

乃發熱 凡得病反能飲水此欲愈也。汗下後口乾

日而渴 凡得病反能飲水此欲愈也。汗下後口乾

為邪潮 凡得病反能飲水此欲愈也。汗下後口乾

不微喘 凡得病反能飲水此欲愈也。汗下後口乾

傷寒發 凡得病反能飲水此欲愈也。汗下後口乾

三白飲 凡得病反能飲水此欲愈也。汗下後口乾

活龍散 凡得病反能飲水此欲愈也。汗下後口乾

破推湯 凡得病反能飲水此欲愈也。汗下後口乾

則胃下虛不可為實者胃實有燥屎可下之虛者

見黃連解毒湯治傷寒大熱煩躁不得眠或差後飲酒

黃連解毒湯治傷寒大熱煩躁不得眠或差後飲酒

柴胡連翹湯治傷寒發熱語呻吟不得眠或差後飲酒

傷寒結胸湯治傷寒發熱語呻吟不得眠或差後飲酒

急不可近渴胃陽大陷胸湯治傷寒發熱語呻吟不得眠或差後飲酒

痛此反下之脈浮緊下之必結胸○傷寒發熱語呻吟不得眠或差後飲酒

急不可近渴胃陽大陷胸湯治傷寒發熱語呻吟不得眠或差後飲酒

痛此反下之脈浮緊下之必結胸○傷寒發熱語呻吟不得眠或差後飲酒

急不可近渴胃陽大陷胸湯治傷寒發熱語呻吟不得眠或差後飲酒

痛此反下之脈浮緊下之必結胸○傷寒發熱語呻吟不得眠或差後飲酒

急不可近渴胃陽大陷胸湯治傷寒發熱語呻吟不得眠或差後飲酒

痛此反下之脈浮緊下之必結胸○傷寒發熱語呻吟不得眠或差後飲酒

急不可近渴胃陽大陷胸湯治傷寒發熱語呻吟不得眠或差後飲酒

痛此反下之脈浮緊下之必結胸○傷寒發熱語呻吟不得眠或差後飲酒

急不可近渴胃陽大陷胸湯治傷寒發熱語呻吟不得眠或差後飲酒

痛此反下之脈浮緊下之必結胸○傷寒發熱語呻吟不得眠或差後飲酒

急不可近渴胃陽大陷胸湯治傷寒發熱語呻吟不得眠或差後飲酒

痛此反下之脈浮緊下之必結胸○傷寒發熱語呻吟不得眠或差後飲酒

急不可近渴胃陽大陷胸湯治傷寒發熱語呻吟不得眠或差後飲酒

三物白散治寒實結胸○一錢一分

熱邪一錢一分治熱實結胸○一錢一分

大陷胸丸治熱實結胸○一錢一分

灸法詳見

傷寒結胸病有結胸○一錢一分

傷寒結胸病有結胸○一錢一分

傷寒結胸病有結胸○一錢一分

傷寒結胸病有結胸○一錢一分

傷寒結胸病有結胸○一錢一分

傷寒結胸病有結胸○一錢一分

傷寒結胸病有結胸○一錢一分

傷寒結胸病有結胸○一錢一分

傷寒結胸病有結胸○一錢一分

傷寒結胸病有結胸○一錢一分

傷寒結胸病有結胸○一錢一分

傷寒結胸病有結胸○一錢一分

傷寒結胸病有結胸○一錢一分

傷寒結胸病有結胸○一錢一分

傷寒結胸病有結胸○一錢一分

傷寒結胸病有結胸○一錢一分

半夏瀉心湯 乾薑一錢 黃連五分 甘草一錢 半夏一錢 水煎服

三黃瀉心湯 黃連一錢 黃芩一錢 芍藥一錢 水煎服

附子瀉心湯 別煮黃連黃芩各二錢 芍藥一錢 附子三味 漬

溫再服

甘草瀉心湯 甘草二錢 黃芩一錢 黃連五分 芍藥一錢 半夏一錢 水煎服

生薑瀉心湯 生薑半斤 甘草二錢 黃芩一錢 黃連五分 芍藥一錢 水煎服

桂枝人參湯 桂枝半斤 人參一錢 甘草一錢 芍藥一錢 水煎服

傷寒筋惕肉瞤 寒動筋惕 汗多則傷 血止其汗 而所致也 聘人傷

傷寒除中證 而利反下 所以救汗也 專宜五靈脂 為佐入生薑

傷寒除中證 而利反下 所以救汗也 專宜五靈脂 為佐入生薑

傷寒除中證 而利反下 所以救汗也 專宜五靈脂 為佐入生薑

傷寒除中證 而利反下 所以救汗也 專宜五靈脂 為佐入生薑

傷寒除中證 而利反下 所以救汗也 專宜五靈脂 為佐入生薑

傷寒除中證 而利反下 所以救汗也 專宜五靈脂 為佐入生薑

傷寒除中證 而利反下 所以救汗也 專宜五靈脂 為佐入生薑

傷寒除中證 而利反下 所以救汗也 專宜五靈脂 為佐入生薑

傷寒除中證 而利反下 所以救汗也 專宜五靈脂 為佐入生薑

傷寒除中證 而利反下 所以救汗也 專宜五靈脂 為佐入生薑

傷寒除中證 而利反下 所以救汗也 專宜五靈脂 為佐入生薑

傷寒除中證 而利反下 所以救汗也 專宜五靈脂 為佐入生薑

傷寒除中證 而利反下 所以救汗也 專宜五靈脂 為佐入生薑

傷寒血證 太陰病 其人如狂 七日表證因在 脈微而沉 反不結

傷寒血證 太陰病 其人如狂 七日表證因在 脈微而沉 反不結

傷寒血證 太陰病 其人如狂 七日表證因在 脈微而沉 反不結

傷寒血證 太陰病 其人如狂 七日表證因在 脈微而沉 反不結

傷寒血證 太陰病 其人如狂 七日表證因在 脈微而沉 反不結

傷寒血證 太陰病 其人如狂 七日表證因在 脈微而沉 反不結

傷寒血證 太陰病 其人如狂 七日表證因在 脈微而沉 反不結

傷寒血證 太陰病 其人如狂 七日表證因在 脈微而沉 反不結

傷寒血證 太陰病 其人如狂 七日表證因在 脈微而沉 反不結

傷寒血證 太陰病 其人如狂 七日表證因在 脈微而沉 反不結

傷寒血證 太陰病 其人如狂 七日表證因在 脈微而沉 反不結

傷寒血證 太陰病 其人如狂 七日表證因在 脈微而沉 反不結

傷寒血證 太陰病 其人如狂 七日表證因在 脈微而沉 反不結

傷寒血證 太陰病 其人如狂 七日表證因在 脈微而沉 反不結

傷寒血證 太陰病 其人如狂 七日表證因在 脈微而沉 反不結

傷寒血證 太陰病 其人如狂 七日表證因在 脈微而沉 反不結

傷寒血證 太陰病 其人如狂 七日表證因在 脈微而沉 反不結

傷寒血證 太陰病 其人如狂 七日表證因在 脈微而沉 反不結

傷寒血證 太陰病 其人如狂 七日表證因在 脈微而沉 反不結

傷寒血證 太陰病 其人如狂 七日表證因在 脈微而沉 反不結

傷寒血證 太陰病 其人如狂 七日表證因在 脈微而沉 反不結

傷寒血證 太陰病 其人如狂 七日表證因在 脈微而沉 反不結

青加枳桔一服如神
乃利則為瀉血之證
利便則為瀉血之證
小便則為瀉血之證
利便則為瀉血之證
利便則為瀉血之證

傷寒吐衄
傷寒吐衄
傷寒吐衄
傷寒吐衄
傷寒吐衄
傷寒吐衄

陰陽交證
陰陽交證
陰陽交證
陰陽交證
陰陽交證
陰陽交證

其復不肉以名
其復不肉以名
其復不肉以名
其復不肉以名
其復不肉以名
其復不肉以名

壞證
壞證
壞證
壞證
壞證
壞證

而醫病再傷
而醫病再傷
而醫病再傷
而醫病再傷
而醫病再傷
而醫病再傷

知母麻黃湯
知母麻黃湯
知母麻黃湯
知母麻黃湯
知母麻黃湯
知母麻黃湯

汗下藥
汗下藥
汗下藥
汗下藥
汗下藥
汗下藥

參胡芍藥湯
參胡芍藥湯
參胡芍藥湯
參胡芍藥湯
參胡芍藥湯
參胡芍藥湯

赤母為壞證
赤母為壞證
赤母為壞證
赤母為壞證
赤母為壞證
赤母為壞證

奪命散
奪命散
奪命散
奪命散
奪命散
奪命散

驚甲散
驚甲散
驚甲散
驚甲散
驚甲散
驚甲散

百合證
百合證
百合證
百合證
百合證
百合證

新藥如口
新藥如口
新藥如口
新藥如口
新藥如口
新藥如口

石代精湯
石代精湯
石代精湯
石代精湯
石代精湯
石代精湯

陶氏柴胡百合湯
陶氏柴胡百合湯
陶氏柴胡百合湯
陶氏柴胡百合湯
陶氏柴胡百合湯
陶氏柴胡百合湯

百知母湯
百知母湯
百知母湯
百知母湯
百知母湯
百知母湯

百合滑石代赭湯
百合滑石代赭湯
百合滑石代赭湯
百合滑石代赭湯
百合滑石代赭湯
百合滑石代赭湯

百合雞子湯
百合雞子湯
百合雞子湯
百合雞子湯
百合雞子湯
百合雞子湯

水更以井水二升煎取一盞

去渣納雞子黃一經升汗下先煎百合證如百合七枚生地

百合地黃湯治汁不經升汗下先煎百合證如百合七枚生地

二黃煎大便取一升五合粉

百合滑石散治右為病變寒熱者百合一兩滑石三

百合洗方升治水一合病一宿不差身已渴者百合一

過經不解傷寒六日以上傳經一過七日當解而再汗下失於

宜邪氣留連致之或從經上再汗下不宜退皆宜小藥

湯柴胡湯調之也或從經上再汗下不宜退皆宜小藥

勞復食復證勞者動也動非一種有內外血氣之異若

復寒是已見外證則謂之復一病非有內外血氣之異若

謂之勞復宜則小生熱氣動如初或傷寒新太過則未

氣尚弱若實湯鼠尿飲下清熱消食依前發熱若用補藥

自則胃重者必須下宜散黃連解毒湯益氣養神

瀉心湯治見欲復下宜散黃連解毒湯益氣養神

湯凡復病先宜七日出而解今復舉亦必十四

日而解但勞三復四久不愈必成勞瘵

麥門冬湯治勞復氣欲絕能起死回生麥門冬二錢

米令熟去米一盞二錢及棗二枚青竹葉

梔枳實湯治五勞七傷發熱梔子一盞半八厘白二枚枳殼三十枚

鼠屎鼓湯治同上梔子一盞半八厘白二枚枳殼三十枚

粒勿同煎至一盞分二

梔枳實黃湯治五錢大黃三錢石剉水煎服腹脹如

厚刺傷肉加神查

七味葱白散治勞復食復葱白連根三莖乾葛切一

之合三對以甘瀾水四服

益氣養神湯治勞復宜養氣拖人參當歸白芍藥酒

三分胡各七分炒麥門冬宜養氣拖人參當歸白芍藥酒

傷寒遺證遺者熱甚而強食時有所遺也帝曰諸

日病熱遺也此其禁之也伯曰遺病熱少愈食肉則已復多

善飲食而大所遺者禁之也伯曰遺病熱少愈食肉則已復多

陰陽易證傷寒入腹絞痛陰陽未和因合房室則令人陰

日陽易也其病新差婦人則急腰膝連腹內痛名

若二男一女並不相易所以易病者易病者易病者易病者

頭重不能舉有節解者病若小腹絞痛熱手

頭重不能舉有節解者病若小腹絞痛熱手

或牽引歲方死如竹皮湯乾薑燒散赤須乾

復也宜竹皮湯乾薑燒散赤須乾

病傷寒新差華佗診見舌出者必死陽氣不顧足勿

聞病差從百里來可省之勞住數宿果為勞事遂吐其舌

西不行小柴胡加牡丹皮枳實小柴胡合四牡

赤鬼崇或有寒熱似瘡都是發汗不盡餘毒在心的來煩

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

所致知母麻黃湯主之熱證但陶氏導赤各半湯
極妙門獨一寒後無寒熱證但陶氏導赤各半湯
或之則燕不與則二句思心赤唇焦舌乾中不飲水稀粥
與之則燕不與則二句思心赤唇焦舌乾中不飲水稀粥
便如常以神昏名曰越經證宜手陶氏導赤各半湯
門肺所形神昏名曰越經證宜手陶氏導赤各半湯

陶氏導赤各半湯
錢甘草煎五分生半汁三匙服門八薑一名瀉心導赤散
一錢甘草煎五分生半汁三匙服門八薑一名瀉心導赤散

餘熱不退
傷寒者熱不退通宜吐小柴胡湯之別尿赤
異證者涼散妙方調之○○○○○○○○○○

汗神宜白虎加蒼朮湯
熱者白虎加蒼朮湯
通神宜白虎加蒼朮湯
汗神宜白虎加蒼朮湯

孤感證
減六經餘熱不退加參湯
孤感證減六經餘熱不退加參湯

生艾汁調雄黃末燒烟熏之通湯
生艾汁調雄黃末燒烟熏之通湯
生艾汁調雄黃末燒烟熏之通湯

黃連犀角湯
治一錢右剉黃連犀角湯
黃連犀角湯治一錢右剉黃連犀角湯

治惑桃仁湯
治一錢右剉黃連犀角湯
治惑桃仁湯治一錢右剉黃連犀角湯

雄黃銳散
治一錢右剉黃連犀角湯
雄黃銳散治一錢右剉黃連犀角湯

傷寒差後雜證
傷寒差後雜證
傷寒差後雜證

酸棗仁湯
治傷寒後虛煩不得眠酸棗仁湯
酸棗仁湯治傷寒後虛煩不得眠酸棗仁湯

烏梅湯
治傷寒後虛煩不得眠烏梅湯
烏梅湯治傷寒後虛煩不得眠烏梅湯

辰砂五苓散
治傷寒後虛煩不得眠辰砂五苓散
辰砂五苓散治傷寒後虛煩不得眠辰砂五苓散

傷寒治法
傷寒治法
傷寒治法

大發汗
傷寒治法
大發汗傷寒治法

利之汗
傷寒治法
利之汗傷寒治法

見在裏
傷寒治法
見在裏傷寒治法

傷寒三日解者浮數而汗微出也溫脈和浮者此爲欲解也

黃芩則能解熱矣無出入道柴胡半夏能利乾薑白朮
 陰屬肝藏血養筋陽明中承氣太陰陽明調胃承氣
 陽明是三承氣入於陽藏明中之氣太陰桂枝湯調胃承氣
 氣是三大承氣入於陽藏明中之氣太陰桂枝湯調胃承氣
 麻黃附子細辛湯厥陰當歸四逆湯是三日陰未入
 下此大略言之耳凡病人有虛實邪氣有淺深豈
 可拘以日數仲景云日數雖多但有表證而脈沉者即
 之者宜發汗○雖少羌活湯發之脈沉者即表證而脈浮豈
 者此通解散○九理少羌活湯發之脈沉者即表證而脈浮豈
 六神過表調中○葛根湯解肌之邪香薷散和神湯表
 蘇飲發表調中○葛根湯解肌之邪香薷散和神湯表
 大柴胡三承氣攻邪散邪傳裏理中湯四逆湯散寒
 中陰經柴苓湯益元散治世瀉身熱○傷寒宜
 不宜湯以盪滌邪熱
 用九藥也

[illegible]

汗證傷寒三四月邪氣未傳裏氣滯散
傷寒寸口脈浮而緊浮則爲風緊則爲骨節痛

少陽知可解者寒熱亂作
失其早晚知可解也

[illegible]

凡發汗欲令手足皆周至繫繫然一時間許
益佳不可令如水淋漓耳若病不解當重發

汗以多則亡陽亡陽不得重發汗也○凡發汗
腰淋滿而腰以下至足微潤則厚衣覆之○凡
雖汗滿而腰以下至足微潤則病終不_人解當促
發汗服湯其方雖言一日微潤則病終不_人解當促
其服可半日間盡一二服連服三劑乃解若汗不
出者死病也○凡發汗病證仍在者三日內可
加三汗之○周遍為度若未汗可作熱粥投之粥內
加葱白甚妙○凡服藥發汗中病即止不必盡

凡發汗過多，漏不止，名曰亡陽。溫經湯益元氏。

再造散主之無用蒸法浮而緊今反脉浮而遲遲爲亡陽不能作汗其身

腎氣不足難得汗之太陽病尺脈浮緊者不可發汗何以

知之以藥血不足血少故也小建中湯助氣如黃
 芪服之尺脈有力乃服汗藥○一人患傷寒發黃
 陽經欲解復作身戰孫曰太陽汗病來所以心悸
 目眩身戰遂作真武湯三服微汗而解蓋附子
 求和其腎氣腎氣得行故汗得來也若但責太陽
 惟能乾涸血液爾仲景云尺脈遲者榮血不
 足不可以汗以此知腎氣怯則難得汗也○
 促汗天壽凡傷寒發汗須顧其表裏虛實待其時日
 壽限何足責○昔南朝范曄時表裏虛實待其時日
 傷寒恐不得預九錫之慶召徐文伯懇求促汗文得
 伯曰便差甚易只恐二年遂以火燒地鋪挑葉設席置
 云於其上須臾大汗撲以溫粉翌日便愈
 溫經益元湯治發汗過多衛虛亡陽以致頭眩身慄
 白芍藥當歸生乾地黃白茯苓陳皮甘草炙各一
 錢桂皮附子炮各五分右剉作一貼入薑三片棗
 二枚糯米一○
 陶氏再造散治陽虛不得汗名曰亡陽證人參黃芪
 灸各一錢○右剉作一貼入棗薑三片棗二枚
 煎至半八○炒芍藥一錢再煎二三沸溫服○
 可下不可下證○不惡寒反惡熱手掌心井腋下藏汗
 如常腹滿而喘或譫語明宜下○活潑大便秘小便便
 內熱是也內熱屬陽明宜下○活潑大便秘小便便
 氣必須脈浮頭痛惡風惡寒表證盡罷而反發熱
 惡熱語不大便方可用之若脈浮緊下之必結
 胃若脈緩下之必痞氣鬱○傷寒後三日法當下
 下之太早則必變他證輕者必危危者必死當用
 平裏熱微者柴胡小柴胡湯天麻水○必危者必死當用
 未退又以下大柴胡合三承氣下○兩除表裏之熱勢
 明○凡轉下之藥與裏證藥參考選用○脈浮熱
 不可下○不轉失氣者不可下○惡寒不可下○嘔吐不
 可下○不轉失氣者不可下○惡寒不可下○嘔吐不

○非陽明本病不可下○非發狂不可下○非痞滿燥實不可下○非陰之

下○非陽明本病不可下○非發狂不可下○非痞滿燥實不可下○非陰之

急下兩證少陰主腎繫舌本故口燥咽乾而渴陰之

下之非若陽明宜下而可緩也雖然陽明一證發

熱汗多亦急下之以胃汁乾宜急下之陽明證

燥咽乾謂之胃汁乾宜急下之陽明證

發熱汗多謂之胃汁乾宜急下之陽明證

脈不鼓擊不可下○欲用承氣湯下之煩渴脈七八至

之大駿曰幾殺此兒彼有病有脈數為熱今脈七至是

極熱也殊不知內經云彼有病有脈數為熱今脈七至是

岐伯曰脈至而取從按之不鼓諸陽皆然此陰盛陽

陽於外非熱也取蓋附來吾以熱因寒用之法治

之藥未訖而病漸出而愈青

遂頻服八兩汗漸出而愈青

下後熱不退宜再下○下後熱不退再下之熱愈盛

可生之理若輟而不下則邪熱極盛陰氣極衰脈

息斷絕必不可殺而如此之證是下之亦死○經云三

死醫者到此殺人活人一彈指間耳○十數行而

生者熱乃偶然誤中後學切不可命○為汗下後

解毒湯合涼膈散調之庶不切人命○為汗下後

熱不退問有汗無汗宜白

虎湯加人參蒼朮解之妙劑

陰耗陽竭證裏熱內盛陽脈極甚皆因失下而成此

證乃陰耗陽竭陰氣極弱謂之耗陽厥極甚謂之

竭但進陰耗陽解毒合氣極弱謂之耗陽厥極甚謂之

生得大熱而愈若未愈洗滌毒合承氣下之欠以解

毒涼膈天而愈若未愈洗滌毒合承氣下之欠以解

或往來寒熱而嘔屬少陽咽乾目眩耳聾小柴胡湯

名曰火邪陽明病若半在表半在裏宜小柴胡湯

小柴胡合涼膈散○病若半在表半在裏宜小柴胡湯

可和不可和證傷寒熱邪口苦咽乾目眩耳聾小柴胡湯

可和不可和證傷寒熱邪口苦咽乾目眩耳聾小柴胡湯

○非陽明本病不可下○非發狂不可下○非痞滿燥實不可下○非陰之

下○非陽明本病不可下○非發狂不可下○非痞滿燥實不可下○非陰之

急下兩證少陰主腎繫舌本故口燥咽乾而渴陰之

下之非若陽明宜下而可緩也雖然陽明一證發

熱汗多亦急下之以胃汁乾宜急下之陽明證

燥咽乾謂之胃汁乾宜急下之陽明證

發熱汗多謂之胃汁乾宜急下之陽明證

脈不鼓擊不可下○欲用承氣湯下之煩渴脈七八至

之大駿曰幾殺此兒彼有病有脈數為熱今脈七至是

極熱也殊不知內經云彼有病有脈數為熱今脈七至是

岐伯曰脈至而取從按之不鼓諸陽皆然此陰盛陽

陽於外非熱也取蓋附來吾以熱因寒用之法治

之藥未訖而病漸出而愈青

遂頻服八兩汗漸出而愈青

下後熱不退宜再下○下後熱不退再下之熱愈盛

可生之理若輟而不下則邪熱極盛陰氣極衰脈

息斷絕必不可殺而如此之證是下之亦死○經云三

死醫者到此殺人活人一彈指間耳○十數行而

生者熱乃偶然誤中後學切不可命○為汗下後

解毒湯合涼膈散調之庶不切人命○為汗下後

熱不退問有汗無汗宜白

虎湯加人參蒼朮解之妙劑

陰耗陽竭證裏熱內盛陽脈極甚皆因失下而成此

證乃陰耗陽竭陰氣極弱謂之耗陽厥極甚謂之

竭但進陰耗陽解毒合氣極弱謂之耗陽厥極甚謂之

生得大熱而愈若未愈洗滌毒合承氣下之欠以解

毒涼膈天而愈若未愈洗滌毒合承氣下之欠以解

或往來寒熱而嘔屬少陽咽乾目眩耳聾小柴胡湯

名曰火邪陽明病若半在表半在裏宜小柴胡湯

小柴胡合涼膈散○病若半在表半在裏宜小柴胡湯

可和不可和證傷寒熱邪口苦咽乾目眩耳聾小柴胡湯

可和不可和證傷寒熱邪口苦咽乾目眩耳聾小柴胡湯

傷寒凶證
傷寒病唇反青四肢多汗肝絕也黑也。形如

黃脾絕也。遺失腎絕也。汗出如油常促不。休言

傷寒不治證
大陽出而虛熱不止者死。六七日陰陽俱盛

者死。少陰病吐利煩躁四逆者死。六七日陰陽俱盛

水藥不入口者死。下利後脈絕手足厥冷時

脈還手足溫者生。下利後脈絕手足厥冷時

喘者死。下利後脈絕手足厥冷時

黃者死。下利後脈絕手足厥冷時

汗者死。下利後脈絕手足厥冷時

至者死。下利後脈絕手足厥冷時

傷寒十勸
不可不察所撰

傷寒頭痛身熱便是陽證不可服熱藥
傷寒六經內

痛身不熱少陰病反發熱而無頭痛厥陰病有

傷寒當直攻毒氣不可補益
攻之或醫者却行補益

傷寒不思飲食不可服溫脾胃藥
傷寒不思飲食自

服之理如理中元之類不可救

傷寒腹痛亦有熱證不可輕服溫煖藥
傷寒腹痛多

方痛甚者加大黃則意可見也惟身

傷寒自利當看陰陽證不可例服溫煖及止瀉藥
自利

惟身不熱手足溫者屬太陰身冷四逆者屬少陰

傷寒胃脘痛及腹痛不可妄用艾灸
傷寒胃脘痛屬

太陰切不可殺人

傷寒手足厥冷當看陰陽不可一例作陰證
傷寒有

不可例用熱藥

傷寒病已在裏即不可用藥發汗
傷寒須看表裏若

未除真氣先瀉

傷寒飲水為欲愈不可令病人恣飲過度
傷寒人發渴

常令不足為善

傷寒病初起不可過飽及飲酒食羊肉行房事
病方

食過飽病即再發

傷寒戒忌
傷寒新差復但少喫糜粥常令梳頭洗面不得

得多言不得房事

中寒證
中寒者用附子理中湯其藥則得之然曰傷

日中未發熱邪其經而入以漸而深中寒則倉卒

寒者寒邪直中三陰卒然昏不知人入口藥則四肢強

各半盞灌服次用回陽救急湯見附子湯
理中湯浸水服之
不現手足不溫者與氣急不可服
法出并足不溫者與氣急不可服
卒然暈倒

附子理中湯 治中寒口噤身強直附子炮人參白朮
煎服 各等分 乾薑甘草各一錢 附子炮人參白朮

木附湯 治中寒口噤身強直附子炮人參白朮
煎服 各等分 乾薑甘草各一錢 附子炮人參白朮

迴陽湯 治中寒口噤身強直附子炮人參白朮
煎服 各等分 乾薑甘草各一錢 附子炮人參白朮

寒厥暴亡 治中寒口噤身強直附子炮人參白朮
煎服 各等分 乾薑甘草各一錢 附子炮人參白朮

蔥熨法 治中寒口噤身強直附子炮人參白朮
煎服 各等分 乾薑甘草各一錢 附子炮人參白朮

感寒及四時傷寒 治中寒口噤身強直附子炮人參白朮
煎服 各等分 乾薑甘草各一錢 附子炮人參白朮

寒致生陰起如欲冷坐不節將風理失宜乍暖脫衣甚熱
寒致生陰起如欲冷坐不節將風理失宜乍暖脫衣甚熱

常證若不便行氣沉候皆為邪侵陽陰寒久雨積
常證若不便行氣沉候皆為邪侵陽陰寒久雨積

理大抵或感冒不得其人宜則導泄汗者因致虛變生他
理大抵或感冒不得其人宜則導泄汗者因致虛變生他

證此藥乃平和之劑勝於止能溫中解表凡有已
不致妄擾也
感冒因證不可便認多為傷寒而治之者極多
蓋亦因其證不可便認多為傷寒而治之者極多
氣散參蘇飲
子對金飲

羌活沖和湯 治春或夏或秋感冒風寒發熱惡寒頭痛
羌活沖和湯 治春或夏或秋感冒風寒發熱惡寒頭痛

防風沖和湯 治春或夏或秋感冒風寒發熱惡寒頭痛
防風沖和湯 治春或夏或秋感冒風寒發熱惡寒頭痛

沖和散 治春或夏或秋感冒風寒發熱惡寒頭痛
沖和散 治春或夏或秋感冒風寒發熱惡寒頭痛

沃雪湯 治春或夏或秋感冒風寒發熱惡寒頭痛
沃雪湯 治春或夏或秋感冒風寒發熱惡寒頭痛

升麻葛根湯 治春或夏或秋感冒風寒發熱惡寒頭痛
升麻葛根湯 治春或夏或秋感冒風寒發熱惡寒頭痛

交加散 治春或夏或秋感冒風寒發熱惡寒頭痛
交加散 治春或夏或秋感冒風寒發熱惡寒頭痛

外感挾內傷證 治春或夏或秋感冒風寒發熱惡寒頭痛
外感挾內傷證 治春或夏或秋感冒風寒發熱惡寒頭痛

兼氣散失也 治春或夏或秋感冒風寒發熱惡寒頭痛
兼氣散失也 治春或夏或秋感冒風寒發熱惡寒頭痛

下而致天橫實謂乃風寒無補不傷寒實一能獨傷
下而致天橫實謂乃風寒無補不傷寒實一能獨傷

虛無名曰勞力感寒不可誤作正傷寒大發汗
宜加味益氣湯
和氣散十味

陶氏補中益氣湯 治內傷氣血外感風寒頭痛身熱
黃芪當歸川芎芍藥各五分右剉作一貼入薑三片棗二枚
細辛甘草水煎服如元

氣不足加升麻三分右剉作一貼入薑三片棗二枚
葱白二莖水煎服如元

十味和解散 治外感傷風頭痛身熱白朮四錢桔梗
人參甘草各五分右剉作一貼入薑三片棗二枚

加味益氣湯 治勞力感寒水瀉服一錢半人參黃芪
入薑三片甘草各五分右剉作一貼入薑三片棗二枚

外感內傷虛證宜補 諸一婦年七散旬日不發熱惡寒
貼入薑三片水煎服如元

有欲絕之候不省脈不能言以不能開咽味有微氣
灌之連用頻服果有起死回生之功參煎湯徐飲

孕婦傷寒 宜用此同參湯 宜黃龍湯柴胡枳殼湯
乾則再服孕婦傷寒宜用此同參湯 宜黃龍湯柴胡枳殼湯

芎蘇散 治孕婦傷寒頭痛發熱宜黃龍湯柴胡枳殼湯
蘇葉六分各一貼入薑三片棗二枚

黃龍湯 治孕婦傷寒頭痛發熱宜黃龍湯柴胡枳殼湯
右剉作一貼入薑三片棗二枚

柴胡枳殼湯 治孕婦傷寒頭痛發熱宜黃龍湯柴胡枳殼湯
尤好中

錢半柴胡一錢枳殼四分甘草二錢右剉作一貼入薑三片棗二枚
單胎散 治孕婦傷寒頭痛發熱宜黃龍湯柴胡枳殼湯

瘡冷 治瘡者謂瘡久而冷也瘡者謂瘡久而冷也
加減白通湯 治瘡者謂瘡久而冷也瘡者謂瘡久而冷也

衡寒散 治瘡者謂瘡久而冷也瘡者謂瘡久而冷也
加減白通湯 治瘡者謂瘡久而冷也瘡者謂瘡久而冷也

加減白通湯 治瘡者謂瘡久而冷也瘡者謂瘡久而冷也
衡寒散 治瘡者謂瘡久而冷也瘡者謂瘡久而冷也

靈砂 治瘡者謂瘡久而冷也瘡者謂瘡久而冷也
加減白通湯 治瘡者謂瘡久而冷也瘡者謂瘡久而冷也

金液丹 治瘡者謂瘡久而冷也瘡者謂瘡久而冷也
加減白通湯 治瘡者謂瘡久而冷也瘡者謂瘡久而冷也

至聖來復丹 治瘡者謂瘡久而冷也瘡者謂瘡久而冷也
加減白通湯 治瘡者謂瘡久而冷也瘡者謂瘡久而冷也

氣無不實 治瘡者謂瘡久而冷也瘡者謂瘡久而冷也
加減白通湯 治瘡者謂瘡久而冷也瘡者謂瘡久而冷也

鉅內以可微火 治瘡者謂瘡久而冷也瘡者謂瘡久而冷也
加減白通湯 治瘡者謂瘡久而冷也瘡者謂瘡久而冷也

鉅內以可微火 治瘡者謂瘡久而冷也瘡者謂瘡久而冷也
加減白通湯 治瘡者謂瘡久而冷也瘡者謂瘡久而冷也

[illegible]

在脈虛霍亂證多不可汗傷溫病發於春夏要須柴
葛以解保肌蓋聞不吐熱微熱必自愈下膈痛引陰不
可醫結肉口燥咽乾發熱少陰氣汗下致風濕傷寒與熱
病陽合病脈弦者曰陽明身自汗有表證溫證若亡
毒陽則四逆尤多者號遺者小大便難而大小便數治用
黃連當歸散尤有吐逆有實熱者小大便難而大小便數治用
汗後身熱猶盛此陰陽絕而精神離嗟夫陰生之
主關陰陽熱於陰經死也可知離嗟夫陰生之
為賊能無制於陰經死也可知離嗟夫陰生之
洞窺心府極疲之疾以遵乎古不負乎諄
諄之語

單方

石膏 大傷寒取熱病汗後脈洪大頭痛口燥
硫黃 錢治傷寒末艾湯證身冷脈微時安足汗出而愈
柴胡 熱傷寒第一湯解調身冷脈微時安足汗出而愈
葛根 煎傷寒初患頭痛身熱飲第一升根到一兩水
麻黃 去節取五錢水煎服之第一升根到一兩水
百合 濃汁寒服一毒升煮百煎服之第一升根到一兩水
竹瀝 煎主傷寒數飲之復取竹瀝小

梔子 治傷寒熱病勞復微汗梔子
皂莢 有傷寒可治不省人事氣未絕以紙捲燒烟入鼻
末皂莢汁調服生白礬共一錢半為細末
壯鼠糞 專治水瀉復吐痰去即愈
葱白 傷寒初覺頭痛身熱便服葱白湯
生梨 取食之熱盛五片水煎溫服取汗時亦用此
葱酒 投熱酒中飲之連服葱白細切
荊芥 一兩傷寒頭痛之取汗差

紫蘇葉 治傷寒頭痛之取汗差
忍冬藤 治傷寒頭痛之取汗差
薄荷 煮汁溫服取汗差
萊菔 煮汁溫服取汗差
人尿 發狂野人乾糞取汁飲之熱
婦人月水 經水不調取汁飲之熱

鍼灸法 治傷寒初起二日傷寒熱取
合谷 治傷寒初起二日傷寒熱取
池谷 治傷寒初起二日傷寒熱取
寒汗 治傷寒初起二日傷寒熱取
痛刺 治傷寒初起二日傷寒熱取
心藏 治傷寒初起二日傷寒熱取
邊次 治傷寒初起二日傷寒熱取

遺次 治傷寒初起二日傷寒熱取
心藏 治傷寒初起二日傷寒熱取
痛刺 治傷寒初起二日傷寒熱取
寒汗 治傷寒初起二日傷寒熱取
池谷 治傷寒初起二日傷寒熱取
合谷 治傷寒初起二日傷寒熱取
鍼灸法 治傷寒初起二日傷寒熱取

鍼灸法 治傷寒初起二日傷寒熱取
合谷 治傷寒初起二日傷寒熱取
池谷 治傷寒初起二日傷寒熱取
寒汗 治傷寒初起二日傷寒熱取
痛刺 治傷寒初起二日傷寒熱取
心藏 治傷寒初起二日傷寒熱取
邊次 治傷寒初起二日傷寒熱取

邊次 治傷寒初起二日傷寒熱取
心藏 治傷寒初起二日傷寒熱取
痛刺 治傷寒初起二日傷寒熱取
寒汗 治傷寒初起二日傷寒熱取
池谷 治傷寒初起二日傷寒熱取
合谷 治傷寒初起二日傷寒熱取
鍼灸法 治傷寒初起二日傷寒熱取

鍼灸法 治傷寒初起二日傷寒熱取
合谷 治傷寒初起二日傷寒熱取
池谷 治傷寒初起二日傷寒熱取
寒汗 治傷寒初起二日傷寒熱取
痛刺 治傷寒初起二日傷寒熱取
心藏 治傷寒初起二日傷寒熱取
邊次 治傷寒初起二日傷寒熱取

邊次 治傷寒初起二日傷寒熱取
心藏 治傷寒初起二日傷寒熱取
痛刺 治傷寒初起二日傷寒熱取
寒汗 治傷寒初起二日傷寒熱取
池谷 治傷寒初起二日傷寒熱取
合谷 治傷寒初起二日傷寒熱取
鍼灸法 治傷寒初起二日傷寒熱取

鍼灸法 治傷寒初起二日傷寒熱取
合谷 治傷寒初起二日傷寒熱取
池谷 治傷寒初起二日傷寒熱取
寒汗 治傷寒初起二日傷寒熱取
痛刺 治傷寒初起二日傷寒熱取
心藏 治傷寒初起二日傷寒熱取
邊次 治傷寒初起二日傷寒熱取

邊次 治傷寒初起二日傷寒熱取
心藏 治傷寒初起二日傷寒熱取
痛刺 治傷寒初起二日傷寒熱取
寒汗 治傷寒初起二日傷寒熱取
池谷 治傷寒初起二日傷寒熱取
合谷 治傷寒初起二日傷寒熱取
鍼灸法 治傷寒初起二日傷寒熱取

[illegible]

暑者相火行令也

夏至日後病熱爲暑暑者相火行令也夏月人感之自口齒而入傷心包

傷寒傳變爲溫爲

證煩則喘喝靜則多言身熱而煩心
疼自汗倦怠少氣或下血發黃生瘰
人不能言
暑凡病傷寒而成溫者先夏至日者
爲病溫
暑

脉法

傷暑氣脉所虛以○脉虛弦身熱得之傷暑脉餘一作○氣中暑

暑病形證

暑病身熱自汗口渴乾面垢而大渴倦怠少氣

毛聾惡寒或頭疼或霍亂或四肢厥冷但身體無痛。○中暑之證六脉沉伏冷汗自出悶絕而昏重不知人矣。脉弦太陽中喝者暑病也發熱惡寒身逆冷少勞身即熱甚數下板齒燥若發汗則惡寒甚加溫鍼則發熱其數下板齒燥若發汗何故濕然毛聾蓋熱則諸毛孔開放酒然惡寒口開前板齒燥者齒乃骨之精今燥者骨熱也鍼藥不能治當灸大顛穴。

頤穴

中暑救急

夏月在道中熱死人又積臍上作窩令入
遂中熱塵土積死人心又積臍上作窩令入

[illegible]