



NONGCUN BAISHI ZHINAN CONGSHU



农家用药常识

刘启泉 杜艳茹 郭立芳 郝丽娜



● 河北科学技术出版社 ●

农村百事指南丛书

农家用药常识

刘启泉 杜艳茹 郭立芳 郝丽娜

河北科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

农家用药常识/刘启泉等. —石家庄:河北科学技术出版社, 2002

(农村百事指南丛书)

ISBN 7-5375-2648-6

I. 农... II. 刘... III. 药物-基本知识 IV. R97

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 047870 号

农村百事指南丛书

农家用药常识

刘启泉 杜艳茹 郭立芳 郝丽娜

河北科学技术出版社出版发行(石家庄市和平西路新文里 8 号)

河北新华印刷二厂印刷 新华书店经销

787×1092 1/32 5.5 印张 118000 字 2002 年 9 月第 1 版

2002 年 9 月第 1 次印刷 印数:1—3000 定价:9.10 元

(如发现印装质量问题,请寄回我厂调换)

前 言

我国是一个农业大国,农民占人口的大多数。过去农民得病都要到很远的县城、省城去看病,由于路途遥远,有可能耽误病情。现在,随着农村经济的不断发展,在广大农村建立了许多药房,真正做到“大病到医院,小病到药店”。可是许多农民朋友对药物了解不多,在购买时只能听从药店人员的介绍,而且对药物的毒副作用都很不了解。如果您掌握了一些用药常识,就可以做到心中有数,就不会用错药,浪费药。我们这本《农家用药常识》就是基于此点而编写的。

本书介绍了抗生素类、磺胺类、抗病毒、抗真菌、抗寄生虫类、解热镇痛类、抗酸及治疗消化性溃疡类、胃肠解痉类、助消化类等药物,大约 300 余种。从其药物组成、功能主治、用量用法、注意事项、禁忌症等几个方面做了详细说明,且语言通俗易懂,便于广大农民朋友看完本书之后,可有选择地用药,免去许多不必要的麻烦。当然,如果病情复杂,就要在医生的指导下用药,以免延误病情。

限于我们的学识水平,在内容上不免有缺漏或差误之处,希望读者提出宝贵意见,给予批评指正。

编 者

2002 年 3 月

目 录

一、概述	(1)
(一)常用药物的剂型	(1)
(二)给药的途径	(2)
(三)合理使用药物	(2)
(四)应注意的问题	(3)
二、西药部分	(4)
(一)抗生素类药物	(4)
羧苄青霉素(4) 先锋霉素Ⅳ(4) 西力欣(4)	
庆大霉素(5) 盐酸四环素(5) 强力霉素(6) 土	
霉素(6) 麦迪霉素(7) 交沙霉素(7) 氯霉素(8)	
红霉素(8) 乙酰螺旋霉素(8) 诺氟沙星(9) 悉	
复欢(9) 青霉素 G(11)	
(二)磺胺类及其他抗生素药物	(11)
磺胺嘧啶(11) 复方新诺明(12) 增效联磺片(14)	
呋喃妥因(14) 痢特灵(15) 吡哌酸(15) 黄连	
素(16) 鱼腥草素(16)	
(三)抗病毒、抗真菌、抗寄生虫药	(17)
病毒灵(17) 金刚烷胺(17) 病毒唑(18) 制霉菌	
素(19) 甲硝唑(19) 克霉唑(21) 肠虫清片(22)	

甲苯哒唑(23)	驱蛔灵(23)	
(四)解热镇痛药		(24)
阿司匹林(24)	对乙酰氨基酚(26)	附:对乙酰氨基酚复方制剂(27)
安乃近(28)	去痛片(29)	消炎痛(29)
保泰松(30)	炎痛喜康(32)	布洛芬(32)
萘普生(33)	双氯灭痛(35)	
(五)抗酸药及治疗消化性溃疡药		(35)
小苏打(35)	氢氧化铝(37)	氢氧化铝复方制剂(38)
硫糖铝(38)	甲氧咪胍(39)	雷尼替丁(40)
法莫替丁(41)	洛赛克(42)	乐得胃(43)
三九胃泰(44)	得乐(44)	胃仙-U(45)
胃必治(45)	维酶素片(46)	复方铝酸铋片(46)
胃速乐片(47)		
(六)胃肠解痉药		(47)
阿托品(47)	颠茄流浸膏(49)	普鲁本辛(49)
654-2(50)	胃复康(51)	
(七)助消化药		(51)
胃蛋白酶(51)	干酵母(52)	乳酶生(52)
(八)止吐药		(53)
胃复安(53)	眩晕停(56)	吗丁啉(56)
(九)肝病辅助药		(58)
齐墩果酸(58)	联苯双酯(58)	肝泰乐(59)
肌苷(60)	辅酶 A(60)	三磷酸腺苷(61)
(十)镇咳药		(62)
咳必清(62)	克咳敏(63)	咳快好(63)
(十一)祛痰药		(64)

- 复方甘草片(64) 伤风止咳露(64) 必嗽平(65)
痰易净(65)
- (十二)平喘药..... (67)
- 氨茶碱(67) 博利康尼(69) 喘乐宁(69) 海珠喘息定片(70)
- (十三)抗过敏药与抗眩晕药..... (70)
- 扑尔敏(70) 盐酸苯海拉明(71) 异丙嗪(71) 赛庚定(73) 息斯敏(74) 酮替芬(75) 乘晕宁(75)
- (十四)维生素与矿物质..... (76)
- 维生素 A(76) 维生素 AD(76) 维生素 E(77) 葡萄糖酸钙(78) 钙尔奇 D(78) 维生素 B₁ 片(78)
维生素 B₂(79) 复方维生素 B(79) 维生素 B₆(80)
维生素 C(82) 健灵液(83) 腺苷辅酶维生素 B₁₂ 片(84) 施尔康片(84) 21 金维他片(84) 葡萄糖酸锌(85)
- (十五)皮肤科用药..... (85)
- 炉甘石洗剂(85) 足癣粉(86) 氢化可的松(86)
硫磺软膏(87) 克霉唑霜剂(88) 达克宁霜(88)
鱼石脂(88) 尿素软膏(89)
- (十六)眼科用药..... (89)
- 氯霉素眼药水(89) 利福平滴眼剂(89) 红霉素眼膏(89) 盐酸吗啉胍滴眼液(90) 白内停眼药水(90) 金霉素眼膏(90)
- (十七)耳鼻喉及口腔科用药..... (90)
- 氯霉素甘油滴耳液(90) 氧氟沙星(91) 过氧化氢

溶液(91) 麻黄碱可的松滴鼻液(91) 盐酸麻黄碱
滴鼻液(91) 鼻通软膏(92) 四季润喉片(92)
华素片(92) 草珊瑚含片(93) 氯己定(93) 口
泰(93) 牙痛安胶囊(93) 复方硼砂漱口片(94)
度米芬(94)

三、中成药部分..... (95)

荆防冲剂(95) 桑菊感冒片(95) 感冒清胶囊(95)
感冒清热颗粒冲剂(96) 银翘解毒片(96) 板蓝根
冲剂(96) 双黄连口服液(96) 维C银翘片(97)
藿香正气水(97) 六合定中丸(97) 人丹(97) 黄
连上清丸(98) 清音丸(98) 蛇胆川贝散(98) 川
贝枇杷露(99) 橘红丸(99) 通宣理肺片(99) 鲜
竹沥(99) 养阴清肺膏(100) 百合固金丸(100)
华佗再造丸(101) 醒脑再造丸(101) 天麻
丸(101) 半夏天麻丸(102) 小活络丹(102) 大
活络丹(102) 消栓通络片(102) 山楂精降脂
片(103) 绞股蓝总甙片(103) 脑立清丸(103)
芎菊上清丸(104) 天王补心丹(104) 安神补心
丸(104) 安宫牛黄丸(105) 速效救心丸(105)
苏合香丸(105) 复方丹参片(106) 养血安神
丸(106) 枣仁安神颗粒(106) 利脑心(107) 心
血康(107) 元胡止痛片(108) 番泻叶(108) 保
和丸(108) 开胸顺气片(109) 木香顺气丸(109)
香砂养胃丸(109) 健脾丸(109) 逍遥丸(110)
麻仁润肠丸(110) 葛根芩连片(110) 柴胡疏肝

丸(111) 香砂枳术丸(111) 大山楂丸(111) 温
胃舒胶囊(112) 养胃舒胶囊(112) 气滞胃痛冲
剂(112) 胃苏冲剂(113) 青春宝口服液(113)
复方刺五加片(113) 生脉饮口服液(113) 九味羌
活丸(114) 川芎茶调散(114) 天津感冒片(114)
牛黄清官丸(115) 防风通圣丸(115) 银翘
散(115) 十滴水(116) 金银花露(116) 祛暑
丸(116) 清凉防暑冲剂(116) 避瘟散(117) 连
翘败毒丸(117) 穿心莲片(117) 千里光片(118)
康氏牛黄解毒丸(118) 牛黄上清丸(118) 龙胆泻
肝丸(119) 芎菊上清丸(119) 黄连解毒丸(119)
泻青丸(120) 三黄片(120) 川贝枇杷糖浆(120)
半夏咳喘宁糖浆(121) 止咳枇杷露冲剂(121) 复
方川贝精片(121) 雪梨膏(122) 越鞠二陈
丸(122) 六君子丸(122) 理中丸(122) 胃安宁
片(123) 胃痛散(123) 紫雪散(123) 行军
散(124) 活络丹(124) 再造丸(124) 局方至宝
丹(125) 宁神定智丸(125) 安心丸(125) 柏子
养心丸(126) 参茸安神丸(126) 强心丹(126)
虎骨酒(127) 麝香狗皮膏(127) 独活寄生
丸(127) 人参再造丸(127) 骨刺消痛液(128)
追风丸(128) 十全大补丸(128) 人参养荣
丸(129) 蛤蚧大补丸(129) 人参蜂王浆(129)
三肾丸(129) 山东阿胶膏(130) 龟龄集散(130)
百日咳片(130) 一捻金(131) 小儿化积散(131)

小儿回春丹(132) 小儿百部止咳糖浆(132) 小儿
百寿丸(132) 混元丸(133) 乌鸡白凤丸(133)
艾附暖宫丸(133) 立止白带丸(134) 妇科千金
片(134) 定坤丹(134) 失笑散(135) 得生
丸(135)

四、中草药部分 (136)

人参(136) 丁香(136) 小茴香(136) 川贝母(137)
川芎(137) 大黄(137) 干姜(137) 山楂(138)
三七(138) 土茯苓(138) 丹参(138) 牛黄(139)
太子参(139) 天麻(139) 乌梢蛇(139) 五味
子(140) 甘草(140) 白术(140) 艾叶(141) 半
夏(141) 冬虫夏草(141) 石榴皮(142) 冰
片(142) 百部(142) 当归(142) 西洋参(143)
朱砂(143) 花椒(143) 杜仲(144) 苍术(144)
芦荟(144) 羌活(144) 金银花(145) 刺猬
皮(145) 板蓝根(145) 青皮(146) 乳香(146)
知母(146) 独活(146) 南瓜子(147) 胖大
海(147) 枳实(147) 枸杞子(147) 厚朴(148)
党参(148) 柴胡(148) 莲子(149) 益母草(149)
黄连(149) 黄芪(150) 鹿茸(150) 蛇床子(150)
葱白(151) 蛤蚧(151) 紫苏(151) 硫磺(151)
槐花(152) 蜂蜜(152) 蒲公英(152) 蜈蚣(152)
蝉蜕(153) 酸枣仁(153) 熟地黄(153) 蝼
蛄(154) 樟脑(154) 薄荷(154) 橘皮(155) 檀
香(155) 藿香(155) 蟾蜍(155) 麝香(156) 鳖

甲(156)

五、药物中毒的临时抢救 (157)

酒精中毒(157) 安眠药中毒(158) 阿片或吗啡中

毒(158) 来苏儿中毒(159) 有机磷农药中毒(159)

氯丙乙烷(滴滴涕)中毒(160) 砷(砒)中毒(160)

磷中毒(161) 酸、碱中毒(161)

一、概 述

通常情况下，人们生病后都会到医院就诊，在医生的诊察下，借助各种检查，确诊某种疾病，然后用药治疗。但有些时候，常常不能到医院取药，在这种情况下假如您懂得一些家庭用药常识，就可以不必到医院取药而为您节省大量时间和精力。现将家庭用药中的一些问题简述如下：

（一）常用药物的剂型

为了便于对药物的服用、收藏和保管，都要把它们加工成一定的形式，并保持其有效的成分，这就是药物的剂型。共分为如下三类：

1. 口服制剂：主要有片剂、糖浆剂、胶囊剂、散剂、颗粒剂、酏剂、合剂、锭剂、膜剂（药膜）。

2. 注射剂：为透明液或混悬液、粉针剂，一般都密封在玻璃安瓿中。

3. 外用剂：主要有软膏、眼膏、洗剂、擦剂、栓剂（坐药，一般是塞入肛门或阴道内使用）、气雾剂、滴鼻剂、滴眼剂等。

(二) 给药的途径

给药的途径要根据病情、药物的理化性质、药理作用和要达到的预期效果而定，因为不同的给药途径，对药物作用的发挥有很大影响。常用途径有以下几种：

1. 口服：是最简便、最常用的给药方法，不需器械帮助，安全而方便。所用剂型为片剂、散剂、胶囊及水剂等。缺点是药效慢，不适宜急救时用，另外在昏迷及呕吐情况下不宜采用。

2. 注射：分肌肉、静脉、皮内、皮下注射多种方法，因受条件限制，一般家庭不采用。

3. 吸入：通过药物挥发成气态，扩散通过肺泡进入血液而发挥作用，如气雾剂。

4. 舌下、直肠或阴道给药：仅限于少数药物，如硝酸甘油舌下含化，退热栓直肠内给药。

5. 外用：一般指在皮肤局部发挥作用的药物，如外抹的软膏、消炎的红药水、紫药水、及止痒剂等。

(三) 合理使用药物

根据病情，选择合适药物，一定要在规定的用量范围内使用。用量过小，不发挥作用；用量过大，毒副作用明显增加，甚至出现严重后果。一般药物说明书上的剂量，是根据成人的情况来规定的。对婴幼儿要按千克体重来计算，婴幼儿体重一般估计的公式如下：

男孩：年龄 $\times 2 + 7 =$ 体重（千克）

女孩：年龄 $\times 2 + 6 =$ 体重（千克）

年老、体弱的病人为成人剂量的 $3/4$ 或 $2/5$ 。药物服用方法一般每日 3 次，有的只服 2 次或 1 次，抗生素类药物一般按每 6 小时或每 8 小时 1 次。安眠药在睡前服用；健胃药在饭前服用；对胃肠道有刺激的药在饭后服用；驱虫药在空腹时服用；无特殊说明的在饭后半小时后服用。

（四）应注意的问题

首先应注意的是在家庭用药时必须清楚疾病的诊断，不要盲目用药，延误治疗；其次在用药过程中，要了解药物治疗作用、副作用、毒性作用、过敏反应，若出现毒副作用和过敏反应，应及时停药，并做相应的处理，或到医院诊治。还要了解某些药物有致畸和致癌作用，如激素类避孕药物可致胎儿畸形，非那西丁可引起肾盂癌，氯霉素可引起白血病（即俗话说的血癌），苯妥英钠可引起恶性淋巴瘤等。最后注意家庭药物要放在阴凉、通风且小孩不易拿到的地方，以免他们误吃引起意外。

二、西 药 部 分

(一) 抗生素类药物

羧氨苄青霉素

【功用】用于尿道感染和肺炎的治疗。

【用量用法】每日 1~3 克，分 3~4 次口服，最好饭后服用。小儿每千克体重 50~100 毫克，分 3~4 次服用。

【注意事项】过敏体质慎用，对青霉素过敏者禁用。

先锋霉素Ⅳ

【功用】适用于肾盂肾炎及尿路感染，亦可用于链球菌咽喉炎，呼吸道及肺部感染。

【用量用法】每日 1~2 克，分 3~4 次空腹口服。

【不良反应】口服后的胃肠道反应。

【注意事项】注射剂，对青霉素过敏者慎用。

西 力 欣

【功用】用于呼吸道感染，耳鼻喉感染，尿道感染，软组织感染，骨和关节感染，产科及妇科感染，淋病。

【用量用法】 每日 0.5~1.0 克，分 2 次口服。

【不良反应】 对肾脏有一定毒性，肾脏有病者、孕妇、哺乳妇女慎用。

【注意事项】 本品对青霉素有交叉过敏反应，对青霉素过敏者慎用或最好不用。过敏反应主要表现为皮疹、瘙痒、发热，偶见休克。

庆大霉素

【功用】 主要用于败血症、尿道感染、胆道感染、急性肠炎、烧伤等，一般与其他抗生素合用。

【用量用法】 成人每日每千克体重 1.7 毫克，每 8 小时服 1 次（25 毫克的片剂，每次 1~2 片，每 8 小时 1 次）。用于肠炎每次 8 万单位，每 8 小时 1 次。

【不良反应】 损害第 8 对脑神经，表现平衡功能障碍，受损后较难恢复；对听觉功能也可损害，如出现耳鸣、眩晕，应立即停药。

【注意事项】 肾功能减退者，应减少药量或延长给药时间。

盐酸四环素

【功用】 主要用于固紫染色阳性球菌和阴性球菌的感染，也用于立克次氏体（斑疹伤寒）、恙虫病、衣原体（沙眼）、支原体（支原体肺炎）感染及回归热等。对阿米巴痢疾及非典型性肺炎也有效。

【用量用法】 口服，每次 50 万单位，每日 3 次。儿童按每日每千克体重 6.25 万单位，分 3 次口服或遵医嘱。

【不良反应】影响骨骼的生长，并使婴幼儿的牙齿黄染，诱发龋齿（虫牙）；有使胎儿畸形的作用，长期使用还对肝脏有损害。

【注意事项】孕妇、婴幼儿不可使用，肝肾有病的人应慎用。

强力霉素

【功用】抗菌谱与四环素相似，但对很多细菌如溶血性链球菌、肺炎球菌、部分革兰氏阳性菌、霍乱弧菌等的抗菌活性较四环素和土霉素强。临床适应症基本同四环素。

【用量用法】成人口服，首次 0.2 克，以后每次 0.1 克，每日 1~2 次。严重感染可按首次剂量应用于全疗程。治疗淋病 1 日内给予 0.3 克。儿童（体重小于 45 千克）首次每日每千克体重 4 毫克，以后维持量每日每千克体重 2 毫克，每日 1~2 次，口服。作用比四环素强 4~10 倍。

【不良反应】与四环素相似。

【注意事项】与四环素相同，但引起牙齿变色作用较其他四环素类小。

土 霉 素

【功用】主要用于固紫染色阳性球菌和阴性球菌的感染，也用于斑疹伤寒、恙虫病等立克次体的感染，对阿米巴痢疾及非典型性肺炎也有效。

【用量用法】成人，每次 0.5 克口服，每日 3~4 次。儿童按每日每千克体重 0.025~0.05 克，分 4 次服用。