




爱因斯坦文集

(增补本)

第 二 卷



商务印书馆

爱 因 斯 坦 文 集

(增补本)

第 二 卷

范岱年 赵中立 许良英 编译

商 務 中 書 館

2009 年 · 北京

图书在版编目(CIP)数据

爱因斯坦文集:增补本.第二卷/许良英等编译.
—北京:商务印书馆,2009
ISBN 978-7-100-06792-8

I. 爱… II. 许… III. 爱因斯坦, A. (1879~1955)—
文集 IV. N53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 178760 号

所有权利保留。

未经许可,不得以任何方式使用。

爱 因 斯 坦 文 集

(增补本)

第 二 卷

范岱年 赵中立 许良英 编译


商 务 印 书 馆 出 版
(北京王府井大街 36 号 邮政编码 100710)
商 务 印 书 馆 发 行
北京市白帆印务有限公司印刷
ISBN 978-7-100-06792-8

1977 年 3 月第 1 版 开本 850 × 1168 1/32
2009 年 12 月第 2 版 印张 21 插页 2
2009 年 12 月北京第 5 次印刷

定价:46.00 元



1905 年(爱因斯坦奇迹年),在伯尔尼瑞士联邦专利局办公室



1937 年的爱因斯坦, 由中国物理学家
周培源先生(1902—1993)拍摄

第二卷选编说明

爱因斯坦从 1901 年到 1955 年共发表了专门性的科学研究论文大约 200 篇,这一卷文集选译了其中有代表性的 37 篇。

这一卷选编的科学论文,包括三方面的内容,主要的分别简介如下。

(一) 相对论及其推广

1. 狭义相对论——第一篇论文是 1905 年 6 月的《论动体的电动力学》,这是爱因斯坦青年时代多年探索的结果,以完整的形式提出了等速运动下的相对性理论,提出了空间、时间的新概念。这是一篇引起物理学理论基础变革的重要文献。同时,作为相对论的一个推论,他又提出了质能相当关系,在理论上为原子能的应用开辟了道路。

2. 广义相对论——1907 年,爱因斯坦提出有必要把相对性理论从等速运动推广到加速运动,其基础就是惯性质量同引力质量的相当性。1912 年开始,他在 M. 格罗斯曼的合作下,用张量分析和曲面几何作为数学工具,终于在 1915 年 11 月 25 日的论文《引力场方程》中,建立了普遍协变的引力场方程,完成了广义相对论的逻辑结构。1916 年的论文《广义相对论的基础》就是这项工作的总结。三十年代以后,他在相对论的运动问题的研究上取得

了进展,这就是从场定律推导出运动定律。此外,早在1918年,他就预言引力波的存在。关于引力波的实验检验和理论探索,近年来在许多国家已经形成一个热潮。

3. 宇宙学——爱因斯坦建成广义相对论后不久,就试图用来考查宇宙空间问题,他的1917年的论文被认为是宇宙学的开创性文献。他在这篇论文中,为避免在空间无限处给广义相对论方程设立边界条件的困难,假设宇宙在空间上是有限无界的。他当初提出的这个宇宙模型是静止的,以后有人提出处于不断膨胀中的宇宙模型,由此预见了星系之间存在着彼此分离(后退)的运动。这种运动于1929年由天文上观测到星云光谱的红移而得到证实。

4. 统一场论——1923年以后,在别人工作的影响下,爱因斯坦又试图进一步推广相对论,企图建立一个既包括引力场又包括电磁场的统一场理论,用以解释物质的基元结构。他把自己后半生的主要精力都用在上面,先后提出过不少方案,在1929年、1945年和1954年曾取得一些进展,但都只停留在数学的表述形式上,没有得到有物理意义的结果。他在晚年悲叹:“我完成不了这项工作了;它将被遗忘,但是将来会被重新发现。”^①

(二) 量子论

自从1900年,M.普朗克提出量子假说,到1913年N.玻尔提出原子构造假说,这中间十来年,量子论的发展爱因斯坦起着主要的推动作用。他在1905年3月的论文《关于光的产生和转化的一

^① 1948年11月25日给M.索洛文的信。见本文集第一卷614页。

个试探性观点》中,把量子概念扩充到辐射的传播上去,提出了光量子(光子)假说,这是历史上第一次揭示了微观客体的波粒二象性,可是当时只有极少数物理学家支持这一理论,普朗克本人(尽管他对狭义相对论一开始就表示最热烈的支持)直至1913年还表示反对。1906年,爱因斯坦又把量子概念扩充到物体内部粒子的振动上去,解决了低温时固体的比热同温度变化的关系问题。1916年的论文《关于辐射的量子理论》,是量子论发展第一阶段的理论总结,它从玻尔的原子构造假说出发,用统计力学的方法导出普朗克的辐射公式。文中所提出的受激辐射理论,是六十年代蓬勃发展起来的激光技术的理论基础。1924年,当L. 德布罗意的物质波假说刚提出,他就用来处理单原子理想气体,同S. N. 玻色一起建立了玻色-爱因斯坦量子统计理论。这项工作,促成了电子波的实验证实,也推动了E. 薛定谔的波动力学的建立。

(三) 分子运动论

爱因斯坦最初发表的几篇论文,都是关于分子运动论和热力学方面的。1902年的《热平衡的运动论和热力学第二定律》和1903年的《热力学基础理论》两篇论文,独立地提出了类似于W. 吉布斯1901年提出的统计理论,为他以后建立光量子论和固体比热理论奠定基础。他的研究统计理论,有一个明确目的,就是要用来测定分子的实际大小,以解决当时科学思想战线上争论最激烈的问题:原子和分子究竟是否存在? 这项研究的结果就是1905年4月和5月关于液体中悬浮粒子运动的两篇论文,不仅在理论上完全解决了1827年发现的布朗运动,而且提出了测定分子

大小的新方法。三年后, J. B. 佩兰据此作出实验测定, 证实了爱因斯坦的理论预测。这一事实, 迫使最顽固的原子论反对者 W. 奥斯特瓦耳德和 E. 马赫不得不服输, 一时甚嚣尘上的反原子论的思潮终于宣告彻底破产。

爱因斯坦的科学研究论文是多方面的, 我们在编选和翻译他的科学论文集中, 遇到很多困难, 因此免不了有错误和疏漏之处, 切望同志们批评指正。

卷首印的爱因斯坦照片, 是周培源先生 1937 年在普林斯顿摄的。对周培源先生慨允我们在这个文集中刊印这张珍贵的照片, 谨致诚挚的谢意。

这次再版, 增补了 3 篇论文: 光化当量定律的热力学论证(1912 年 1 月); 关于广义相对论(1915 年 11 月 4 日)及其补遗(1915 年 11 月 11 日); 引力场方程(1915 年 11 月 25 日)。

编 译 者

1976 年 1 月于北京

2007 年 9 月修订

目 录

关于热平衡和热力学第二定律的运动论(1902 年 6 月)	1
热力学基础理论(1903 年 1 月)	21
关于光的产生和转化的一个试探性观点(1905 年 3 月)	41
分子大小的新测定法(1905 年 4 月)	60
热的分子运动论所要求的静液体中悬浮粒子的 运动(1905 年 5 月)	80
论动体的电动力学(1905 年 6 月)	92
物体的惯性同它所含的能量有关吗?(1905 年 9 月)	127
关于布朗运动的理论(1905 年 12 月)	131
论光的产生和吸收(1906 年 3 月)	143
普朗克的辐射理论和比热理论(1906 年 11 月)	151
附:对我的论文《普朗克的辐射理论和比热理论》的 更正(1907 年 2—3 月)	162
关于相对性原理和由此得出的结论(1907 年)	164
关于埃伦菲斯特的悖论(1911 年 5 月) 对 V. 瓦里恰克的论文的意见	229
关于引力对光传播的影响(1911 年 6 月)	231
光化当量定律的热力学论证(1912 年 1 月)	244
广义相对论和引力论纲要(1913 年) 同 M. 格罗斯曼合著	251

关于广义相对论(1915年11月4日)	299
关于广义相对论(补遗)(1915年11月11日)	311
用广义相对论解释水星近日点运动(1915年11月18日) ...	315
引力场方程(1915年11月25日)	326
广义相对论的基础(1916年)	331
关于辐射的量子理论(1916年)	392
根据广义相对论对宇宙学所作的考查(1917年)	410
关于广义相对论的原理(1918年3月)	423
论引力波(1918年)	427
引力场在物质的基元粒子的结构中起着主要作用	
吗?(1919年)	445
仿射场论(1923年)	455
对 S. N. 玻色的论文《普朗克定律和光量子假说》的	
评注(1924年6月)	461
附: S. N. 玻色: 普朗克定律和光量子假说	462
单原子理想气体的量子理论(一)(1924年9月)	467
单原子理想气体的量子理论(二)(1924年12日)	477
关于统一场论(1929年)	493
论引力波(1936年)	
同 N. 罗森合著	502
引力方程和运动问题(一)(1937年6月)	
同 L. 英费耳德和 B. 霍夫曼合著	516
引力方程和运动问题(二)(1939年5月)	
同 L. 英费耳德合著	567

空间膨胀对于各个星球周围的引力场的影响(1945 年 4—6 月)	
同 E. G. 斯特劳斯合著	581
相对论性引力论的一种推广(一)(1945 年 6 月)	593
相对论性引力论的一种推广(二)(1946 年 1 月)	
同 E. G. 斯特劳斯合著	603
广义引力论(1948 年 1 月)	620
非对称场的相对论性理论(1954 年)	632

关于热平衡和热力学第二定律的运动论^①

尽管热的运动论在气体理论领域中取得了多么大的成就,可是,到目前为止,这个普遍的热学理论还没有一个充分的力学基础,因为现在还不能仅仅利用力学方程和几率运算就推导出热平衡定理和热力学第二定律,虽然麦克斯韦(Maxwell)和玻耳兹曼(Boltzmann)的理论已经接近了这个目的。本文的目的就是要弥补这一缺陷。同时还想得到对于热力学的应用甚为重要的第二定律的推广。此外,还要从力学观点出发,得出熵的数学表示。

§ 1. 物理体系的力学图像

我们设想一个任意的物理体系可以用这样一个力学体系来描述,这个力学体系的状态可以用许多坐标 $p_1, \dots, p_n$ 和相应的速度

$$\frac{dp_1}{dt}, \dots, \frac{dp_n}{dt}$$

① 这是爱因斯坦第三篇公开发表的科学论文,写于1902年6月。当时他刚结束失业的生活,开始在伯尔尼(Bern)瑞士专利局任技术员(从1902年6月到1909年10月)。这篇论文所提出的热力学的统计理论,美国物理学家吉布斯(J. W. Gibbs, 1839—1903)在一年以前也得到了类似的结果,但爱因斯坦当时并不知道吉布斯的工作。这里译自莱比锡出版的《物理学杂志》(*Annalen der Physik*),第4编,9卷,1902年,417—433页。——编译者

来单值地确定。能量 E 同样是由势能 V 和动能 L 这两部分所组成,第一部分只是坐标的函数,第二部分是

$$\frac{dp_v}{dt} = p'_v$$

的二次函数,它们的系数是 p 的任意函数。应当有两种外力作用在这个体系的各个物体上。第一种力可由势函数 V_a 导出,它们应当反映外部条件(重力、没有热作用的固态壁等),这种力的势函数可以明显地包含时间,可是它关于时间的导数应当是很小的。第二种力不能从势函数导出,它们变化很快。可以把它们理解为引起热传导的力。如果没有这种力起作用,而且 V_a 不是明显地同时间有关,那么我们就得到了一个绝热过程。

我们还可以引进速度的线性函数——动量 $q_1, \dots, q_n$ 作为这个体系的状态变量,它们可以用下列形式的 n 个方程

$$q_v = \frac{\partial L}{\partial p_v}$$

来定义,这里 L 设想为 $p_1, \dots, p_n$ 和 $p'_1, \dots, p'_n$ 的函数。

§ 2. 关于 N 个具有几乎相等能量的 全同绝热定态体系的可能状态分布

假定有无限多(N)个完全相同的体系,它们的能量连续地分布于两个相差很小的确定能量值 $\bar{E}$ 和 $\bar{E} + \delta E$ 之间。假定不可能存在那些不能从势函数导出的外力,并且 V_a 不可以明显地含有时间,那么,这个体系是一个保守系。我们现在来研究状态分布,并假定这些状态都是定态。

我们作这样的假设:除了能量 $E=L+V_a+V_i$, 或者这些能量的函数以外, 对于一个孤立体系, 不存在不随时间变化而只同状态变量 p 和 q 有关的其他函数; 而且下面就只考虑满足这一条件的体系。我们的假设等于下面的假定: 我们的体系的状态分布由 E 的值来确定, 并且对于每组状态变量的任意起始值, 只有当它们满足我们的能量值条件时, 这种状态分布才能成立。实际上, 如果对于体系还存在另一种类型的条件, 即 $\varphi(p_1, \dots, q_n) = \text{常数}$, 而且不能把这种条件简化为 $\varphi(E) = \text{常数}$ 的形式, 那么, 通过适当选择起始条件, 显然可以实现: 对于 N 个体系中的每一个体系, φ 具有一个任意给定的值。可是因为这些值不随时间而变化, 由此得出: 比如, 量 $\sum \varphi$ (对所有体系的累加) 在给定 E 值的情况下, 通过适当选择起始条件, 也可以使它具有任意给定的值。可是, 另一方面, $\sum \varphi$ 是可以从状态分布单值地算出来的, 所以, 不同的 $\sum \varphi$ 值对应于不同的状态分布。由此我们可以看出, φ 这样的第二个积分的存在必然导致如下的结论: 状态分布不能仅仅由能量来确定, 它还必须取决于体系的起始条件。

用 g 来表示全部状态变量 $p_1, \dots, p_n, q_1, \dots, q_n$ 的一个无限小的区域, 这个区域是这样选择的: 如果状态变量属于区域 g , $E(p_1, \dots, q_n)$ 就处于 $\bar{E}$ 和 $\bar{E} + \delta E$ 之间, 那么, 状态分布可以用如下形式的方程来表述:

$$dN = \psi(p_1, \dots, q_n) \int_g dp_1 \dots dq_n,$$

这里 dN 表示状态变量在一定时间属于区域 g 的体系的数目, 这

个方程表述了分布是定态的这个条件。

我们现在选取这样一个无限小的区域 G 。于是,在任意给定的时间 $t=0$,其状态变量属于区域 G 的那种体系的数目为:

$$dN = \psi(P_1, \dots, Q_n) \int_g dP_1 \cdots dQ_n,$$

这里大写字母应当表示那些属于 $t=0$ 时的相倚变数。

现在我们允许推广到任意的时间。如果体系在 $t=0$ 时具有给定的状态变量 $P_1, \dots, Q_n$, 那么在 $t=t$ 的瞬间,体系将具有确定的状态变量 $p_1, \dots, q_n$. 并且,在 $t=0$ 时具有属于区域 G 的状态变量的体系,在 $t=t$ 的瞬间只能是状态变量属于确定的区域 g 的体系,因此下列方程成立:

$$dN = \psi(p_1, \dots, q_n) \int_g dp_1 \cdots dq_n.$$

可是对于任何这样的体系,刘维(Liouville)定理都成立,这个定理具有如下的形式:

$$\int dP_1 \cdots dQ_n = \int dp_1 \cdots dq_n.$$

从上面三个方程可以得出:

$$\psi(P_1, \dots, Q_n) = \psi(p_1, \dots, q_n). \quad ①$$

所以, ψ 是体系的不变量,如上所述,它必须具有形式 $\psi(p_1, \dots, q_n) = \psi \times (E)$. 可是对于全部所考察的体系, $\psi \times (E)$ 只是无限小地不同于 $\psi \times (\bar{E}) = \text{常数}$, 而我们的状态方程简单地表示为:

$$dN = A \int_g dp_1 \cdots dq_n,$$

① 参见 L. 玻耳兹曼:《气体理论》(*Gasttheorie*), 第二册, § 32 和 § 37. ——原注

这里 A 表示一个同 p 和 q 都无关的量。

§ 3. 关于体系 S 的状态的(定态)几率, 体系 S 同具有相对无限大能量的 体系 Σ 在力学上相联系

我们再考察无限多(N)个力学体系,它们的能量处于两个相差无限小的边界值 $\bar{E}$ 和 $\bar{E} + \delta\bar{E}$ 之间。而每一个这样的力学体系又是一个具有状态变量 $p_1, \dots, q_n$ 的力学体系 S 同另一个具有状态变量 $\pi_1, \dots, \chi_n$ 的体系 Σ 的力学的结合。上述两个体系的总能量的表示式应当是这样的,即由一个局部体系的物体作用于另一个局部体系的物体所产生的那部分能量,相对于局部体系 S 的能量 E 可以忽略不计。此外,局部体系 Σ 的能量 H 同 E 相比为无限大。于是,一直准确到高阶无限小,都可以置:

$$E = H + E.$$

现在我们在全部状态变量 $p_1 \dots q_n, \pi_1 \dots \chi_n$ 中选择这样一个无限小的区域 g ,使得 E 处于常数值 $\bar{E}$ 和 $\bar{E} + \delta\bar{E}$ 之间。于是,按照上一节的结果,其状态变量属于区域 g 之内的体系数目 dN 是:

$$dN = A \int_g dp_1 \dots d\chi_n.$$

现在我们注意到,我们可以随意地取某个连续的能量函数来代替 A ,这个函数当 $E = \bar{E}$ 时取 A 值。实际上,这样只是无限小地改变了我们的结果。我们选择 $A' \cdot e^{-2hE}$ 作为这个函数,这里 h 表示一个暂时还是任意的常数,我们很快就可以确定它。于是,我们写