

卫生专业技术资格考试专家委员会/策划编写

2009 卫生专业职称考试冲关捷径

人机对话版

普通外科学 全真模拟试卷

紧扣新版考试大纲 权威专家组建题库
内容涵盖全部考点 真实模拟考试环境

2009 卫生专业职称考试冲关捷径

普通外科学全真模拟试卷

PUTONG WAIKEXUE QUANZHEN MONI SHIJUAN

主 编 汤继文 姜剑军

副主编 程 雷 侯 勇 祁 磊 马胜忠

编著者 (以姓氏笔画为序)

马胜忠 王月琴 汤继文 祁 磊

何延勇 邹艳玲 赵晓阳 侯 勇

姜剑军 顾树明 程 雷 魏开斌

 人民军医出版社

PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

北 京

图书在版编目(CIP)数据

普通外科学全真模拟试卷/汤继文,姜剑军主编. —北京:人民军医出版社,2009.1

(卫生专业职称考试冲关捷径)

ISBN 978-7-5091-2268-6

I. 普… II. ①汤…②姜… III. 外科学—医药卫生人员—资格考核—习题 IV. R6-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 205209 号

策划编辑:王 琳 文字编辑:王 琳 责任审读:吴铁双

出 版 人:齐学进

出版发行:人民军医出版社

经销:新华书店

通信地址:北京市 100036 信箱 188 分箱

邮编:100036

质量反馈电话:(010)51927270;(010)51927283

邮购电话:(010)51927252

策划编辑电话:(010)51927409

网址:[www. pmmp. com. cn](http://www.pmmp.com.cn)

印刷:潮河印业有限公司 装订:京兰装订有限公司

开本:787mm×1092mm 1/16

印张:9.25 字数:296 千字

版、印次:2009 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

印数:0001~4000

定价:38.00 元

版权所有 侵权必究

购买本社图书,凡有缺、倒、脱页者,本社负责调换

出版说明

为了满足卫生专业技术人员晋升中级资格应试的需要,人民军医出版社连续多年组织具有丰富试题编写经验的各学科专家以全真模拟试卷的形式编写了《卫生专业职称考试冲关捷径》丛书。本丛书的特点是紧密围绕考试大纲,符合指导用书和临床实践需要,目的是使应试者提高业务能力和应试成绩,顺利通过中级职称考试。我们相信,只要应试者认真复习、掌握试卷所涉及的内容,踏踏实实做模拟试卷,就一定能够顺利通过考试。

本丛书依照最新考试大纲,以全真模拟试题形式将考纲中所有知识点与各学科的系统知识结合起来,经过精心编排,模拟真实的考试环境,为考生提供了将考纲重点、知识难点、解题要点、正确答案相结合的高效率复习模式。力争通过试题将考点融会贯通,为准备晋升的医师提供复习、应试的捷径。特别提醒:复习和做模拟题时,千万不要把主要精力放在背记试题和答案上。

在编写本模拟试卷的过程中,编者得到了多方的支持与帮助,在此表示诚挚的谢意。由于参与编写的人员较多,编写时间仓促,错误或疏漏之处,殷切希望广大读者批评指正,以便及时纠正和改进。

最后,衷心祝愿大家顺利通过考试!

编 者

2008年10月

目 录

全真模拟试卷一	(1)	专业实践能力	(79)
基础知识	(1)	答案	(83)
相关专业知识	(8)	全真模拟试卷四	(85)
专业知识	(15)	基础知识	(85)
专业实践能力	(22)	相关专业知识	(92)
答案	(27)	专业知识	(99)
全真模拟试卷二	(29)	专业实践能力	(106)
基础知识	(29)	答案	(111)
相关专业知识	(36)	全真模拟试卷五	(113)
专业知识	(44)	基础知识	(113)
专业实践能力	(51)	相关专业知识	(120)
答案	(55)	专业知识	(127)
全真模拟试卷三	(57)	专业实践能力	(134)
基础知识	(57)	答案	(139)
相关专业知识	(64)	人机对话网络版试卷及答案	(141)
专业知识	(72)		

全真模拟试卷一

基础知识

第一部分 单选题

本部分在答题过程中可以回退(对已作答试题可返回检查或修改答案)。

单选题(每题1个得分点):以下每道试题有5个备选答案,请从中选择1个最佳答案。

1. 低渗性脱水中度缺钠时,血钠低于
 - A. 145mmol/L
 - B. 140mmol/L
 - C. 135mmol/L
 - D. 130mmol/L
 - E. 120mmol/L
2. 穿无菌衣和戴无菌手套后,必须保持的无菌区域除双上肢外,还需包括
 - A. 整个胸、腹、背部
 - B. 整个颈、胸、腹、背、肩部
 - C. 腰部以上的胸部和背部
 - D. 腰部以上的胸部和背部
 - E. 腰部以上的前胸和侧胸
3. 下列哪项不符合低钾血症的临床表现
 - A. 肌无力,腱反射减退
 - B. 腹胀,肠麻痹
 - C. 心率快,心律异常
 - D. 尿量少,呈碱性
 - E. 代谢性碱中毒
4. 低渗性缺水的主要病因是
 - A. 大量出汗
 - B. 应用大量利尿酸或呋塞米(速尿)
 - C. 尿崩症
 - D. 急性肠梗阻
 - E. 弥漫性腹膜炎
5. 关于代谢性酸中毒的治疗下列哪项是错误的
 - A. 在治疗过程中不需要补钾
 - B. 对严重酸中毒病人,应使用碱性药物
 - C. 必须进行病因治疗
 - D. 不应将补碱公式计算的 HCO_3^- 需要量一次性输入
 - E. 在纠正酸中毒后,应适当补钙
6. 皮肤消毒范围要超出手术切口周围
 - A. 5cm 以上
 - B. 10cm 以上
 - C. 15cm 以上
 - D. 20cm 以上
 - E. 25cm 以上
7. 下列关于输血的作用,哪项不正确
 - A. 可补充血容量
 - B. 改善循环
 - C. 输入抗体可杀灭细菌
 - D. 促进伤口愈合
 - E. 改善凝血功能,利于止血
8. 对心室纤颤,最有效的除颤方法是
 - A. 有效的心脏按摩
 - B. 电击除颤
 - C. 反复心内注射利多卡因
 - D. 心内注射升压药,使细颤变为粗颤
 - E. 心内注射碱性药物
9. 代谢性酸中毒的原发改变是
 - A. 血中 HCO_3^- 增多, $\text{CO}_2\text{CP} \downarrow$ pH $\downarrow$
 - B. 血中 NaHCO_3^- 减少, $\text{CO}_2\text{CP} \downarrow$ pH $\downarrow$
 - C. 血中 NaHCO_3^- 减少, $\text{CO}_2\text{CP} \uparrow$ pH $\uparrow$
 - D. 血中 NaHCO_3^- 增多, $\text{CO}_2\text{CP} \uparrow$ pH $\uparrow$
 - E. 血中 HCO_3^- 减少, $\text{CO}_2\text{CP} \downarrow$ pH $\uparrow$
10. 关于气管内插管,下列哪项是不正确的
 - A. 气管内插管插入过深时,极易插入左支气管
 - B. 昏迷病人经口气管内插管,一般以维持 24~48 小时为限,超过此限应行气管切开
 - C. 婴幼儿一般不用带套囊的导管
 - D. 下颌发育不全的病人,通常经口腔明视插管的操作是困难的
 - E. 口腔内手术,经鼻腔插管手术方便
11. 下列哪项因素不影响腰麻平面

- A. 穿刺间隙
 - B. 病人体位
 - C. 注药速度
 - D. 麻药容积
 - E. 局麻药效能
12. 术前准备中,下列哪项处理不正确
- A. 心力衰竭的病人需控制 3~4 周后才实行手术
 - B. 经常发作哮喘的病人,可每日 3 次口服地塞米松 0.75mg
 - C. 肝功能严重损害者,一般不宜实行任何手术
 - D. 糖尿病病人大手术前,必须将血糖控制到正常,尿糖阴性的水平,才能手术
 - E. 肾功能重度损害者,只要在有效的透析疗法处理下,仍能安全地耐受手术
13. 下列哪项不符合全胃肠外营养所用的营养液的要求
- A. 每日供氮应达 0.2~0.24g/kg 体重
 - B. 适量补充胰岛素和脂肪乳剂
 - C. 含有适量的电解质、维生素和微量元素
 - D. 氮和热量之比为 1:100kcal
 - E. 所补充的必需氨基酸和非必需氨基酸的含量一般应为 1:2
14. 关于外科应用抗菌药物,下列哪项是正确的
- A. 当手术时间较长,可在术中追加抗菌药一次的剂量
 - B. 所有外科感染都需应用抗菌药物
 - C. 术后常规应用抗菌药物 7 天
 - D. 手术前后抗菌药物的应用可弥补无菌操作的不足
 - E. 常规应用广谱抗生素
15. 下列哪些创伤需注射破伤风抗毒素
- A. 污染明显的创伤
 - B. 深的创伤
 - C. 开放性创伤包括大面积烧伤
 - D. 创伤未能及时处理或处理欠妥
 - E. 以上都对
16. 面部“危险三角区”疖的危险性在于
- A. 引起鼻窦炎
 - B. 引起颅内感染
 - C. 引起眼球感染
 - D. 容易发展成痈
 - E. 治疗困难
17. 损伤后体液代谢改变的调节主要是通过
- A. 增加 K^+ 的排出量
 - B. 增加 H^+ 的排出量
 - C. 减少 Na^+ 的绝对排出量
 - D. 增加 CO_2 的排出量
 - E. 减少尿的排出量
18. 烧伤后早期休克的主要原因是
- A. 丢失红细胞
 - B. 毛细血管通透性增加,血浆成分丢失
 - C. 烧伤区水分蒸发加速
 - D. 创面感染
 - E. 心功能降低
19. 下列哪种肿瘤癌胚抗原阳性率最高
- A. 胃癌
 - B. 淋巴瘤
 - C. 肝癌
 - D. 骨肉瘤
 - E. 结肠癌
20. 下列属于实质性大器官移植的是
- A. 胰岛移植
 - B. 库存骨移植
 - C. 肾移植
 - D. 足趾移植
 - E. 神经移植
21. 易发生挤压综合征的挤压伤部位是
- A. 头颈部
 - B. 胸部
 - C. 上肢
 - D. 大腿和臀部
 - E. 足和小腿
22. 最简单而有效的人工呼吸法是
- A. 仰卧压胸法
 - B. 口对口人工呼吸法
 - C. 俯卧压背人工呼吸法
 - D. 仰卧举臂压胸法
 - E. 气管内插管人工呼吸法
23. 一烧伤患者,体重 50kg,行暴露疗法后诉口渴,查体见:唇舌较干,皮肤弹性差,眼窝凹陷,则其当天需补给液体
- A. 1 500ml
 - B. 2 500ml
 - C. 3 000ml
 - D. 4 000ml
 - E. 4 500ml
24. 患者,女,50 岁,因胃溃疡行胃大部切除术,术后切口血肿,但尚未化脓,则该患者的切口为
- A. I 类切口/丙级愈合

- B. II类切口/乙级愈合
- C. II类切口/丙级愈合
- D. III类切口/乙级愈合
- E. III类切口/丙级愈合

25. 患者,男,35岁,在锅炉爆炸中被烧伤,被烧伤部位有面部、颈部、双手、双前臂、双足、双小腿及会阴部,则该患者烧伤面积为

- A. 24%
- B. 30%
- C. 38%
- D. 37%
- E. 47%

26. 患者,女,32岁,因车祸导致昏迷,在运送患者的过程中,为防止舌后坠,保持呼吸道通畅,最简便有效的办法是

- A. 气管切开
- B. 气管插管
- C. 将患者下颌骨后推
- D. 将舌拉出口外并固定
- E. 头偏向一侧

27. 患者,男,54岁,因外伤致右小腿皮肤裂伤,经清创缝合伤口3~5天后,患者高热,伤处肿胀、发红、剧痛,此时宜

- A. 继续观察
- B. 加大抗生素剂量
- C. 局部理疗
- D. 及时拆除缝线、引流
- E. 伤口内注射抗生素

28. 男性患者,25岁,因胸部被汽车撞伤,左胸4~7肋骨骨折,皮下气肿与瘀斑,心音消失,颈、股动脉未扪及搏动,已做气管插管人工呼吸法,尚应采取

- A. 输血、输液、抗休克
- B. 经鼻管立即给氧
- C. 胸外心脏按压
- D. 胸内心脏按压
- E. 胸外心脏按压加心内注射肾上腺素

29. 一妇女孕3个月,诉近来呼吸困难来诊,查体见甲状腺体较大,脉搏105次/分,两手颤动,则对该患者治疗下列哪项为宜

- A. 无需特殊处理,观察病情发展
- B. 口服治疗甲亢药物,如甲亢平
- C. 口服碘剂
- D. 做术前准备,手术治疗
- E. 放射治疗

30. 一个电工在带电进行线路检查时突然大叫一声,摔倒在地无任何反应,如何判定患者呼吸心跳停止

- A. 无自主呼吸
- B. 神志消失
- C. 大动脉无搏动
- D. 去医院心电图检查
- E. 听诊心音

第二部分 共用题干单选题

进入此部分试题后,您不能返回前面部分查看试题或修改答案;本部分在答题过程中不能回退,(对已作答题目不能返回检查或修改答案)。

共用题干单选题(每个提问1个得分点):以下每道试题有2~8个提问,每个提问有5个备选答案,请选择1个最佳答案。

(31—34题共用题干)

女性患者,66岁,糖尿病病史11年,颈部一痈溃破,经抗生素治疗2周未见好转,近日体温明显升高,面色潮红,周身出现皮疹,背部一区域有水肿,压痛明显。

31. 此时宜考虑

- A. 金黄色葡萄球菌感染性脓毒症
- B. 变形杆菌感染性脓毒症
- C. 白色念珠菌感染性脓毒症
- D. 铜绿假单胞菌感染性脓毒症
- E. 大肠埃希菌感染性脓毒症

32. 该患者行清创术及联合应用抗生素,病情好转,体温下降至37.3℃,故持续应用大剂量广谱抗生素以期控制感染,10天后患者突然发生寒战、高热,体温达39.8℃,出现神志淡漠、嗜睡及休克,白细胞计数 $25 \times 10^9/L$,此时应考虑并发

- A. 真菌性脓毒症
- B. 中毒性休克
- C. 革兰阳性细菌脓毒症
- D. 革兰阴性细菌脓毒症
- E. 铜绿假单胞菌脓毒症

33. 为确诊其再次高热原因,宜

- A. 抽骨髓做细菌培养
- B. 抽血做真菌检查和培养
- C. 抽血做普通细菌学检查
- D. 抽血做厌氧性培养
- E. 胸部X线平片及CT

34. 如该患者上述诊断成立,应如何处理

- A. 加大抗生素的剂量
- B. 输血,进行抗休克治疗
- C. 联合使用物理和化学疗法降温
- D. 停止使用原广谱抗生素,改全身应用抗真菌药物
- E. 应用肾上腺皮质激素或人工冬眠,减轻中毒症状

(35—38 题共用题干)

男,56岁,体重60kg,因食管癌饮食困难20余天入院,口渴严重,血 Na^+ 155mmol/L。

35. 该患者补液宜选用
 - A. 0.47%氯化钠注射液
 - B. 0.9%氯化钠注射液
 - C. 5%氯化钠注射液
 - D. 血浆
 - E. 平衡盐液
36. 患者第一天的补水量是
 - A. 2000ml
 - B. 3000ml
 - C. 3560ml
 - D. 4060ml
 - E. 5120ml
37. 如该患者出现缺钾,在补钾治疗时,尿量应大于
 - A. 20ml/h
 - B. 30ml/h
 - C. 40ml/h
 - D. 45ml/h
 - E. 60ml/h
38. 经过治疗后症状体征改善患者仍存在的异常是
 - A. 尿量50ml/h
 - B. 血氯110mmol/L
 - C. 白细胞 $9.8 \times 10^9/\text{L}$
 - D. 血钠138mmol/L
 - E. 血钾3.6mmol/L

(39—42 题共用题干)

男性,43岁,面部疖肿挤压后寒战高热,局部肿胀明显,全身皮肤散在淤血点,血白细胞 $18 \times 10^9/\text{L}$,中性90%。

39. 初步诊断为
 - A. 菌血症
 - B. 毒血症
 - C. 败血症

- D. 脓血症
- E. 急性蜂窝织炎

40. 对该患者的治疗不恰当的是

- A. 休息
- B. 理疗
- C. 抗生素
- D. 不要挤压
- E. 及早切开引流

41. 若处理不当可引起

- A. 败血症
- B. 蜂窝织炎
- C. 脑脓肿
- D. 海绵状静脉窦炎
- E. 脑膜炎

42. 以下治疗措施中错误的是

- A. 大剂量联合应用抗生素
- B. 等血培养结果后再处理
- C. 纠正水电解质紊乱
- D. 不宜扩大引流
- E. 必要时输血

(43—44 题共用题干)

男性患者,28岁,急性肠梗阻3天入院。查体:呼吸28次/分,血压75/60mmHg,血钠130mmol/L,血钾3mmol/L, CO_2CP 19mmol/L。

43. 目前诊断中应除外

- A. 低钾血症
- B. 低钠血症
- C. 休克
- D. 呼吸性碱中毒
- E. 代谢性碱中毒

44. 治疗程序首先是

- A. 纠正酸中毒
- B. 补钾
- C. 输全血
- D. 抗休克补充血容量
- E. 急症手术解除梗阻

(45—47 题共用题干)

女性,50岁,车祸后4小时,全身多处骨折,查体:血压80/50mmHg,脉搏126次/分,呼吸32次/分,经补液输血后,血压、中心静脉压均不升高。

45. 可能的原因是

- A. 补液过多
- B. 补液不足
- C. 急性肾衰竭

- D. 心力衰竭
- E. 升压药无效

46. 进一步治疗应

- A. 加大缩血管药剂剂量
- B. 强心
- C. 利尿
- D. 扩血管
- E. 继续快速补液

47. 诊断明确后,应采取何种治疗方法

- A. 镇静,止痛治疗
- B. 留置导尿管
- C. 剖腹探查术
- D. 持续胃肠减压
- E. 输液输血治疗

(48—51 题共用题干)

女性患者,56岁,十二指肠溃疡病史7年,时常发作,自觉今年逐渐加重,今日晨起突然腹痛难忍,呈刀割样,由上腹开始,很快扩散至全腹,来诊,见患者面色苍白,冷汗,肢体发凉,血压105/90mmHg,脉搏93次/分,查体时患者表情痛苦,不敢深呼吸,全腹压痛,反跳痛,肌紧张明显。

48. 考虑该患者是

- A. 急性胰腺炎
- B. 急性阑尾炎
- C. 急性化脓性梗阻性胆管炎
- D. 胃十二指肠溃疡急性穿孔
- E. 急性胆囊炎

49. 为确诊,宜做下列哪项检查

- A. 立位腹X线平片
- B. 血常规检查
- C. 血清淀粉酶测定
- D. B超检查
- E. 肛门指检

50. 患者如拍立位腹X线平片,出现下述哪种征象有助于前述诊断

- A. 无明显异常
- B. 左膈升高,胃受压右移,胃结肠间距增宽
- C. 腰大肌阴影消失
- D. 膈下见半月形的游离气体影
- E. 见多数液平面和气囊肠襻

51. 宜如何处理

- A. 半卧位休息
- B. 胃肠减压和针刺
- C. 输液
- D. 全身给抗生素

- E. 以上各项均对

(52—60 题共用题干)

患者,男性,55岁,患有胃溃疡10年,突然出现头晕、乏力、心慌,来院急诊,查血常规,发现血红蛋白50g/L。

52. 除胃溃疡的常规治疗,下列哪种治疗最重要

- A. 禁食
- B. 输血
- C. 抗感染
- D. 胸部透视
- E. 休息

53. 进行输血时,输血速度一般调节在每分钟

- A. 5~10滴
- B. 10~20滴
- C. 1~2ml
- D. 2~3ml
- E. 4~6ml

54. 输入的库血,贮存日期超过多长时间不能输用

- A. 1周
- B. 2周
- C. 3周
- D. 4周
- E. 5周

55. 该患者输血时,较为常见的并发症为

- A. 溶血反应
- B. 细菌污染
- C. 循环负荷过量
- D. 疟疾
- E. 发热反应

56. 患者输血后1小时,发生寒战、高热、头痛,测血压102/80mmHg,此时应考虑

- A. 过敏反应
- B. 溶血反应
- C. 发热反应
- D. 细菌污染反应
- E. 疟疾感染

57. 输血发热反应的主要治疗是

- A. 减慢输血速度
- B. 给予皮质类固醇药物
- C. 给予苯海拉明25mg口服
- D. 碱化尿液
- E. 给广谱抗生素

58. 当患者输入第2袋血时出现腰背剧痛,心

前区压迫感,应考虑

- A. 发热反应
- B. 溶血反应
- C. 过敏反应
- D. 细菌污染反应
- E. 排斥反应

59. 下列哪项是错误的

- A. 给予5%碳酸氢钠 250ml 静脉滴注
- B. 减慢输血速度
- C. 应用甘露醇
- D. 血浆交换治疗
- E. 应用糖皮质激素

60. 患者出现肾衰竭,尿量减少,所谓少尿是指每日尿量在

- A. 800ml 以下
- B. 600ml 以下
- C. 500ml 以下
- D. 400ml 以下
- E. 100ml 以下

第三部分 共用备选答案单选题

(每题1个得分点)以下试题中,每连续的两个或多个试题使用相同的5个备选答案,请从中为每道试题选择1个最佳答案。每个备选答案可被选择一次、多次或不被选择。

(61—64 题共用备选答案)

- A. 肾前性肾衰竭
- B. 肾后性肾衰竭
- C. 肾性肾衰竭
- D. 以上都是
- E. 都不是

- 61. 休克引起的肾衰竭
- 62. 双侧输尿管结石引起的肾衰竭是
- 63. X线造影剂引起的肾衰竭
- 64. 挤压伤引起的肾衰竭是

(65—67 题共用备选答案)

- A. 痈
- B. 疖
- C. 丹毒
- D. 淋巴管炎
- E. 急性蜂窝织炎

- 65. 伤口附近皮肤出现“红线”是
- 66. 病变区与正常皮肤界限清楚的是
- 67. 相邻多个毛囊及其所属皮肤脂腺的急性化

脓性感染是

(68—70 题共用备选答案)

- A. 腹股沟疝修补术
- B. 胃大部切除术
- C. 胆囊切除术
- D. 阑尾穿孔切除术
- E. 小肠绞窄性梗阻部分切除术

68. 无菌切口指

69. 污染切口指

70. II类切口指

(71—72 题共用备选答案)

- A. A型血病人
- B. B型血病人
- C. O型血病人
- D. O型或B型血病人
- E. O型或A型血病人

71. 接受A型血的包括

72. 接受B型血的包括

(73—77 题共用备选答案)

- A. 290~310mmol/L
- B. 135~145mmol/L
- C. 3.5~5.5mmol/L
- D. 7.35~7.45mmol/L
- E. 2.25~2.75mmol/L

73. 血渗透压正常值为

74. 血清钾正常值为

75. 血清钠正常值为

76. 血清钙正常值为

77. 动脉血浆的pH值

(78—82 题共用备选答案)

- A. B病毒
- B. 单纯疱疹病毒
- C. 乙肝病毒
- D. C型RNA病毒
- E. 埃及血吸虫

78. 与鼻咽癌有关的是

79. 与白血病有关的是

80. 与肝癌有关的是

81. 与宫颈癌有关的是

82. 与膀胱癌有关的是

(83—87 题共用备选答案)

- A. 烷化剂
- B. 亚硝胺类
- C. 苏铁素
- D. 氨基偶氮类
- E. 氟乙烯

83. 肺癌的发生与哪项化学因素有关
84. 胃癌的发生与哪项化学因素有关
85. 肝癌的发生与哪项化学因素有关
86. 膀胱癌的发生与哪项化学因素有关
87. 人肝血管肉瘤的发生与哪项化学因素有关

(88—90 题共用备选答案)

- A. 葡萄球菌
- B. 大肠埃希菌
- C. 铜绿假单胞菌
- D. 变形杆菌
- E. 溶血性链球菌

88. 原发性腹膜炎的病原菌是
89. 继发性腹膜炎的病原菌是
90. 骨科手术感染的常见细菌是

第四部分 多选题

(每题 1 个得分点)以下每道试题有 5 个备选答案,其中正确答案为两个或者两个以上,多选、少选、错选均不得分。

91. 感染性休克时的救治包括
A. 改善微循环
B. 去除病因及感染灶
C. 选择合适的抗菌药物
D. 必要时应用足量的肾上腺皮质激素
E. 营养支持
92. 脑复苏低温疗法的作用是
A. 提高脑组织耗氧量
B. 提高脑组织对缺氧的耐受性
C. 降低颅内压
D. 减慢脑组织病变的发展
E. 减轻脑水肿
93. 下列疾病应及早切开引流
A. 口底蜂窝织炎
B. 丹毒
C. 唇痈
D. 面部疖
E. 脓性指头炎
94. 急性化脓性感染时为改善局部血运可采用
A. 患肢抬高
B. 外用药物敷贴
C. 夹板或石膏固定
D. 湿热敷
E. 大剂量抗生素
95. 良性肿瘤在短期内增大提示
A. 肿瘤内出血
B. 囊性变
C. 恶性变
D. 继发感染
E. 转移
96. 游离植皮时,术前准备应包括
A. 供皮区常规进行备皮
B. 小儿不必剃毛
C. 大面积烧伤切除焦痂者,要备足够量血液
D. 受皮区肉芽创面水肿,应以生理盐水纱布换药
E. 取皮时以 2.5% 碘酊和 70% 乙醇消毒
97. 休克期的临床表现是
A. 表情淡漠
B. 血压变化不大
C. 尿量减少
D. 脉快
E. 脸色苍白
98. 外科病人补充维生素时,下列哪些正确
A. 禁食 2~3 天以后需补充维生素 B、维生素 C
B. 营养不良病人需补充大量维生素 C
C. 手术后对 B 族维生素的需要量增加
D. 阻塞性黄疸病人需补充足够量维生素 K
E. 术前应用磺胺药进行肠道准备,需补充维生素
99. 低血钾时静脉补充钾盐,下列哪些项目是正确的
A. 严重缺钾时,每日可补充氯化钾 6~8g
B. 氯化钾的浓度不宜超过 0.3%
C. 滴速每分钟不宜超过 80 滴
D. 尿量充分时较为安全
E. 必要时,可用 10% KCl 静脉推注
100. 在高渗性缺水的诊治中,下述哪些项目正确
A. 早期的主要症状是口渴
B. 轻度缺水的缺水量为体重的 2%~4%
C. 烦躁、昏迷和血压下降提示重度缺水
D. 治疗以给予 5% 葡萄糖溶液或低渗盐水为宜
E. 血清钠浓度 > 142 mmol/L

相关专业知识

第一部分 单选题

本部分在答题过程中可以回退(对已作答试题可返回检查或修改答案)。

单选题(每题1个得分点):以下每道试题有5个备选答案,请从中选择1个最佳答案。

- 下列哪种并发症主要发生于骨折早期
 - 骨化性肌炎
 - 创伤性关节炎
 - 脂肪栓塞
 - 关节僵硬
 - 坠积性肺炎
- 若患者已有明显颅内压增高体征,则不应做下列哪项检查
 - 头部MRI
 - 颅骨X线片
 - 腰椎穿刺
 - 头部CT
 - 头部ECT
- 正常人脑脊液总量为
 - 60~80ml
 - 80~100ml
 - 100~150ml
 - 150~200ml
 - 200~250ml
- 腹外疝发病原因中最重要的是
 - 慢性咳嗽
 - 长期便秘
 - 排尿困难
 - 腹部手术后
 - 腹壁有薄弱点或腹壁缺损
- 严重大面积烧伤时,体液渗出的高峰出现在伤后
 - 48小时
 - 24小时
 - 12小时
 - 6小时
 - 2小时
- 前臂骨折导致骨筋膜室压力增高,当压力达到多少可使供应肌肉的小动脉关闭
 - 40mmHg
 - 45mmHg
 - 50mmHg
 - 60mmHg
 - 65mmHg
- 原发性恶性骨肿瘤X线一般表现为
 - 骨质破坏,边界不清,骨膜反应不明显
 - 骨质缺损,边界清楚,骨膜反应明显
 - 骨质密度显著增高,边界不清,骨膜反应明显
 - 骨质破坏,边界不清,骨膜反应明显
 - 骨质破坏,边界清楚,骨膜反应明显
- 先天性肥厚性幽门狭窄患儿的呕吐为
 - 胆汁样液
 - 粪便样液
 - 偶尔发生,呕吐量少
 - 喷射样,进行性加重
 - 以上都不对
- 目前关于乳腺癌检出方法中,最有效的是
 - 近红外线扫描
 - B超
 - 钼靶摄片
 - MRI
 - 普通X线片
- 腰椎间盘突出症的病因,哪项正确
 - 急性损伤是腰椎间盘突出症的最常见原因
 - 发病无阳性家族史
 - 椎间盘退行性变是基本因素
 - 腰椎融合术后有利于预防相邻节段椎间盘突出
 - 妊娠不会增加椎间盘突出的机会
- 无痛性肉眼全程血尿最常见的原因是
 - 泌尿系感染
 - 泌尿系损伤
 - 泌尿系结核
 - 泌尿系结石
 - 泌尿系肿瘤
- 诊断原发性下肢深静脉瓣膜关闭不全最可靠的检查方法是
 - 下肢静脉多普勒检查

- B. 静脉测压
C. 深静脉通畅试验
D. 静脉造影
E. 深浅静脉交通支瓣膜功能试验
13. 大面积烧伤休克期患者出现烦躁,多由于
A. 疼痛
B. 血容量不足
C. 早期感染
D. 中枢神经系统刺激
E. 心理因素
14. 膀胱肿瘤的 T3 期是指
A. 乳头状无浸润
B. 限于固有层内
C. 肿瘤浸润浅肌层
D. 肿瘤浸润深肌层或穿透膀胱壁
E. 浸润前列腺
15. 在先天性心脏病中发生率最高的是
A. 动脉导管未闭
B. 肺动脉口狭窄
C. 室间隔缺损
D. 房间隔缺损
E. 法洛四联症
16. 急性硬膜外血肿最常见的出血来源是
A. 大脑中动脉
B. 颈内动脉
C. 脑膜中动脉
D. 矢状窦
E. 窦汇
17. 最常见的食管良性肿瘤是
A. 息肉
B. 乳头状瘤
C. 腺瘤
D. 平滑肌瘤
E. 血管瘤
18. 主动脉窦瘤最多发生于
A. 无冠状动脉窦
B. 左冠状动脉窦
C. 右冠状动脉窦
D. 左冠状动脉窦+右冠状动脉窦
E. 左冠状动脉窦+无冠状动脉窦
19. 恶性度较高的胃癌发生跳跃式转移,最常见的部位是
A. 腹腔淋巴结
B. 腹主动脉旁淋巴结
C. 左侧锁骨上淋巴结
D. 纵隔淋巴结
E. 肝十二指肠韧带淋巴结
20. 女性患者,50岁,尿频、尿急、尿痛,伴尿后滴血4天,查尿常规红细胞2/HP、白细胞2/HP,下列哪项检查是不能做的
A. 尿细菌培养加药敏
B. 细胞学检查
C. 膀胱镜
D. 泌尿系B超检查
E. IVP
21. 男性患者,43岁,胸背痛1.5年,双下肢无力1个月,以右侧著。行脊髓腔碘油造影显示,胸椎10水平造影剂在肿瘤下端梗阻,梗阻面造影剂呈“杯口状”充盈缺损,肿瘤影偏右侧,脊髓影被肿瘤推向左侧。此处肿瘤最可能是
A. 脂肪瘤
B. 血管瘤
C. 神经鞘瘤
D. 皮样囊肿
E. 室管膜瘤
22. 男性患者,25岁,左手示指不慎被切割离断,欲前往医院就诊。当气温较高时,用消毒敷料包裹的肢体可采用何种方法转运
A. 置放在冷生理盐水中
B. 置放在温生理盐水中
C. 用塑料袋封闭后放入冰盒内
D. 直接放在冰盒内
E. 置放在冷水中
23. 新生儿出生后4天,呕吐粪便样液,腹胀如鼓,并可见肠型,在问病史中最重要的是
A. 是否顺产
B. 排尿情况
C. 排胎便情况
D. 生产时有无窒息史
E. 黄疸情况
24. 男性患者,32岁,突发性呕血4小时,暗红色,量约500ml,既往无类似病史。查体:生命体征正常范围,血红蛋白90g/L,剑突下轻压痛,下列最有助于诊断的检查方法为
A. 上消化道钡餐
B. 纤维胃镜
C. 腹部B超
D. 血管造影
E. 腹部CT

25. 男性患者,35岁,上腹疼痛伴反酸烧心2年,昨日突然出现呕血,总量约250ml,伴黑粪,最大可能出血的原因是
- 胆道出血
 - 胃、十二指肠溃疡出血
 - 食管胃底静脉曲张破裂出血
 - 胃癌出血
 - 应激性溃疡出血
26. 女性患者,68岁,因左侧膝关节骨性关节炎,屈曲挛缩畸形 30° ,内翻畸形 10° ,接受人工全膝关节置换术,术后患肢足背麻木,踝背伸无力,可能发生的并发症为
- 假体移位
 - 敷料包扎过紧
 - 胫前动脉损伤
 - 腓总神经麻痹
 - 胫神经损伤
27. 男性患者,55岁,腰部不适4年,间歇性跛行1年,加重10天去医院就诊,无外伤史,无烟酒等不良嗜好,在体格检查中最可能出现的结果是
- 双下肢肌力明显减弱
 - 直腿抬高试验阳性
 - 足背动脉搏动减弱
 - 腰部阳性体征不明显
 - 双膝反射亢进
28. 患者,男,35岁,车祸后出现单侧完全性视野缺失,其可能的原因是
- 一侧视神经损伤
 - 视交叉损伤
 - 一侧视束损伤
 - 一侧视放射损伤
 - 一侧枕叶皮质损伤
29. 男性患者,26岁,咳嗽、咳痰及痰中带豆腐渣样物2天。胸部CT显示心底部心脏大血管前侧直径6cm肿块,密度不均,内有钙化灶。最可能的诊断是
- 肺脓肿
 - 神经源性肿瘤
 - 畸胎瘤
 - 胸腺瘤
 - 肺结核
30. 患者男性,52岁。原发性肝癌手术治疗后出院,3个月 after 门诊复查,下列哪项不是必需的检查

- 肝脏B超
- AFP测定
- 胸部X线片
- CEA测定
- 肝功能

第二部分 共用题干单选题

进入此部分试题后,您不能返回前面部分查看试题或修改答案;本部分在答题过程中不能回退(对已作答试题不能返回检查或修改答案)。

共用题干单选题(每个提问1个得分点):以下每道试题有2~8个提问,每个提问有5个备选答案,请选择1个最佳答案。

(31—33题共用题干)

患者,男,35岁,半年前打篮球时扭伤腰部,腰痛明显,休息后缓解。3天前搬重物时腰痛复发,并向右臀放射,右小腿外侧麻木。查体:右小腿外侧感觉减退,右侧直腿抬高试验阳性。

31. 初步诊断为
- 腰椎管狭窄症
 - 腰椎间盘突出症
 - 腰肌劳损
 - 腰椎结核
 - 腰椎肿瘤
32. 应行下列哪项检查明确诊断
- 腰椎X线片
 - 腹部X线平片
 - 腰椎CT
 - 尿常规
 - 腹部透视
33. 目前不应采取的治疗措施是
- 卧硬板床休息
 - 口服止痛药
 - 理疗
 - 手术
 - 外用止痛药

(34—36题共用题干)

患者女性,60岁,因瘫痪长期卧床,骶尾部形成压疮,面积约 $5\text{cm} \times 6\text{cm}$ 。

34. 压疮发生的主要因素是
- 局部过度受压
 - 皮肤刺激
 - 营养不良
 - 维生素缺乏

E. 翻身次数过多

35. 该患者治疗措施不当的是

- A. 加强全身营养
- B. 局部换药
- C. 全身应用抗生素
- D. 手术清创处理
- E. 全身应用激素

36. 以下哪项不是压疮的好发部位

- A. 坐骨结节
- B. 骶骨部
- C. 髌骨部
- D. 股骨大粗隆
- E. 髂前上棘

(37—38 题共用题干)

男性患者,30岁,车祸外伤,来院时神志不清,烦躁不安,呼吸困难,口内有泥沙及污物,血压 120/85 mmHg,心率 110 次/分,右大腿下段肿胀明显,有瘀斑及擦伤,肢体活动良好。

37. 最先采取的抢救措施是

- A. 请神经外科会诊
- B. 请胸外科会诊
- C. 吸氧
- D. 输液扩容
- E. 清理呼吸道异物,保持呼吸道通畅

38. 暂不需要进行的检查是

- A. 脑 CT
- B. X 线胸片
- C. 化验血常规、血型
- D. 右股骨 X 线片
- E. 以上均不是

(39—40 题共用题干)

患者女,56岁,双下肢麻木、无力半年,症状自下向上发展。查体:双下肢肌力 II 级,剑突平面以下痛温觉减退。

39. 应行哪项检查明确诊断

- A. 腰椎 X 线片
- B. 颅脑 CT
- C. 腰椎 CT
- D. 胸椎 MRI
- E. 颈椎 MRI

40. 考虑病变部位在

- A. 腰髓髓内
- B. 颅脑
- C. 颈髓髓内

D. 胸髓髓外

E. 颈髓髓外

(41—43 题共用题干)

35 岁男性,车祸伤及右髋,查体:右髋部剧痛,右下肢缩短、内旋、内收位弹性固定,右足不能背伸。

41. 为明确诊断首先行哪项检查

- A. 肌电图
- B. X 线检查
- C. CT
- D. MRI
- E. B 超

42. 最可能的诊断为

- A. 髋关节后脱位
- B. 髋关节前脱位
- C. 髋关节中心脱位
- D. 股骨颈骨折
- E. 股骨转子间骨折

43. 该患者还应考虑到以下哪个并发症

- A. 股骨头坏死
- B. 下肢淋巴水肿
- C. 坐骨神经损伤
- D. 下肢深静脉血栓形成
- E. 急性骨萎缩

(44—45 题共用题干)

患者男性,56岁,近3个月出现血尿,为阵发性,无明显腹痛、尿频、尿急,无发热、盗汗、贫血,消瘦明显,体重下降约 4kg。查体:腹软,无压痛,未扪及包块。

44. 此患者可能诊断为

- A. 泌尿系感染
- B. 泌尿系结石
- C. 泌尿系肿瘤
- D. 急性肾小球肾炎
- E. 肾功能不全

45. 为明确诊断采取最简单可靠的检查项目是

- A. 血常规、血沉
- B. 尿常规
- C. 血 BUN、Cr 测定
- D. 腹部 X 线平片
- E. 腹部 B 超

(46—49 题共用题干)

男性,65岁,生气后出现剧烈头痛、呕吐,右侧肢体活动不灵,言语不清。查体:血压 180/100mmHg,

心率 110 次/分,右侧上下肢肌力Ⅲ级。

46. 采集病史时注意询问

- A. 家人有无类似发作
- B. 有无全身感染
- C. 有无高血压病史
- D. 头痛部位、程度
- E. 有无视物模糊

47. 应立即行哪项检查

- A. 颅骨 X 线片
- B. 颅脑 CT
- C. 颅脑 MRI
- D. 腰穿
- E. 脑电图

48. 该患者初步考虑

- A. 冠心病发作
- B. 脑梗死
- C. 颅内肿瘤
- D. 脑出血
- E. 脑震荡

49. 患者症状逐渐加重,颅脑 CT 示大脑半球内高密度影,约 35ml,部位浅,中线移位 1cm。应采取的治疗措施是

- A. 口服降压药
- B. 应用抗生素,防治感染
- C. 脱水降颅压
- D. 急诊手术,清除血肿
- E. 卧床休息

(50—51 题共用题干)

25 岁,男性,被摩托车撞伤右胸部,无皮肤损伤,极度呼吸困难,烦躁不安,大汗、发绀。查体:伤侧胸部饱满,肋间隙增宽,有皮下气肿,呼吸幅度减低,气管移向左侧。叩诊呈鼓音。听诊右肺呼吸音消失。

50. 该患者初步诊断为

- A. 血胸
- B. 闭合性气胸
- C. 张力性气胸
- D. 开放性气胸
- E. 气管损伤

51. 下一步采取的治疗措施为

- A. X 线片检查
- B. 胸腔闭式引流
- C. 开胸探查
- D. 立即粗针头穿刺胸膜腔减压
- E. CT 检查

(52—53 题共用题干)

患儿 3 岁,时有头痛、鼻出血。查体:颈动脉搏动明显,胸骨柄上窝可扪及搏动,胸骨左缘第 2、3 肋间和左肩胛骨旁均可听到收缩期杂音,桡动脉搏动强,足背动脉搏动弱。超声心动图诊断为主动脉缩窄。

52. 主动脉缩窄最为安全理想的检查方法是

- A. 心电图
- B. X 线检查
- C. 超声心动图
- D. 心血管造影
- E. MRI

53. 以下关于主动脉缩窄的描述错误的是

- A. 指在动脉导管或动脉韧带区域主动脉的先天性狭窄
- B. 根据缩窄与动脉导管或动脉韧带的关系分为:导管前型、近导管型、远导管型、导管后型
- C. 主动脉局限性狭窄,管腔内无隔膜样结构,在动脉韧带的对面严重扭曲,称为主动脉管性狭窄
- D. 手术是治疗主动脉缩窄的根本方法
- E. 一般认为缩窄近远两端的压力阶差 $\geq 30\text{mmHg}$,即具备手术指征

(54—55 题共用题干)

男性患儿,2 岁,查体见下颌左偏,右侧面部变小,触诊右侧胸锁乳突肌呈条索状,变短,无颈椎侧凸畸形。追问病史,患儿出生时为臀位。

54. 最可能诊断为

- A. 先天性骨性斜颈
- B. 先天性肌斜颈
- C. 颈部淋巴结炎
- D. 斜视
- E. 面神经炎

55. 最适合的治疗方法为

- A. 手法矫正
- B. 石膏固定
- C. 胸锁乳突肌锁骨头及胸骨头切断术
- D. 胸锁乳突肌切除术
- E. 药物治疗

(56—60 题共用题干)

男性,28 岁,体重 70kg,火灾烧伤,面颈(头部除外)、双上肢、双下肢(臀部除外)深度烧伤,伤后 3 小时送至医院。

56. 该患者烧伤面积为

- A. 50%