

最新修订版 **2010**

国家护士执业考试与护理专业初级(士)资格考试

模拟试卷



■ 钱晓路 姜安丽 主编

 人民卫生出版社

最新修订版 2010

国家护士执业考试与护理专业初级(士)资格考试

模 拟 试 卷

主 编 钱晓路 姜安丽

副主编 余剑珍 马秀芬 王玉升 桑未心 申翠华

秘 书 阮 卉

编 者 (以姓氏笔画为序)

马秀芬 王玉升 王君俏 申翠华 阮 卉

吴 明 余剑珍 张 清 张美芬 张 静

李芳芳 姚跃英 姜安丽 党世民 桑未心

钱晓路



卫人网
www.wjpmph.com

人民卫生出版社 旗下网站
57 年铸就权威医学资源品牌

可选购各科课程和题库

30
元

全国卫生专业技术资格考试

内科中级 外科中级 妇产科中级 儿科中级 药士 药师 主管药师 护士 护师 主管护师 检验士 检验师 主管检验师
另赠免费学习水平测试, 来看看您能拿多少分? (可查看测试成绩排名)

在线考场——模拟真实, 智能分析薄弱环节

课程超市——因材施教, 个性定制培训方案

卡号: K3JYT7A4EK

密码:

1. 登陆卫人网 www.wjpmph.com, 注册新会员;

有效期: 2010 年 1 月 1 日至当年本项考试结束

2. 进入会员中心, 用本卡为会员账户充值;

卫人网在法律允许范围内保留对本卡最终解释权

3. 充值余额可用于购买课程, 参加培训班, 进行模拟考试和练习。

人民卫生出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国家护士执业考试与护理专业初级(士)资格考试
模拟试卷/钱晓路等主编. —北京:人民卫生出版社,
2009.12

ISBN 978-7-117-12457-7

I. 国… II. 钱… III. 护理学-护士-资格考核-
习题 IV. R47-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 214578 号

门户网: www.pmph.com	出版物查询、网上书店
卫人网: www.ipmph.com	护士、医师、药师、中医 师、卫生资格考试培训

本书本印次封一贴有防伪标。请注意识别。

国家护士执业考试与护理专业初级(士)资格考试 模 拟 试 卷

主 编: 钱晓路 姜安丽

出版发行: 人民卫生出版社 (中继线 010-67616688)

地 址: 北京市丰台区方庄芳群园 3 区 3 号楼

邮 编: 100078

E - mail: pmph@pmph.com

购书热线: 010-67605754 010-65264830

印 刷: 三河市宏达印刷有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 787×1092 1/16 印张: 7.5

字 数: 176 千字

版 次: 2009 年 12 月第 1 版 2009 年 12 月第 1 版第 1 次印刷

标准书号: ISBN 978-7-117-12457-7/R·12458

定 价: 28.00 元

版权所有, 侵权必究, 打击盗版举报电话: 010-87613394

(凡属印装质量问题请与本社销售部联系退换)

出版说明

由人民卫生出版社出版的国家护士执业考试与护理专业初级(士)资格考试辅导用书在连续出版的8年里,帮助很多考生顺利地通过了护士执业资格考试。它是一套得到社会、考生、市场广泛认可,具有科学、权威、实用特点的考试辅导用书。为使辅导用书规模和结构更合理、进一步优化各品种功能,突出权威性和指导性,力求为考生提供“科学合理、针对性强、实用性强”的复习辅导用书,人民卫生出版社启动了2010年版的修订工作。

本次修订继续坚持“两按照一针对”的原则,即:严格按照新考试大纲要求的知识点编写,不漏写,不超纲;严格按照考试的命题重点编写,突出重点、淡化一般知识点;针对考生复习量大、复习时间紧的特点,突出内容结构的逻辑性,便于考生记忆或启发回忆。

本次修订的具体方法为:①辅导用书以考试大纲为依据,以卫生部规划的中职、高职高专护理学专业教材为蓝本。②辅导用书内容不拘泥于考试大纲的编排体例,根据知识的系统性和内在联系对大纲的知识点进行合理整合。③知识点的阐释和习题的解析以“能理解、好记忆、够考试”为度。

2010年版辅导用书包括三种,分别是:

1. 国家护士执业考试与护理专业初级(士)资格考试——考点精编
2. 国家护士执业考试与护理专业初级(士)资格考试——习题精选与答案解析
3. 国家护士执业考试与护理专业初级(士)资格考试——模拟试卷

与同类图书相比,本套用书具有以下鲜明特点:

1. 内容科学、权威,参考性和实用性强

为提高本套书的考试指导效能,人民卫生出版社特聘请了复旦大学护理学院、第二军医大学、上海交通大学护理学院、天津医科大学护理学院、中山大学护理学院、西安交通大学继续教育学院、福建省厦门医学高等专科学校等十余所院校熟悉国家护士执业考试与护理专业初级(士)资格考试的资深专家承担2010年版辅导用书的编写工作,深刻剖析考点,详细解析重点和难点,并精心编制了模拟试卷,从而帮助考生达到事半功倍的复习效果。

2. 辅导用书品种的不同内涵为具有不同复习习惯的考生提供了多种选择

《考点精编》整合、精解考点,使考点得到系统、精练的阐释,且对重点要点内容用黑体加粗,便于考生记忆;在每一单元前列出本单元考试大纲,便于考生对照复习;在每一个考点后根据大纲的要求,分别用“*”表示“了解”,“**”表示“熟悉”,“***”表示“掌握”,以便考生在全面复习时能抓住重中之重,合理安排复习时间。

《习题精选与答案解析》按每一单元命题,提供覆盖所有考点的习题,同时提供重点习题的答案解析,便于考生在作题时复习和巩固考点。

《模拟试卷》全真模拟考试,每套题按基础知识卷、相关专业知识卷、专业知识卷、专业实

2 出版说明

践能力卷四部分命题。模拟考试有助于提高考生的应试能力。

因此,无论考生习惯于以复习基本知识为主,或以作题为主,或边复习基本知识边作题,都可以选择到适合自己的品种。

3. 辅导用书篇幅合理,各学科比例和国家护士执业考试与护理专业初级(士)资格考试试题的比例一致

本套用书避免“内容泛滥”和“题海战术”。我们在广泛调研的基础上,确定《考点精编》90万字左右,《习题精选与答案解析》提供 2400 余道题。《模拟试卷》提供仿真试卷 3 套,每套 1200 题。该图书规模科学、合理,有利于节省考生的精力、时间和费用。

目 录

模拟试卷一.....	1
基础知识卷.....	1
相关专业知识卷.....	8
专业知识卷	16
专业实践能力卷	26
参考答案	36
模拟试卷二	38
基础知识卷	38
相关专业知识卷	45
专业知识卷	54
专业实践能力卷	63
参考答案	73
模拟试卷三	75
基础知识卷	75
相关专业知识卷	82
专业知识卷	91
专业实践能力卷.....	100
参考答案.....	110

模拟试卷一

基础知识卷

一、以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属方框涂黑。

1. 最常见的贫血类型是
 - A. 急性失血性贫血
 - B. 再生障碍性贫血
 - C. 巨幼红细胞性贫血
 - D. 缺铁性贫血
 - E. 溶血性贫血
2. 肺结核的主要传播途径是
 - A. 亲密接触
 - B. 消化道
 - C. 呼吸道
 - D. 血液
 - E. 飞沫
3. 心前区疼痛最常见的原因是
 - A. 心包炎
 - B. 胸膜炎
 - C. 心血管神经官能症
 - D. 心绞痛
 - E. 精神因素
4. 肾盂肾炎的主要感染途径是
 - A. 上行感染
 - B. 间接感染
 - C. 直接感染
 - D. 淋巴感染
 - E. 血行感染
5. 不符合特发性血小板减少性紫癜健康教育的为
 - A. 预防各种外伤
 - B. 禁用阿司匹林
 - C. 坚持用药
 - D. 卧床休息避免活动
 - E. 定期检查
6. 慢性肾衰竭出血的主要原因是
 - A. 脾功能亢进
 - B. 促红细胞生成素减少
 - C. 凝血因子减少
 - D. 毒素增多
 - E. 缺乏维生素 K
7. 与 SLE 发病有关的因素是
 - A. 气候寒冷
 - B. 饮食失调
 - C. 过度疲劳
 - D. 日光照射
 - E. 营养缺乏
8. 急性心肌梗死病人早期死亡的主要原因是
 - A. 心肌源性休克
 - B. 室性心律失常
 - C. 急性心功能衰竭
 - D. 室间隔穿孔
 - E. 心脏破裂
9. 属于中枢性呕吐的是
 - A. 幽门梗阻
 - B. 肠梗阻

- C. 颅内压增高
D. 胃黏膜受到刺激
E. 急性胰腺炎
10. 气胸时伤侧胸部叩诊为
A. 清音
B. 过清音
C. 鼓音
D. 浊音
E. 实音
11. 颅内压增高引起死亡的主要原因是
A. 呕吐
B. 意识障碍
C. 脱水
D. 感染
E. 脑疝
12. 十二指肠溃疡的主要原因是
A. 幽门螺杆菌感染
B. 胃酸的分泌过多
C. 应激和心理因素
D. 遗传
E. 吸烟
13. 诱发类风湿关节炎的因素是
A. 寒冷、潮湿
B. 精神刺激
C. 过度劳累
D. 药物
E. 细菌感染
14. 符合中度贫血诊断标准的是
A. $Hb < 110g/L$
B. $Hb < 100g/L$
C. $Hb < 90g/L$
D. $Hb < 80g/L$
E. $Hb < 60g/L$
15. 库欣综合征是由于
A. 腺垂体分泌亢进
B. 促肾上腺皮质激素分泌亢进
C. 甲状腺素分泌亢进
D. 甲状旁腺功能低下
E. 肾上腺髓质功能亢进
16. 肾脏疾病最常见的表现是
A. 水肿
B. 高血压
C. 血尿
D. 蛋白尿
E. 管型尿
17. I型糖尿病发病的原因是
A. 过度肥胖导致胰岛素受体减少
B. 长期应用糖皮质激素
C. 遗传因素
D. 糖摄入过多
E. 胰岛素绝对分泌不足
18. 病人咳嗽带金属音提示
A. 喉炎
B. 肺癌
C. 肺脓肿
D. 肺结核
E. 肺炎
19. 急性白血病出血的原因是
A. 血小板减少
B. 凝血因子合成减少
C. 播散性血管内凝血
D. 白血病细胞浸润
E. 脾功能亢进
20. 正常女性血红蛋白的正常值是
A. $120 \sim 160g/L$
B. $90 \sim 100g/L$
C. $110 \sim 150g/L$
D. $80 \sim 160g/L$
E. $100 \sim 170g/L$
21. 第一心音减弱见于
A. 二尖瓣狭窄
B. 高热
C. 心室肥大
D. 甲亢
E. 二尖瓣关闭不全
22. 血管紧张素Ⅱ增高血压的机制是

- A. 直接收缩小动脉
B. 间接收缩小动脉
C. 醛固酮分泌减少
D. 交感、迷走性增高
E. 交感神经兴奋性降低
23. 急性胰腺炎最常见的病因是
A. 酒精中毒
B. 暴饮暴食
C. 胆道梗阻
D. 高脂血症
E. 高钙血症
24. 脑出血最常见于
A. 蛛网膜下腔
B. 内囊
C. 脑桥
D. 小脑
E. 椎-基底动脉
25. 与肝性脑病发病有关的假性神经递质是
A. 苯乙醇胺
B. 苯丙氨酸
C. 间羟胺
D. 谷氨酰胺
E. 酪氨酸
26. 慢性肾小球肾炎直接病因是
A. 病毒感染
B. 链球菌感染
C. 代谢紊乱所致
D. 高蛋白, 高血压所致
E. 免疫介导炎症所致
27. 病人李某, 男性, 53岁, 近日体力活动后出现呼吸困难, 休息后可缓解, 此症状为
A. 劳力性呼吸困难
B. 支气管扩张
C. 慢性右心衰竭
D. 阵发性呼吸困难
E. 端坐呼吸
28. 病人王某, 女性, 25岁, 晨起脉率 98 次/分, 血压 120/72mmHg, BMR 为
A. 22%
B. 26%
C. 31%
D. 35%
E. 48%
29. 高渗性脱水的原因不包括
A. 高热
B. 长期禁食
C. 呼吸增快
D. 大量输注葡萄糖
E. 长期昏迷而未补液
30. 血钾增高可以见于下列疾病, 但除外
A. 胃肠减压
B. 肾衰竭
C. 补钾过多
D. 休克性尿少
E. 肾上腺皮质功能减退
31. 临床休克代偿期相当于休克病理生理分期的
A. 微循环收缩期
B. 微循环扩张期
C. 微循环衰竭期
D. 正常微循环
E. 微循环代偿期
32. 下列不是引起心跳呼吸骤停原因的是
A. 大失血
B. 缺氧, CO₂ 蓄积
C. 惊吓
D. 麻醉意外
E. 手术过度牵拉内脏
33. 以下说法不正确的是
A. 金黄色葡萄球菌感染容易局限
B. 溶血性链球菌感染容易扩散
C. 铜绿假单胞菌对大多数抗生素不敏感
D. 大肠埃希菌感染脓液臭味
E. 脆弱拟杆菌感染脓液恶臭
34. 属于闭合性损伤的是
A. 裂伤

- B. 爆震伤
 - C. 火器伤
 - D. 剥脱伤
 - E. 擦伤
35. 急性乳腺炎多见于
- A. 产后未哺乳者
 - B. 产后 1~2 周初产妇
 - C. 产后 3~4 周初产妇
 - D. 产后 5~6 周初产妇
 - E. 产后 1~2 周经产妇
36. 绞窄性疝的主要病变是
- A. 疝内容物与疝囊壁发生粘连
 - B. 疝块不能完全回纳腹腔
 - C. 疝内容物并发感染
 - D. 疝内容物的静脉回流受阻
 - E. 疝内容物血供障碍
37. 原发性腹膜炎与继发性腹膜炎的主要区别是
- A. 腹内有无原发病灶
 - B. 病原菌的种类
 - C. 疾病的严重程度
 - D. 腹痛性质的不同
 - E. 有无腹内脏器受损
38. 胃癌最多发生于
- A. 胃窦部
 - B. 贲门部
 - C. 胃后壁
 - D. 胃大弯
 - E. 胃小弯
39. 胃癌血行转移的最常见部位是
- A. 肝
 - B. 肺
 - C. 肾
 - D. 脑
 - E. 脾
40. 急性阑尾炎的主要病因是
- A. 细菌侵入
 - B. 急性肠炎
 - C. 肠道蛔虫
 - D. 急性腹膜炎
 - E. 阑尾管腔梗阻
41. 单纯性机械性肠梗阻的病理生理特点, 下列错误的是
- A. 肠腔积液、积气
 - B. 肠蠕动减慢
 - C. 肠管壁静脉回流受阻
 - D. 电解质紊乱、代谢性酸中毒
 - E. 腹膜炎和感染性休克
42. 大肠癌的病因, 下列无关的是
- A. 高脂肪、高蛋白、低纤维饮食
 - B. 长期便秘
 - C. 溃疡性结肠炎
 - D. 家族性结肠息肉病
 - E. 结肠腺瘤
43. 直肠癌最常见的转移方式是
- A. 直接蔓延
 - B. 腹腔内种植转移
 - C. 腹腔内播散
 - D. 淋巴转移
 - E. 血行转移
44. 直肠肛周脓肿的主要病因是
- A. 习惯性便秘
 - B. 肛管、直肠损伤
 - C. 肛腺感染
 - D. 肛周皮肤感染
 - E. 营养不良
45. 肛瘘常继发于
- A. 肛裂
 - B. 内痔
 - C. 直肠脱垂
 - D. 血栓性外痔
 - E. 直肠肛管周围脓肿
46. 门-腔静脉交通支中, 最重要的是
- A. 胃底、食管下端交通支
 - B. 直肠下端交通支
 - C. 腹壁交通支
 - D. 腹膜后交通支

- E. 肠系膜血管交通支
47. 肝内型肝硬化门脉高压症的常见病因为
- 转移癌
 - 肝炎后
 - 饮酒过度
 - 营养不良
 - 脂肪肝
48. 下列胆色素结石形成的原因中,应除外
- 大肠杆菌产生 β -葡萄糖醛酸酶增多
 - 结合胆红素被水解
 - 结合胆红素与钙离子结合
 - 胆红素钙是胆色素结石的重要基础
 - 胆道蛔虫引起
49. 血栓闭塞性脉管炎的病因,下列无关的是
- 长期吸烟
 - 气候寒冷潮湿
 - 神经内分泌紊乱
 - 下肢活动较少
 - 免疫功能异常
50. 下列不属食管癌病因的是
- 长期饮烈性酒
 - 饮食中含碘高
 - 亚硝酸胺
 - 真菌
 - 遗传因素
51. 良性前列腺增生主要的相关因素是
- 饮水少
 - 习惯性便秘
 - 泌尿系感染
 - 泌尿系结石
 - 男性激素代谢异常
52. 后尿道损伤时,尿外渗的范围是
- 下腹壁
 - 阴茎部
 - 会阴、阴囊
 - 腹腔内
 - 膀胱周围
53. 泌尿系统结石形成无关的因素是
- 尿路感染
 - 尿路异物
 - 饮水不足
 - 尿 pH 改变
 - 激素代谢紊乱
54. 不属于骨折病因分类的叙述是
- 创伤性骨折
 - 压缩性骨折
 - 疲劳性骨折
 - 撕脱性骨折
 - 病理性骨折
55. 关于急性血源性骨髓炎发病原因,无重要意义的是
- 发病近期有化脓性感染病史
 - 发病近期有局部损伤史
 - 发病近期有感冒病史
 - 营养状况不良
 - 从事体力劳动
56. 肘关节脱位常见类型是
- 前脱位
 - 后脱位
 - 外侧方脱位
 - 内侧方脱位
 - 半脱位
57. 与女性内生殖器邻近的器官是
- 肛门
 - 肾脏
 - 膀胱
 - 大肠
 - 阴蒂
58. 有关“子宫下段”的陈述,正确的是
- 位于子宫底部部长约 3cm 的软组织
 - 青春期后子宫下段逐渐发育成熟
 - 妊娠中期子宫下段才与子宫腔融合
 - 临产后子宫下段上升最高达到宫底
 - 孕末期拉长的子宫峡部称子宫下段
59. 胎盘早期剥离的病理变化,正确的是
- 羊膜早破出血

- B. 包蜕膜出血
C. 底蜕膜出血
D. 胎盘血窦破裂
E. 巨大宫颈血肿
60. 妊娠合并贫血可能对母儿的影响是
A. 胎儿严重缺铁性贫血, 母亲肾病
B. 孕妇肝功能受损, 胎儿生长受限
C. 产妇呼吸困难, 胎儿发育不良
D. 母亲产褥感染, 胎儿宫内窘迫
E. 新生儿死亡率高产妇乳汁极少
61. 子宫收缩过强的病因, 无关的是
A. 过度疲劳精神紧张
B. 体格强壮的运动员
C. 缩宫素使用不当
D. 失当的阴道内操作
E. 重型的胎盘早剥
62. 病人刘某, 女性, 42 岁, 被诊断为尖锐湿疣, 其病原体是
A. 阴道毛滴虫
B. 链球菌
C. 金黄色葡萄球菌
D. 人乳头瘤病毒
E. 假丝酵母菌
63. 与功能失调性子宫出血 无关的因素是
A. 营养不良
B. 代谢紊乱
C. 气候骤变
D. 卵巢功能失调
E. 子宫发育不良
64. 病人李某, 女性, 32 岁, 子宫增大且表面高低不平, 诊断为子宫肌瘤, 其最可能的类型是
A. 瘤样病变
B. 囊腺肌瘤
C. 浆膜下肌瘤
D. 黏膜下肌瘤
E. 内膜样肌瘤
65. 病人邢某, 女性, 26 岁, 要求放置宫内节育器。了解其月经史, 13 岁初潮, 月经周期 18~20 天, 经期 8~10 天, 量多。判断其 不宜放置宫内节育器, 原因是
A. 急性生殖道炎症
B. 宫颈口过松
C. 子宫畸形
D. 子宫脱垂
E. 月经过多过频
66. 原发性不孕症是指夫妇同居、性生活正常
A. 未避孕, 1 年未孕者
B. 未避孕, 2 年未孕者
C. 曾生育过, 现未避孕, 1 年未孕
D. 曾生育过, 此后未避孕, 2 年未孕
E. 1 年未孕, 一方生殖道缺陷者
67. 我国政府为保护劳动妇女的生殖健康, 规定月经期妇女 不得从事的工作岗位是
A. 电脑操作
B. 野外作业
C. 新闻采访
D. 课堂授课
E. 商场销售
68. 婴儿期是指
A. 产后脐带结扎至满 28 天
B. 脐带结扎至生后满 1 个月
C. 生后 28 天至满 1 周岁
D. 生后 1 个月至满 1 周岁
E. 出生至满 1 周岁
69. 影响小儿生长发育的因素最重要的是
A. 性别
B. 营养
C. 环境卫生
D. 母亲情绪
E. 出生季节
70. 衡量小儿营养状况最常用的指标是
A. 体重
B. 身长
C. 头围
D. 胸围

E. 腹围

71. 小儿乳牙出齐的时间是

- A. 1~1 岁半
- B. 1 岁半~2 岁
- C. 2~2 岁半
- D. 2 岁半~3 岁
- E. 3 岁~3 岁半

72. 正常 3 个月小儿动作发育可达到

- A. 能抬头
- B. 能握持玩具
- C. 会爬
- D. 能独坐
- E. 扶腋下能站直

73. 正常 1 岁内婴儿, 每日每公斤体重约需要热量

- A. 377kJ(90kcal)
- B. 460kJ(110kcal)
- C. 418kJ(100kcal)
- D. 502kJ(120kcal)
- E. 544kJ(120kcal)

74. 按儿科病房管理特点, 适宜的病房温度、湿度为

- | 温度 | 湿度 |
|-----------|---------|
| A. 16~18℃ | 40%~50% |
| B. 18~20℃ | 50%~60% |
| C. 20~22℃ | 50%~60% |
| D. 22~24℃ | 50%~60% |

E. 24~26℃ 60%~70%

75. 下列不是引起新生儿生理性黄疸主要原因是

- A. 胆红素生成较多
- B. 联结运送胆红素能力弱
- C. 胆汁黏稠、胆道狭窄
- D. 肝脏酶系统功能不完善
- E. 胆红素的肠-肝循环增加

76. 婴幼儿上呼吸道感染易并发中耳炎的主要原因为

- A. 耳咽管较窄、长呈斜位
- B. 耳咽管较宽、短呈水平位
- C. 耳咽管易充血水肿
- D. 耳咽管周围血管丰富
- E. 耳咽管弹力纤维发育差

77. 水痘的传播途径是

- A. 虫媒传播
- B. 消化道传播
- C. 血液传播
- D. 空气飞沫传播
- E. 体液传播

78. 猩红热的主要传播途径是

- A. 经日用品、书籍等接触传播
- B. 呼吸道传播
- C. 消化道传播
- D. 皮肤伤口或产道等侵入
- E. 血液传播

二、以下提供若干组考题, 每组考题共同使用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与问题密切相关的答案, 并在答题卡上将相应的字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次, 多次或不被选择。

(79~80 题共用备选答案)

- A. 脑出血
- B. 脑血栓形成
- C. 高血压脑病
- D. 脑血管畸形
- E. 脑动脉瘤

79. 属于出血性脑血管病的是

80. 属于缺血性脑血管病的是

(81~82 题共用备选答案)

- A. 1 型糖尿病
- B. 2 型糖尿病
- C. 妊娠糖尿病
- D. 类固醇性糖尿病
- E. 免疫介导性糖尿病

81. 胰岛损伤胰岛素分泌绝对不足的是

82. 胰岛素抵抗的是

(83~84 题共用备选答案)

- A. 骨髓损伤
- B. 维生素 B₁₂ 缺乏
- C. 营养不良
- D. 免疫反应
- E. 铁缺乏

83. 再生障碍性贫血的病因是

84. 特发性血小板减少性紫癜的病因是

(85~87 题共用备选答案)

- A. 低渗性脱水
- B. 等渗性脱水
- C. 高渗性脱水
- D. 低钾血症
- E. 高钾血症

85. 长期禁食病人易发生

86. 大量出汗易发生

87. 输入大量久存的库血易发生

(88~91 题共用备选答案)

- A. 易复性疝
- B. 难复性疝
- C. 滑动性疝
- D. 嵌顿性疝
- E. 绞窄性疝

88. 凡疝内容物很容易回纳腹腔者,属

89. 凡疝内容物不能完全回纳腹腔者,属

90. 疝内容物被疝环卡住而不能完全回纳腹

腔、肠系膜动脉供血尚存在者,属

91. 疝内容物被嵌顿,伴肠管动脉供血障碍者,属

(92~93 题共用备选答案)

- A. 淋菌性阴道炎
- B. 老年性阴道炎
- C. 慢性子宫颈炎
- D. 外阴阴道假丝酵母菌病
- E. 子宫内膜异位症

92. 属于性传播疾病的是

93. 属于内源性传染为主的是

(94~96 题共用备选答案)

- A. 2~3 周
- B. 6 周
- C. 4 周
- D. 72 小时
- E. 1~2 天

94. 产后子宫内膜完全修复需

95. 产后血容量恢复未孕状态需

96. 自然分娩后宫颈完全恢复需

(97~100 题共用备选答案)

- A. 单纯疱疹病毒
- B. 白色念珠菌
- C. 大肠埃希菌
- D. 腺病毒
- E. 金黄色葡萄球菌

97. 鹅口疮的病原体

98. 疱疹性口腔炎的病原体

99. 溃疡性口腔炎的病原体

100. 婴儿腹泻最常见的病原体

相关专业知识卷

一、以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属方框涂黑。

1. 急性白血病最主要诊断方法是

- A. 心电图
- B. 骨髓象

C. 贫血程度

- D. 出血症状
- E. 胸骨疼痛

2. 上消化道出血病人的粪便呈
 - A. 白陶土样
 - B. 果酱样
 - C. 鲜红血样
 - D. 柏油样
 - E. 洗肉水样
3. 诊断胃癌最主要的检查方法是
 - A. B超
 - B. 纤维胃镜
 - C. 直肠指检
 - D. 大便隐血检查
 - E. X线钡餐造影
4. 有关降压药用药护理正确的是
 - A. 可以自行增减药物
 - B. 出现头晕,眼花属正常反应
 - C. 效果差可自行撤换药物
 - D. 降压越快效果越好
 - E. 改变体位动作要慢
5. 提示洋地黄中毒的是
 - A. 心率 90 次/分
 - B. 呼吸 16 次/分
 - C. 尿量 1500ml/d
 - D. 一个月体重由 65kg 降至 60kg
 - E. 心律由规则变不规则
6. 癫痫强直阵挛发作时勿用力按压抽搐肢体以防发生
 - A. 坠床
 - B. 骨折
 - C. 持续抽搐
 - D. 心脏骤停
 - E. 休克
7. 糖尿病病人胰岛素治疗最常见的副作用是
 - A. 低血糖反应
 - B. 肝功能损害
 - C. 腹胀,腹痛
 - D. 局部红肿,皮疹
 - E. 血管神经性水肿
8. 心血管系统疾病护理体检应把重点放在
 - A. 视诊
 - B. 触诊
 - C. 叩诊
 - D. 听诊
 - E. 嗅诊
9. 肾性水肿首先出现于
 - A. 眼睑,颜面
 - B. 胸腔,腹腔
 - C. 胫前,足踝
 - D. 背部,骶部
 - E. 阴囊,会阴
10. 肝癌高危人群的普查方法是
 - A. 甲胎蛋白检测和 B 超
 - B. 放射形核素肝扫描
 - C. 肝穿刺针吸细胞学检测
 - D. 选择性肝功能动脉造影
 - E. CT 检查
11. 成年男性血红蛋白正常值为
 - A. 60~80g/L
 - B. 80~120g/L
 - C. 110~150g/L
 - D. 120~160g/L
 - E. 130~180g/L
12. 肾衰竭少尿期最严重的电解质紊乱是
 - A. 低钠血症
 - B. 高磷血症
 - C. 低钙血症
 - D. 高氯血症
 - E. 高钾血症
13. 糖尿病最基本的治疗措施是
 - A. 口服降糖药
 - B. 注射胰岛素
 - C. 控制饮食
 - D. 加强运动
 - E. 补充水分
14. 服用硫酸亚铁几乎都会出现
 - A. 黑便

- B. 便秘
C. 腹痛
D. 恶心
E. 腹泻
15. 诊断急性脑血管病首选
A. CT
B. 脑脊液检查
C. MRI
D. 血小板计数
E. 电生理检查
16. 尿液显微镜检查不包括
A. 红细胞
B. 上皮细胞
C. 尿糖
D. 脓细胞
E. 管型
17. 风湿性心瓣膜病的根治方法是
A. 控制心力衰竭
B. 控制心律失常
C. 控制感染
D. 预防栓塞
E. 手术治疗
18. 肝硬化腹水病人每日液体摄入量限制在
A. 1000ml 左右
B. 1500ml 左右
C. 2000ml 左右
D. 2500ml 左右
E. 3000ml 左右
19. 尿路感染有确诊意义的辅助检查是
A. 尿常规检查
B. 尿涂片找细菌
C. 尿培养和菌落计数
D. 肾盂造影
E. B 超
20. 大咯血窒息抢救措施不妥的是
A. 立即置病人于头低足高位
B. 立即清除口腔内血块
C. 立即应用镇静、镇咳剂
D. 必要时人工呼吸
E. 呼吸道通畅后加压吸氧
21. 系统性红斑狼疮病人最常损害的脏器是
A. 心脏
B. 血管
C. 肾
D. 胃
E. 肺
22. 诊断早期原发性支气管肺癌简单有效的方法是
A. 肺部 X 线检查
B. 支气管镜检查
C. 痰脱落细胞学检查
D. 淋巴结活组织检查
E. 放射性核素检查
23. 支气管扩张病人提示有混合性厌氧菌感染的是
A. 痰有恶臭
B. 痰液放置可分三层
C. 背部有持久存在的湿性啰音
D. 大量脓痰伴有不等量的咯血
E. 慢性咳嗽、大量脓痰伴高热
24. II 型呼吸衰竭的血气分析结果应是
A. $\text{PaO}_2 \leq 50\text{mmHg}$, PaCO_2 正常
B. PaO_2 正常, $\text{PaCO}_2 \geq 50\text{mmHg}$
C. $\text{PaO}_2 \leq 50\text{mmHg}$, $\text{PaCO}_2 \geq 50\text{mmHg}$
D. $\text{PaO}_2 \geq 50\text{mmHg}$, $\text{PaCO}_2 \leq 50\text{mmHg}$
E. $\text{PaO}_2 \geq 50\text{mmHg}$, $\text{PaCO}_2 \geq 50\text{mmHg}$
25. 治疗轻度哮喘首选的支气管解痉剂为
A. 青霉素
B. 氨茶碱
C. 沙丁胺醇
D. 异丙基阿托品
E. 色甘酸钠
26. 心电图心房活动呈规律的锯齿状波动, 心房率 250~350 次/分, 考虑为
A. 室性期前收缩
B. 心房扑动

- C. 室性心动过速
D. 心室扑动
E. 心房纤颤
27. 急性脑疝的首要处理措施为
A. 紧急手术
B. 静脉滴注脱水剂
C. 低温冬眠
D. 应用抗生素
E. 高压大量灌肠
28. 病人陈某,女性,18岁。PPD试验后48小时局部硬性的直径为15mm,结果判定为
A. 阴性
B. 弱阳性
C. 阳性
D. 强阳性
E. 无法判定
29. 慢性肺源性心脏病病人,喘憋明显,烦躁。治疗应慎用镇静剂是为了避免
A. 洋地黄中毒
B. 双重感染
C. 低血钾
D. 诱发肺性脑病
E. 加重心力衰竭
30. 治疗重度低渗性脱水病人,首先应输入的液体是
A. 5%葡萄糖溶液
B. 5%葡萄糖盐水
C. 平衡盐溶液
D. 3%氯化钠溶液
E. 复方氯化钠溶液
31. ARF少尿期病人高钾血症的紧急处理方法不包括
A. 静脉滴注10%葡萄糖酸钙
B. 血液透析
C. 静脉注射5%碳酸氢钠
D. 使用抗生素
E. 静脉注射葡萄糖胰岛素溶液
32. 心跳呼吸骤停二期复苏方法不包括
A. 复苏药物
B. 降温
C. 除颤
D. 输血输液
E. 机械人工呼吸
33. 抗菌药物的选择可根据
A. 临床表现特点
B. 细菌培养及药敏试验
C. 脓汁性状
D. 药物的抗菌谱
E. 病人年龄及性别
34. 下列不属丹毒治疗方法的是
A. 隔离病人
B. 抬高患肢
C. 局部涂碘酊
D. 切开防止坏死
E. 应用甲硝唑
35. 具备可切开引流的条件是
A. 体温超过40℃
B. 感染性休克
C. 穿刺抽出脓液
D. 血培养阳性
E. 局部肿胀加重
36. 损伤的处理不正确的有
A. 火器伤应尽早施行清创术,争取一期缝合
B. 刺伤易并发厌氧菌感染,宜用3%过氧化氢换药
C. 爆震伤可造成病人内脏损伤,应做多面检查
D. 扭伤病人早期不可按摩伤处
E. 挤压伤的病人需观察其尿量
37. 对损伤病人的急救不包括
A. 心肺复苏
B. 窒息病人吸氧
C. 固定骨折
D. 休克病人速送医院进行处理