

豫

章

焚

書

第七册

殘

年

裝

書

卷之四

太陽經中篇

凡寒傷營之證列於此篇
法五十八條

西昌喻昌嘉言甫著

按上篇風傷衛之證用桂枝湯解肌者乃是不欲發汗以擾動其營也不擾其營但治其衛常有不
及之弊不及則邪不盡去勢必傳入於裏故篇中
兩解表裏之法居多此篇寒傷營之證用麻黃湯
發汗者乃亟驅其邪盡從表出不使停留之法常
有太過之弊太過則未免因邪傷正而虛候易生
設有餘邪不盡者多未敢再汗但可和其營衛或
俟其津回自然得汗故兩解表裏之法差少其誤

下之證亦不比上篇之陽邪多變但發汗之後其
人津液已虛更加誤下則津液重虛所以或邪少
虛多而傷其陽或邪盛熱熾而傷其陰源同流異
各造其偏以故治法亦錯出不一必先會大意然
後一展卷而了然於心目也

辨寒傷營有定脉定證總稱傷寒一法

●太陽病或已發熱或未發熱必惡寒體重嘔逆脉
陰陽俱緊者名曰傷寒

原文

發熱惡寒體重嘔逆脉陰陽俱緊凡是傷寒病必
具此五者故以爲總稱或未發熱者寒邪初入尙

未鬱而爲熱頃之卽熱矣多有服表藥後反增發熱者病必易解蓋熱鬱未久藥卽領邪外出無裏證故也仲景恐見惡寒體重嘔逆又未發熱認爲直中陰經之證操刃殺人蚤於辨證之先揭此一語慮何周耶

、辨傷寒證用麻黃湯大綱一法

① 太陽病頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛惡風無汗而喘者麻黃湯主之

原文

上條已言傷寒之脉證矣此復以頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛惡風無汗而喘互發其義蓋惡寒

未有不惡風者頭身腰節疼痛卽體重之應無汗而喘亦卽嘔逆脉陰陽俱緊之應也汗乃血之液血爲營營強則腠理閉密雖熱汗不出也麻黃發汗散邪其力最猛故以桂枝監之甘草和之而用杏仁潤下以止喘逆然亦但取微似汗不須歆熱希粥正如馭六馬執轡惟謹恒虞其泛軼耳

辨傷寒傳經不傳經一法

傷寒一日太陽受之脉若靜者爲不傳頗欲吐若燥煩脉數急者爲傳也傷寒二三日陽明少陽證不見者爲不傳也

原文

脉靜者邪在本經且不能遍故不傳經頗欲吐外邪內搏身煩脉數寒邪變熱必傳經也二三日陽明少陽證不見卽誤治亦止留連於太陽耳

、辨傷寒欲傳不傳心悸而煩宜用建中一法

④傷寒二三日心中悸而煩者小建中湯主之嘔家不可用建中湯以甜故也 原文

欲傳未傳之證其人內實差可無慮若陽氣內虛而心悸陰氣內虛而心煩將來邪與虛搏必至危困建立其中氣則邪不易入卽入亦足以禦之也、辨寒傷營之證當汗不汗反行鍼灸致變二法

五 太陽傷寒者加溫鍼必驚也 原文

溫鍼欲以攻寒孰知鍼用火溫營血得之反增其熱營氣通於心引熱邪以內逼神明必致驚惶而神亂也

六 脈浮宜以汗解用火灸之邪無從出因火而盛病從腰以下必重而痺名火逆也 原文

外邪挾火勢上炎必不下通陰分故重而痺也

、辨脈浮及浮數宜用麻黃湯發汗一法

七 脈浮者病在表可發汗宜麻黃湯脈浮而數者可

發汗宜麻黃湯 原文

傷寒之脉陰陽俱緊其脉但浮及浮數而不兼緊似可不用麻黃湯然寒既入營舍麻黃湯定法別非他藥可代故重申其意見脉緊固當用麻黃湯而脉浮不緊者乘其邪方在表當用麻黃湯托出其邪不使得入卽脉浮數而不緊者乘其勢正欲傳當用麻黃湯擊其半渡而驅之使出參看中風證脉浮宜用桂枝湯可見天然一定之法不因邪勢之淺深輒可變易也

服麻黃湯得汗後察脉辨證有次第不同三法
一法汗解後復感復煩脉浮數者宜更藥解散

一法脉浮數而煩加渴者宜兩解表裏

一法具兩解證不渴者用藥宜裏少表多

八傷寒發汗解半日許復煩脉浮數者可更發汗宜

桂枝湯

原文

發汗後病解半日許復煩脉復浮數明係汗後表
疎邪風襲入所致卽不可再用麻黃湯宜更變發
汗之法改用桂枝可耳用桂枝者一以邪重犯衛
一以營虛不能復任麻黃也

九發汗已脉浮數煩渴者五苓散主之

原文

脉浮數而煩與上同也加之以渴則津液爲熱所

耗而內燥裏證具矣津液內耗卽非細故宜用四
苓以滋其內而加桂以解其外比上更用桂枝之
法又大不同者以無復感故也然旣云兩解表裏
之邪熱則五苓散中尤用蒼桂用枝從可推矣
按五苓兩解表裏之法風傷衛寒傷營俱用之

⑩傷寒汗出而渴者五苓散主之不渴者茯苓甘草

湯主之 原文

傷寒以無汗故煩汗出則不煩可知矣但汗出而
渴則上條五苓兩解表裏之法在所必用若汗出
而并不渴則裏證本輕故用桂枝湯中之三五苓

湯中之一少示三表一裏之意名曰茯苓甘草湯以消息病情而分解微邪如璋判圭合允爲寶符、辨脉浮緊浮數尺脉反遲反微不可發汗二法

一法脉浮緊身疼痛宜以汗解但尺遲則不可汗

一法脉浮數卽誤下仍當發汗但尺微則不可汗

⑤脉浮緊者法當身疼痛宜以汗解之假令尺中遲者不可發汗何以知之然以榮氣不足血少故也原文

脉浮而緊偏身疼痛廼傷寒正病亟當發汗以驅逐外邪者也設其人元氣素薄尺中脉遲則城郭不完兵甲不堅米粟不多根本先欲動搖尙可背

城借一乎此所以必先建中而後發汗也

②脉浮數者法當汗出而愈若下之身重心悸者不可發汗當自汗出乃解所以然者尺中脉微此裏虛須表裏實津液自和便自汗出愈

原文

脉浮數者法當從乎汗解故有更藥發汗及兩解表裏之法設經誤下而身重心悸縱脉仍浮數亦不可復發其汗但宜靜調俟其汗自出乃解耳所以然者以尺脉微裏陰素虛故也必須津液自和卽爲表裏俱實便自汗出而愈此亦先建中而後發汗之變法要知仲景云尺脉微者不可發汗又

云尺微者不可下無非相人津液之奧旨所以誤下之脉雖浮數不改亟宜發汗者亦必審諦其尺脉不當率意徑情有如此矣

凡用發汗藥宜審病人有無宿疾不可徑汗六法

三 咽喉乾燥者不可發汗

原文

咽中乾燥其人平日津液素虧可知故不可發汗以重奪其津液也叔和重集不可發汗篇有咽中閉塞不可發汗發汗則吐血氣欲絕手足厥冷欲得蹶卧不能自溫一條與此似同而實大異此戒發汗以奪陽明之津液彼戒發汗以奪少陰之血

也又咽中閉塞不可下一條亦指少陰立說成註
俱以咽門爲胃之系混釋則謬矣

④淋家不可發汗發汗則便血

原文

小便淋者膀胱爲熱所閉氣化不行也更發其汗
則膀胱愈擾而血從小便出矣

⑤瘡家雖身疼痛不可發汗汗出則瘡

原文

身疼痛爲寒傷營之證本當發汗然瘡瘍之人肌
表素虛營血暗耗更發其汗則外風襲虛內血不
榮必至頸項強身手張而成瘧瘡亦膀胱之病也
⑥衄家不可發汗汗出必額上陷脈緊急目直視不

能胸不得眠

原文

目得血而能視汗爲血液衄血之人清陽之氣素傷更發其汗則額上必陷乃上焦枯竭之應也諸脈者皆屬於目筋脈緊急則目上瞪而不能合目不合則不得眠也傷寒發煩目瞑者必衄宜用麻黃湯發汗此言素慣衄血之人戒發汗以虛其虛宜兩諦之也

亡

血家不可發汗則寒慄而振

原文

亡血卽亡陰也亡陰發汗本當生熱乃反寒慄而振者何耶蓋陰亡則陽氣孤而無偶纔一發汗其

陽必從汗盡越所以寒慄有加陰陽兩竭也

⑥汗家重發汗必恍惚心亂小便已陰疼與禹餘糧

丸闕 原文

心主血汗者心之液平素多汗更發其汗則心臟
之血傷而心神恍惚小腸之腑血亦傷而便已陰
疼禹餘糧丸原方闕然生心血通水道可意會也
服麻黃湯汗後病不解有惡寒惡熱不同治一法
⑦發汗病不解反惡寒者虛故也芍藥甘草附子湯
主之發汗後惡寒者虛故也不惡寒但惡熱者實也
當和胃氣與調胃承氣湯 原文