

庆人大社50年华诞
迎考研书20载辉煌

2006^年 考研

数学新编考试参考书

主编 李恒沛



—— 2006 年考研数学新编考试参考书



主 编 李恒沛
编著者 (以姓氏笔画为序)
李忠范 李恒沛
杨 荣 高文森
晓 卉

正版查询及服务程序

- 刮 开 涂 层
- 获取 16 位数字编码
- 以编码作短信查真伪
- 上 www.1kao.net 注册
- 登录增值服务进免费课堂

中国人民大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

2006 年考研数学新编考试参考书/李恒沛主编. 2 版

北京: 中国人民大学出版社, 2005

ISBN 7-300-04657-6

I. 2...

II. 李...

III. 高等数学-研究生-入学考试-自学参考资料

IV. 013

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 022014 号


2006 年考研数学新编考试参考书

主编 李恒沛

出版发行	中国人民大学出版社		
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码	100080
电 话	010-62511242 (总编室)		010-62511239 (出版部)
	010-82501766 (邮购部)		010-62514148 (门市部)
	010-62515195 (发行公司)		010-62515275 (盗版举报)
网 址	http://www.crup.com.cn		
	http://www.lkao.net (中国 1 考网)		
经 销	新华书店		
印 刷	中煤涿州制图印刷厂		
开 本	787×1092 毫米 1/16	版 次	2004 年 4 月第 1 版 2005 年 4 月第 2 版
印 张	39.25	印 次	2005 年 4 月第 1 次印刷
字 数	901 000	定 价	45.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换



前言

本书是为报考硕士研究生参加全国数学统考的考生而编写的,也可作为大学生的补充读物及教师的教学参考书。

遵循考试大纲规定的内容,全书分高等数学(第1~8章)、线性代数(第9章)、概率论与数理统计(第10章)三部分共十章。每章下面分节,每节又分“内容摘要与考查重点”和“例题分析”两部分。第一部分简明扼要地把本节考查内容介绍出来,并指出考查重点;第二部分列举典型例子分析解题思路,并示明考试题型。这些例子侧重于概念的理解、理论的掌握、方法的运用,可以使考生触类旁通、举一反三。书末有三个附录,附录1为差分方程简介(仅供报考“数学三”的考生备用),附录2、附录3分别为2004年和2005年研究生入学考试数学试题及参考解答,便于广大考生复习使用。本书也可供在读本科生加深学习内容、复习备考以及教师教学参考之用。

从历年研究生入学考试数学试题来看,试题有如下特点:(1)概念性强。着重考查考生对基本概念的掌握,会运用基本定理完成对一些命题的证明,从不同角度、不同提法(即所谓变形、变式)来考查考生对其掌握的熟练程度。(2)综合性强。一道试题着重考查一部分内容,而这部分内容又有很多知识点,不可能面面俱到,只能综合几个知识点来考查。这类题几乎年年试卷都有,旨在考查考生的能力与数学素质。(3)运算性强。正确地运算基于正确的概念和方法,数学试题虽有一定的计算量,但只要考生基本概念清楚,基本理论融会贯通,基本方法运用自如,运算起来就能快捷正确。试题具有一定的灵活性,从不同侧面(或不同角度或相关的几个知识点)考查考生的能力,注意一题多解,好让考生临场发挥,运作自如。此外,试题还注意到论证性和应用性,考查考生逻辑推理的能力和综合应用的能力,这是必不可少的能力,不论是对工学、经济学,还是管理学各专业的考生来说,都是这样,概莫能外。本书就是针对上述特点来精选例题和编写习题的。

本书内容紧扣大纲,全面而不烦琐,条理清晰,重点突出;再现考题,例题选择多样化,典型性强,解析透彻;时时小结,前后照应,便于掌握;每章之后附有习题,便于考生自我测试。本书中例题和习题互相补充,起到深化内容的作用,要求考生不仅要看懂例题,还要演练习题,两者都是重要的。

本书由李恒沛、高文森等编写,全书由李恒沛统稿。编著者都长期在重点大学从事数学教学和科研工作,有的参加过多年全国统考数学试题的命制,有的参加过多年



考研辅导，并都参与过历年考研数学试卷的评阅和分析，积累了丰富的教学经验，对考研命题有深刻的研究，考研辅导效果显著。编著者愿此书的出版会对考研学子有所裨益。

本书在编写过程中，主要参考书有：

教育部：《2005年全国硕士研究生入学统一考试数学考试大纲》，高等教育出版社，2004。


全国高校工科数学课程教学指导委员会《工科数学》编委会：《工科数学·二〇〇一年考研专辑》，2001。

蔡燧林、张继昌：《研究生数学入学考试精编》（第二版），浙江大学出版社，2000。

李恒沛、王日爽、萧亮壮：《全国研究生入学数学统考应试指导》，广西科学技术出版社，1988。

编著者

于北京，2005年4月




目 录

第一章 函数、极限、连续性	1
§1 函数	1
§2 极限	5
§3 连续性	19
小结与习题	26
第二章 一元函数微分学	32
§1 导数与微分	32
§2 微分中值定理	47
§3 导数的应用	67
小结与习题	76
第三章 一元函数积分学	84
§1 不定积分	84
§2 定积分	101
§3 定积分的应用	122
§4 广义积分	132
小结与习题	136
第四章 向量代数和空间解析几何	146
§1 空间直角坐标系与向量代数	146
§2 平面与直线	151
§3 二次曲面	161
小结与习题	164
第五章 多元函数微分学	168
§1 多元函数微分法	168
§2 多元函数微分学的应用	181
小结与习题	194
第六章 多元函数积分学	199
§1 二重积分与三重积分	199
§2 曲线积分	216



§ 3 曲面积分	229
小结与习题	245
第七章 无穷级数	252
§ 1 常数项级数	252
§ 2 幂级数	266
§ 3 傅里叶级数	281
小结与习题	287
第八章 常微分方程	294
§ 1 一阶微分方程	294
§ 2 高阶微分方程降阶解法	307
§ 3 线性微分方程	310
§ 4 微分方程的应用	323
小结与习题	333
第九章 线性代数	337
§ 1 行列式	337
§ 2 矩阵及其运算	346
§ 3 向 量	360
§ 4 线性方程组	377
§ 5 矩阵的特征值和特征向量	395
§ 6 二次型	415
小结与习题	430
第十章 概率论与数理统计	451
§ 1 随机事件和概率	451
§ 2 随机变量及其概率分布	462
§ 3 二维随机变量及其概率分布	476
§ 4 随机变量的数字特征	494
§ 5 大数定律与中心极限定理	510
§ 6 数理统计的基本知识	515
§ 7 参数估计	526
§ 8 假设检验	541
小结与习题	549
附录 1 差分方程简介	571
附录 2 2004 年全国攻读硕士学位研究生入学考试数学试题及参考解答	573
附录 3 2005 年全国攻读硕士学位研究生入学考试数学试题及参考解答	597



第一章 函数、极限、连续性

§ 1

函数

一、内容摘要与考查重点

1. 函数的概念与表示法

函数的定义: 设有两个变量 x 与 y , 如果当变量 x 在某数集 D 内任取一值时, 变量 y 按照一定的法则总有一个确定值与之对应, 则称变量 y 是变量 x 的函数, 记为 $y = f(x)$.

这时称 x 为自变量, 也称 y 是因变量, 称 D 是函数 $f(x)$ 的定义域.

2. 函数的简单性质

(1) 单调性: 设 $y = f(x)$ 在某区间 I 内有定义, 如果对于该区间内的任意两点 $x_1 < x_2$, 恒有 $f(x_1) < f(x_2)$ (或 $f(x_1) > f(x_2)$), 则称 $f(x)$ 在区间 I 上是单调增加的 (或单调减少的).

(2) 奇偶性: 设 $y = f(x)$ 在某对称于原点的区间 I 内有定义, 如果对于 I 内任意点 x , 恒有 $f(-x) = f(x)$, 则称 $f(x)$ 在 I 内是偶函数; 如果恒有 $f(-x) = -f(x)$, 则称 $f(x)$ 在 I 内是奇函数.

偶函数的图形对称于 y 轴, 奇函数的图形对称于原点.

(3) 周期性: 设 $y = f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 内有定义, 若存在一个正的常数 T , 使得 $f(x+T) = f(x)$ 对于任何的 $x \in \mathbf{R}$ 都成立, 则称 $f(x)$ 是周期函数. 通常将满足关系式的最小正数 T 称为函数 $f(x)$ 的周期.

(4) 有界性: 设 $y = f(x)$ 在区间 I 内有定义, 如果存在 $M > 0$, 使得对于任何 $x \in I$, 都有 $|f(x)| \leq M$, 则称 $f(x)$ 在 I 内有界.

3. 复合函数

设 $y = f(u)$ 的定义域为 D_u , $u = \varphi(x)$ 的定义域为 D_x , 值域为 E , 若 $E \subseteq D_u$, 则对于任何 $x \in D_x$, 有 $u = \varphi(x)$ 与 x 对应, 而 $u \in E \subseteq D_u$, 故又有确定的 y 与 u 对应, 从而, 对于任何 $x \in D_x$, 都有确定的 y 与 x 对应, 按照函数的定义, 确定了 y 是 x 的函数. 此函数是通过中间变量 u 建立起 y 与 x 的对应关系的, 因而, 称此函数为 $y = f(u)$ 与 $u = \varphi(x)$ 的复合函数, 记为 $y = f(\varphi(x))$.

4. 反函数

设 $y = f(x)$ 的值域为 D_y , 如果对于 D_y 中的任何一个 y 值, 从关系式 $y = f(x)$ 中可确定惟一的 x 值, 则按照函数的定义, 也确定了 x 是 y 的函数, 称此函数为 $y = f(x)$ 的反函数, 记为 $x = f^{-1}(y)$.

习惯上, 用 x 表示自变量, y 表示因变量, 因此也称 $y = f^{-1}(x)$ 是 $y = f(x)$ 的反函数.

$y = f^{-1}(x)$ 与 $y = f(x)$ 的图像关于直线 $y = x$ 对称.

注意: $x = f^{-1}(y)$ 与 $y = f(x)$ 的图像是同一个.

5. 初等函数与基本初等函数

(1) 基本初等函数: 称下述五种函数为基本初等函数.

幂函数 $y = x^\mu$ (μ 为实数).

指数函数 $y = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$).

对数函数 $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$).

三角函数 $y = \sin x, y = \cos x, y = \tan x, y = \cot x, y = \sec x, y = \csc x$.

反三角函数 $y = \arcsin x, y = \arccos x, y = \arctan x, y = \operatorname{arccot} x$.

(2) 初等函数: 由基本初等函数经过有限次四则运算、有限次复合而成并能用一个解析式表示的函数称为初等函数.

6. 分段函数

如果一个函数 $f(x)$ 在其定义域内的不同的区间内, 其对应法则有着不同的初等函数表达式, 则称此函数为分段函数.

对于本小节的内容, 应重点掌握以下几点:

(1) 理解函数的概念, 掌握函数的表示法.

例如, 应会求函数的定义域和值域, 会从函数的复合表达式中求出原来函数的表达式, 即从 $f(\varphi(x)) = g(x)$ 中求出 $f(x)$ 的表达式, 尤其应注意求分段函数的复合问题.

(2) 了解函数的有界性、单调性、周期性和奇偶性.

例如, 应会判定函数的单调性(用定义或用后面所述的导数方法)、奇偶性等.

(3) 掌握基本初等函数的性质及其图形.

二、例题分析

例 1 已知 $f(x + \frac{1}{x}) = \frac{x^2}{x^4 + 1}$, 求 $f(x)$.

分析: 这是已知复合函数 $f(\varphi(x))$ 的表达式, 欲求函数 $f(x)$ 的表达式的问题. 此问题的一般解法是在 $f(\varphi(x))$ 的表达式中, 令 $\varphi(x) = u$, 即可得到 $f(u)$ 的表达式, 从而可得出 $f(x)$ 的表达式.

解: 令 $x + \frac{1}{x} = u$, 则有

$$f(u) = \frac{x^2}{x^4 + 1} = \frac{1}{x^2 + \frac{1}{x^2}} = \frac{1}{(x + \frac{1}{x})^2 - 2} = \frac{1}{u^2 - 2},$$

所以 $f(x) = \frac{1}{x^2 - 2}$.

例2 已知 $f(x)$ 在 $[-2, 2]$ 上为偶函数, 且 $f(x) = 2x^2 + x (x \in [-2, 0])$, 那么当 $x \in [0, 2]$ 时, $f(x)$ 的表达式为().

(A) $2x^2 + x$ (B) $2x^2 - x$ (C) $-2x^2 + x$ (D) $-2x^2 - x$

分析: 已知函数的奇偶性时, 可以由奇偶性的性质来得出对称区间上的函数的表达式.

当 $x \in [0, 2]$ 时, $-x \in [-2, 0]$, 由于 $f(x)$ 是偶函数, 所以有

$$f(x) = f(-x) = 2(-x)^2 + (-x) = 2x^2 - x.$$

解: 应选 B.

例3 设 $f(x) = \begin{cases} 1, & |x| \leq 1, \\ 0, & |x| > 1, \end{cases} g(x) = \begin{cases} 2 - x^2, & |x| \leq 2, \\ 2, & |x| > 2, \end{cases}$ 求 $f(g(x))$.

分析: 这是一个分段函数求复合函数的问题, 按照一般求复合函数的方法, 先将 $f(x)$ 的表达式中的 x 用 $g(x)$ 替换. 这里的关键是要注意到 $g(x)$ 也是分段函数, 要讨论分段函数 $g(x)$ 的取值范围.

$$\text{解: } f(g(x)) = \begin{cases} 1, & |g(x)| \leq 1, \\ 0, & |g(x)| > 1, \end{cases}$$

以下的关键问题是要知道当 x 在什么范围内变化时 $|g(x)| \leq 1$, 当 x 在什么范围内变化时 $|g(x)| > 1$.

先来讨论使 $|g(x)| \leq 1$ 的 x 的范围.

由 $g(x)$ 的表达式清楚地看出只有当 $|x| \leq 2$ 时才可能使 $|g(x)| \leq 1$.

在 $|x| \leq 2$ 范围内, 要使 $|g(x)| = |2 - x^2| \leq 1$,

只须 $1 \leq |x| \leq \sqrt{3}$.

所以, 当 $1 \leq |x| \leq \sqrt{3}$ 时, 有 $|g(x)| \leq 1$.

再来讨论使 $|g(x)| > 1$ 的 x 的范围.

由 $g(x)$ 的表达式可知当 $|x| > 2$ 时 $|g(x)| > 1$. 另外, 当 $\sqrt{3} < |x| \leq 2$ 或 $|x| < 1$ 时, 也有 $|g(x)| > 1$.

综合上述讨论知

$$f(g(x)) = \begin{cases} 1, & 1 \leq |x| \leq \sqrt{3}, \\ 0, & |x| > \sqrt{3} \text{ 或 } |x| < 1. \end{cases}$$

例4 设 $y = (a - x^b)^{\frac{1}{n}}$, 当 a, b 满足条件_____时, 该函数的反函数与该函数相等.

分析: 由 $y = (a - x^b)^{\frac{1}{n}}$ 可得

$$x = (a - y^n)^{\frac{1}{b}}$$

也即反函数为 $y = (a - x^n)^{\frac{1}{b}}$.

与直接函数比较就知当 $b = n, a$ 为任意值时, 反函数与直接函数相等.



解: $b = n, a$ 为任意值.

例5 设 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上单增, $f(x)$ 在 $[g(a), g(b)]$ 上单减, 则 $f(g(-x))$ ().

(A) 在 $[a, b]$ 上单增

(B) 在 $[a, b]$ 上单减

(C) 在 $[-b, -a]$ 上单增

(D) 在 $[-b, -a]$ 上单减

分析: 首先, 可知保证 $f(g(-x))$ 有定义区间应是 $[-b, -a]$, 所以, 可排除 A、B 选项.

然后, 再用单调性定义判断.

任取 $x_1, x_2 \in [-b, -a], x_1 < x_2$.

则 $-x_1, -x_2 \in [a, b]$, 且 $-x_1 > -x_2$.

由 $g(x)$ 的单增性有 $g(-x_1) > g(-x_2)$.

再由 $f(x)$ 的单减性有 $f(g(-x_1)) < f(g(-x_2))$.

所以复合函数 $f(g(-x))$ 在 $[-b, -a]$ 上单增.

解: 应选 C 项.

例6 设 $y = \frac{1}{2x}f(t-x)$, 当 $x = 1$ 时, $y = \frac{1}{2}t^2 - t + 5$, 求 $f(x)$.

解: $x = 1$ 时, $y = \frac{1}{2}f(t-1) = \frac{1}{2}t^2 - t + 5$.

从而 $f(t-1) = t^2 - 2t + 10$.

令 $t-1 = x$, $f(x) = (x+1)^2 - 2(x+1) + 10$.

所以 $f(x) = x^2 + 9$.

例7 设 $f(x) = \frac{x}{x-1}$ ($x \neq 1$), 则 $f(f(f(f(x)))) =$ _____.

分析: $f(f(x)) = \frac{f(x)}{f(x)-1} = \frac{\frac{x}{x-1}}{\frac{x}{x-1}-1} = x$ ($x \neq 1$),

$f(f(f(x))) = \frac{f(f(x))}{f(f(x))-1} = \frac{x}{x-1}$ ($x \neq 1$).

$f(f(f(f(x)))) = f(f(x)) = x$ ($x \neq 1$).

解: 应填 $x(x \neq 1)$.

例8 下列函数中是偶函数的应为 ().

(A) $f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$

(B) $f(x) = ([x])^2$

(C) $f(x) = (2 + \sqrt{3})^x + (2 - \sqrt{3})^x$

(D) $f(x) = \operatorname{sgn}(x) \cdot \cos x$

分析: 此题是考查函数的奇偶性的定义以及一些典型函数的定义. 容易验证 A、D 选项的函数是奇函数, B 选项的函数非奇非偶, 故只有选择 C.

因为此时

$$\begin{aligned} f(-x) &= (2 + \sqrt{3})^{-x} + (2 - \sqrt{3})^{-x} = \left(\frac{1}{2 + \sqrt{3}}\right)^x + \left(\frac{1}{2 - \sqrt{3}}\right)^x \\ &= (2 - \sqrt{3})^x + (2 + \sqrt{3})^x = f(x). \end{aligned}$$

解:选择 C.

§ 2

极限

一、内容摘要与考查重点

1. 极限的有关定义

(1) 数列极限的定义: 对于数列 $\{x_n\}$, 如果对于任意给定的 $\epsilon > 0$, 总存在正整数 N , 使得当 $n > N$ 时, 恒有 $|x_n - a| < \epsilon$, 则称常数 a 是数列 $\{x_n\}$ 的当 n 趋于无穷时的极限, 记为 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 也记为 $x_n \rightarrow a (n \rightarrow \infty)$.

(2) 当自变量趋于无穷时函数极限的定义

① 设 $f(x)$ 当 $|x|$ 充分大时有定义. 如果对于任意给定的 $\epsilon > 0$, 总存在 $X > 0$, 使得当 $|x| > X$ 时, 恒有 $|f(x) - A| < \epsilon$, 则称常数 A 是 $f(x)$ 的当 x 趋于无穷时的极限, 记为 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A$, 也记为 $f(x) \rightarrow A (x \rightarrow \infty)$.

② 设 $f(x)$ 当 x 充分大时有定义. 如果对于任意给定的 $\epsilon > 0$, 总存在 $X > 0$, 使得当 $x > X$ 时, 恒有 $|f(x) - A| < \epsilon$, 则称常数 A 是 $f(x)$ 的当 x 趋于正无穷时的极限, 记为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$, 也记为 $f(x) \rightarrow A (x \rightarrow +\infty)$.

③ 设 $f(x)$ 当 $-x$ 充分大时有定义. 如果对于任意给定的 $\epsilon > 0$, 总存在 $X > 0$, 使得当 $x < -X$ 时, 恒有 $|f(x) - A| < \epsilon$, 则称常数 A 是 $f(x)$ 的当 x 趋于负无穷时的极限, 记为 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A$, 也记为 $f(x) \rightarrow A (x \rightarrow -\infty)$.

(3) 当自变量趋于某定点时函数极限的定义:

① 设 $f(x)$ 在 x_0 的某去心邻域内有定义. 如果对于任意给定的 $\epsilon > 0$, 总存在 $\delta > 0$, 使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 恒有 $|f(x) - A| < \epsilon$, 则称常数 A 是 $f(x)$ 的当 x 趋于 x_0 时的极限, 记为 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 或 $f(x) \rightarrow A (x \rightarrow x_0)$.

② 设 $f(x)$ 在 x_0 的左邻域内有定义. 如果对于任意给定的 $\epsilon > 0$, 总存在 $\delta > 0$, 使得当 $x_0 - \delta < x < x_0$ 时, 恒有 $|f(x) - A| < \epsilon$, 则称常数 A 是 $f(x)$ 的当 x 趋于 x_0 时的左极限, 记为 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = A$, 或 $f(x) \rightarrow A (x \rightarrow x_0^-)$.

③ 设 $f(x)$ 在 x_0 的右邻域内有定义. 如果对于任意给定的 $\epsilon > 0$, 总存在 $\delta > 0$, 使得当 $x_0 < x < x_0 + \delta$ 时, 恒有 $|f(x) - A| < \epsilon$, 则称常数 A 是 $f(x)$ 的当 x 趋于 x_0 时的右极限, 记为 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = A$, 或 $f(x) \rightarrow A (x \rightarrow x_0^+)$.

(4) 无穷小的定义: 如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$, 则称 $f(x)$ 为当 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷小.

类似地, 可定义当 $x \rightarrow \infty$ (或其他过程) 时的无穷小.

(5) 无穷大的定义: 设 $f(x)$ 在 x_0 的某去心邻域内有定义. 如果对于任意给定的 $M > 0$, 总存在 $\delta > 0$, 使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 恒有 $|f(x)| > M$, 则称 $f(x)$ 是当 x 趋于

x_0 时的无穷大. 记为 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$.

类似地, 可定义 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$.

类似地, 还可定义当 $x \rightarrow \infty$ (或其他过程) 时的无穷大.

(6) 无穷小阶的定义: 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha = 0$, $\lim_{x \rightarrow x_0} \beta = 0$.

① 如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha}{\beta} = 0$, 则称当 $x \rightarrow x_0$ 时, α 是比 β 高阶的无穷小, 记为 $\alpha = o(\beta)$.

② 如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha}{\beta} = A (A \neq 0)$, 则称当 $x \rightarrow x_0$ 时, α 是与 β 同阶的无穷小, 记为 $\alpha = O(\beta)$;

特别地, 当 $A = 1$ 时, 则称当 $x \rightarrow x_0$ 时, α 是与 β 等阶的无穷小, 记为 $\alpha \sim \beta$.

③ 如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha}{\beta} = \infty$, 则称当 $x \rightarrow x_0$ 时, α 是比 β 低阶的无穷小.

类似地, 可定义当 $x \rightarrow \infty$ (或其他过程) 情形下的无穷小的阶.

2. 极限的有关性质

(1) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 的充分必要条件是 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$.

(2) (保号性) 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 且 $A > 0 (A < 0)$, 则存在 $\delta > 0$, 使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有 $f(x) > 0 (f(x) < 0)$.

(3) 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 且 $f(x) \geq 0 (f(x) \leq 0)$, 则 $A \geq 0 (A \leq 0)$.

(4) (局部有界性) 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在, 则存在 x_0 的某去心的邻域 $U^0(x_0, \delta)$, 使得 $f(x)$ 在 $U^0(x_0, \delta)$ 内有界.

以上 4 条性质在 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A$ (或其他过程) 的情形下也有相应的形式.

3. 极限存在准则

(1) 单调有界数列必有极限.

(2) (夹逼准则) 若在 x_0 的某去心的邻域 (或 $|x|$ 充分大时) 内有 $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = A$, 则有 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$.

4. 两个重要极限

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$.

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$.

通过变量替换这两个公式可写成更加一般的形式: 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$, 且 $f(x) \neq 0$, 则有

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\sin f(x)}{f(x)} = 1.$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (1+f(x))^{\frac{1}{f(x)}} = e.$$

5. 极限的运算法则

设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$, 则

$$(1) \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \pm g(x)) = A \pm B.$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot g(x) = AB.$$

$$(3) \text{若 } B \neq 0, \text{ 则 } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B}.$$

上述性质当 $x \rightarrow \infty$ 时也成立.

6. 无穷小的有关性质

(1) 有限个无穷小的代数和是无穷小.

(2) 有限个无穷小的乘积是无穷小.

(3) 有界变量乘无穷小是无穷小.

(4) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 的充分必要条件是 $f(x) = A + \alpha$, 其中 $\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha = 0$.

(5) 若 $f(x)$ 是当 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷小, 且 $f(x) \neq 0$, 则 $\frac{1}{f(x)}$ 是当 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷大;

反之, 若 $f(x)$ 是当 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷大, 则 $\frac{1}{f(x)}$ 是当 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷小.

(6) (等价无穷小替换) 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha = 0, \lim_{x \rightarrow x_0} \beta = 0$, 且 $\alpha \sim \alpha', \beta \sim \beta'$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha}{\beta} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha'}{\beta'}$.

上述性质当 $x \rightarrow \infty$ 时也成立.

对于本小节的内容, 应重点掌握以下几点:

(1) 利用极限的运算法则求极限.

(2) 利用两个重要极限求极限.

(3) 利用等价无穷小替换求极限.

(4) 利用极限存在准则求极限.

(5) 利用左、右极限求极限或证明极限不存在.

(6) 利用函数的连续性求极限.

(7) 利用“洛必达法则”求极限.

上述(6)、(7)项的内容将在后面复习.

二、例题分析

例 1 “对任意给定的 $\epsilon \in (0, 1)$, 总存在正整数 N , 当 $n \geq N$ 时, 恒有 $|x_n - a| \leq 2\epsilon$ ” 是 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ 的().

(A) 充分但非必要条件

(B) 必要但非充分条件

(C) 充分必要条件

(D) 既非充分又非必要条件

分析: 此题是 1999 年全国考研数学二的原题, 考查对数列极限的定义的理解. $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ 的定义是“对任意给定的 $\epsilon_1 > 0$, 总存在正整数 N_1 , 当 $n > N_1$ 时, 恒有 $|x_n - a| < \epsilon_1$ ”. 两种说法相比较, 似乎定义中的条件更强些, 显然, 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ 的定义必能推出“对任意给定的 $\epsilon \in (0, 1)$, 总存在正整数 N , 当 $n > N$ 时, 恒有 $|x_n - a| \leq 2\epsilon$ ”. 但是其逆也是正确的. 因为对任意 $\epsilon_1 > 0$, 取 $\epsilon = \min\left(\frac{\epsilon_1}{3}, \frac{1}{3}\right)$, 显然 $\epsilon \in (0, 1)$, 所以总存在正整数 N , 当



$n \geq N$ 时, 恒有 $|x_n - a| \leq 2\epsilon$. 现取 $N_1 = N - 1$, 于是当 $n > N_1$ 时, 恒有 $|x_n - a| \leq \frac{2\epsilon_1}{3} < \epsilon_1$. 所以以上两种说法是等价的, 即选项 C 是正确的.

解: 应选 C.

例 2 若 ϵ 为任意给定的正数, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ 的充要条件为 ().

- (A) $U(a, \epsilon)$ 内含有 $\{x_n\}$ 的全部点
- (B) $U(a, \epsilon)$ 内含有 $\{x_n\}$ 的无穷多个点
- (C) $U(a, \epsilon)$ 之外至多有 $\{x_n\}$ 的有限个点
- (D) $U(a, \epsilon)$ 之外可能有 $\{x_n\}$ 的无穷多个点

分析: 由于“ $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ ”的精确含义是“对任意给定的 $\epsilon > 0$, 总存在 N , 当 $n > N$ 时, 恒有 $a - \epsilon < x_n < a + \epsilon$ ”, 所以, 在 $U(a, \epsilon)$ 内不一定有 $\{x_n\}$ 的全部点, 只含有满足 $n > N$ 的 x_n , 所以 A 不对. 而 B “ $U(a, \epsilon)$ 内含有 $\{x_n\}$ 的无穷多个点” 只能保证在某 N 之后的无穷多项 x_n 在 $U(a, \epsilon)$ 内, 而不能保证 N 之后的一切 x_n 都在 $U(a, \epsilon)$ 内, 故 B 也不对. C “ $U(a, \epsilon)$ 之外至多有 $\{x_n\}$ 的有限个点” 能保证存在 N , 当 $n > N$ 时的 x_n 都在 $U(a, \epsilon)$ 内, 所以, C 与“ $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ ”是可以互相推出的. 易知 D 项也不对.

解: 应选 C.

例 3 设对任意的 x , 总有 $\varphi(x) \leq f(x) \leq g(x)$, 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} (g(x) - \varphi(x)) = 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ ().

- (A) 存在且等于零
- (B) 存在但不一定为零
- (C) 一定不存在
- (D) 不一定存在

分析: 此题是 2000 年全国考研数学三的原题. 有的同学认为由条件“ $\lim_{x \rightarrow \infty} (g(x) - \varphi(x)) = 0$ ”则可得出“ $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \varphi(x)$ ”, 但它们不一定为零, 故错选为 B. 事实上, 由条件“ $\lim_{x \rightarrow \infty} (g(x) - \varphi(x)) = 0$ ”不一定能保证 $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x)$, $\lim_{x \rightarrow \infty} \varphi(x)$ 的存在, 例如若取 $g(x) = e^x + e^{-x}$, $\varphi(x) = e^x - e^{-x}$, 则 $\lim_{x \rightarrow \infty} (g(x) - \varphi(x)) = 0$, 但 $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow \infty} \varphi(x)$ 都不存在. 这样, 可以想像, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 也不一定存在了. 例如取 $f(x) = e^x$, 则 $\varphi(x) \leq f(x) \leq g(x)$, 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} (g(x) - \varphi(x)) = 0$, 但 $\lim_{x \rightarrow \infty} e^x$ 不存在.

解: 应选 D.

例 4 设 $\{a_n\}, \{b_n\}, \{c_n\}$ 均为非负数列, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 1, \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \infty$, 则必有 ().

- (A) $a_n < b_n$ 对任意 n 成立
- (B) $b_n < c_n$ 对任意 n 成立
- (C) 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n c_n$ 不存在
- (D) 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n c_n$ 不存在

分析: 由于极限值的大小只能反映当 $n \rightarrow \infty$ 时的数列的变化趋势, 不能反映前面有限项的取值情况. 所以, A、B 选项都是不正确的. 由例 $\lim_{n \rightarrow \infty} x \cdot \frac{1}{x} = 1$ 知 C 选项也不正确. 由无穷大的定义易知 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n c_n = \infty$, 所以, D 选项正确.

解: 应选 D.

例5 设 $x_n = \begin{cases} \frac{n^2 + \sqrt{n}}{n}, & n \text{ 为奇数}, \\ \frac{1}{n}, & n \text{ 为偶数}, \end{cases}$ 则当 $n \rightarrow \infty$ 时, x_n 为().

- (A) 无穷大量 (B) 无穷小量
(C) 有界变量 (D) 无界变量

分析: 当 n 为奇数时, $x_n \rightarrow \infty$.

n 为偶数时, $x_n \rightarrow 0$.

所以, x_n 既不是无穷大量, 也不是无穷小量. 由于 $x_n \rightarrow \infty$ (n 为奇数), 所以 x_n 不是有界变量而是无界变量, 故 D 选项正确.

解: 应选 D.

例6 设 $f(x) = x \sin \frac{1}{x}$, 则 $f(x)$ ().

- (A) $x \rightarrow \infty$ 时是无穷大量 (B) $x \rightarrow \infty$ 时是无穷小量
(C) $x \rightarrow 0$ 时是无界变量 (D) $x \rightarrow 0$ 时是无穷小量

分析: 由于 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{1}{x}}{\frac{1}{x}} = 1$, 所以 A、B 选项均不对.

又由于 $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0$, 所以 D 正确, 而 C 不正确.

解: 应选 D.

例7 若 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = A$, 则必有().

- (A) $f(x_0) = A$
(B) $f(x_0)$ 存在但不一定为 A
(C) 存在邻域 $U^0(x_0, \delta)$, 使 $f(x)$ 在其中有界
(D) 对任何邻域 $U^0(x_0, \delta)$, $f(x)$ 在其中有界

分析: 由极限的定义知“ $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ ”的精确含义是“对任何给定 $\epsilon > 0$, 存在 $U^0(x_0, \delta)$, 使得 $x \in U^0(x_0, \delta)$ 时, $A - \epsilon < f(x) < A + \epsilon$ ”, 易知 C 正确. 而 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 与 $f(x_0)$ 的存在是无关的, 故 A、B 不正确. 由极限的定义可知“ $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ ”只能保证 $f(x)$ 在 x_0 的附近有界, 故要求 $U^0(x_0, \delta)$ 中的 δ 较小, 不能保证在任意的 $U^0(x_0, \delta)$ 内 $f(x)$ 有界, 所以 D 也不对.

解: 应选 C.

例8 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{(k+1)!}$.

分析: 这是一个 n 项求和求极限的问题. 对这类问题首先应考虑是否这个和式能够求和, 即用一个单项表示. 此时, 所谓的“拆项法”要经常用到, 即将和式“ $\sum_{k=1}^n a_k$ ”写成

“ $\sum_{k=1}^n (b_k - b_{k+1})$ ”的形式,再展开求和时就会有许多项“抵消”,剩下一个单项形式. 然后再求极限.

$$\begin{aligned}\text{解: } \sum_{k=1}^n \frac{k}{(k+1)!} &= \sum_{k=1}^n \frac{(k+1)-1}{(k+1)!} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k!} - \frac{1}{(k+1)!} \right) \\ &= 1 - \frac{1}{2!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{n!} - \frac{1}{(n+1)!} \\ &= 1 - \frac{1}{(n+1)!}.\end{aligned}$$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{(k+1)!} = 1.$

例 9 设 $f(x) = a^x (a > 0, a \neq 1)$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \ln[f(1)f(2)\cdots f(n)] = \underline{\hspace{2cm}}.$

分析: 此题是 1999 年全国考研数学四的原题. 此题考查的是对数函数性质, 数列极限的求法, 以及利用对数性质运算.

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \ln f(1) \cdots f(n) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \ln f(i) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \ln a^i = \lim_{n \rightarrow \infty} \ln a \cdot \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n i \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \ln a \cdot \frac{n(n+1)}{2n^2} = \frac{\ln a}{2}.\end{aligned}$$

解: 应填 $\frac{1}{2} \ln a.$

例 10 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x(\sqrt{x^2-4}-x).$

分析: 此式中含有“ $\infty - \infty$ ”的因子, 不好判断其极限值, 而且该因子含根号, 常用的处理方法是分子分母同乘一个共轭根式来变形.

$$\begin{aligned}\text{解: } \lim_{x \rightarrow +\infty} x(\sqrt{x^2-4}-x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x(\sqrt{x^2-4}-x)(\sqrt{x^2-4}+x)}{(\sqrt{x^2-4}+x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-4x}{\sqrt{x^2-4}+x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-4}{\sqrt{1-\frac{4}{x^2}}+1} = -2.\end{aligned}$$

例 11 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x \sin^2 x}.$

分析: 这是一个“ $\frac{0}{0}$ ”型的极限, 分母上可用等价无穷小替换为 x^3 , 但分子上是两个等价无穷小 $\tan x$ 与 $\sin x$, 它们都与 x 等价但是不能都替换为 x , 因为在加、减运算中不能用等价无穷小替换. 可以将分子也写成无穷小之积的形式, 为此, 将 $\tan x$ 提到括号外来.

$$\begin{aligned}\text{解: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x \sin^2 x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x(1 - \cos x)}{x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x(1 - \cos x)}{x^3}\end{aligned}$$