



TIANSHIZHUANGYUANCONGSHU

天使状元丛书

护士

HUSHIZHIYEZIGE
KAOSHI
KAODIAN
JIYINGSHIZHINAN

执业资格考试考点 及应试指南

(内科护理学、外科护理学、社区护理学)

上册

主编：玄英哲 李春玉

延边大学出版社



2015年执业护士资格考试

护士

执业资格考试考点 及应试指南

中华护理学会 中华护理学会 中华护理学会





TIANSHIZHUANGYUANCONGSHU

天使状元丛书

护 士

HUSHIZHIYEZIGEKAOSHIKAODIANJIYINGSHIZHINAN

执业资格考试考点 及应试指南

(上册)

延边大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

护士执业资格考试考点及应试指南. 上册/ 玄英哲,
李春玉主编. —延吉: 延边大学出版社, 2010. 2
(天使状元丛书)

ISBN 978 - 7 - 5634 - 3138 - 0

I. ①护… II. ①玄… ②李… III. ①护士 - 资格考
核 - 自学参考资料 IV. ①R192. 6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 030249 号

护士执业资格考试考点及应试指南 (上册)

丛书主编: 玄英哲 李春玉

本册主编: 金 灿

责任编辑: 朴莲顺

出版发行: 延边大学出版社

社址: 吉林省延吉市公园路 977 号 邮编: 133002

网址: <http://www.ydcbs.com>

E-mail: ydcbs@ydcbs.com

电话: 0433 - 2732435 传真: 0433 - 2732434

发行部电话: 0433 - 2133001 传真: 0433 - 2733266

印刷: 北京集惠印刷有限责任公司

开本: 710 × 1000 毫米 1/16

印张: 19.75 字数: 167 千字

印数: 1—5000

版次: 2010 年 4 月第 1 版

印次: 2010 年 4 月第 1 次

ISBN 978 - 7 - 5634 - 3138 - 0

定价: 28.00 元

编 委 会

主 编 金 灿

副主编 刘忠民 郎延梅 李彩福

编 委 姜俊哲 柳明仁 张 龙

朴龙范 吴善玉 朱文娟



护士执业资格考试是护理学专业资格考试三个层次中最基础的考试之一,是每一个护士必须达到的严格而明确的目标。为此,我们组织了富有经验的护理学专业教师,根据最新考试大纲的要求编写了本书。本书编写的初衷是希望通过此书来帮助广大考生了解考试的重点和难点,在有效的时间内有计划、有选择地复习,同时将我们教学和应试经验介绍给广大考生,希望能为考生顺利通过考试给予帮助。护士执业资格考试的主要内容 of 护理基本理论、基本知识、基本技能,涉及内科护理学、外科护理学、妇产科护理学、儿科护理学、护理学基础 5 门课程。在新的医学模式中,护理工作者的任务和职责不断拓展,在护理实践中承担多种角色,未来大部分的初级保健任务将由护士承担,社区护理是未来护理事业的重要组成部分。基于社区护理的重要性和护士晋级中、高级考试大纲的要求,我们将社区护理学相关内容也编入到本书中。

本书紧扣最新考试大纲,参考权威教材、历年考题,提炼出考点,根据考试范围和题型分章节编写,力求习题典型,内容实用,语言简练,可读性强,不但向考生传递了考试知识,而且提供了一种备考方法,有助于考生全面掌握考点,顺利通过考试。

本书主要供参加国家护士执业资格考试的考生使用,也可作为自学考试、专升本考试、成人高考、晋级考试及在校大中专护生学习期间考试的参考资料。

我们从各个方面做了不懈的努力,但不当之处在所难免,恳请同行专家和广大考生批评指正。最后,衷心祝愿考生朋友们顺利通过考试,成为一名优秀的白衣天使!

编者

2010 年 2 月



第一篇 内科护理学

第一章	呼吸系统疾病病人的护理	(2)
第二章	循环系统疾病病人的护理	(18)
第三章	消化系统疾病病人的护理	(37)
第四章	泌尿系统疾病病人的护理	(54)
第五章	血液及造血系统疾病病人的护理	(63)
第六章	内分泌代谢性疾病病人的护理	(72)
第七章	风湿性疾病病人的护理	(82)
第八章	神经系统疾病病人的护理	(87)
第九章	理化因素所致疾病病人的护理	(103)

第二篇 外科护理学

第一章	水电解质酸碱平衡失调病人的护理	(112)
第二章	外科休克病人的护理	(116)
第三章	麻醉病人的护理	(120)
第四章	手术室管理和工作	(124)
第五章	围手术期病人的护理	(127)
第六章	外科病人的营养支持	(131)
第七章	外科感染病人的护理	(135)



第八章 损伤病人的护理	(140)
第九章 烧伤伤员的护理	(144)
第十章 器官移植病人的护理	(149)
第十一章 肿瘤病人的护理	(152)
第十二章 颈部疾病病人的护理	(155)
第十三章 乳房疾病病人的护理	(159)
第十四章 急性化脓性腹膜炎病人的护理	(163)
第十五章 腹部损伤病人的护理	(167)
第十六章 腹外疝病人的护理	(171)
第十七章 胃十二指肠疾病病人的护理	(175)
第十八章 小肠疾病病人的护理	(179)
第十九章 阑尾炎病人的护理	(183)
第二十章 大肠、肛管疾病病人的护理	(186)
第二十一章 门静脉高压症病人的护理	(190)
第二十二章 肝脏疾病病人的护理	(193)
第二十三章 胆道疾病病人的护理	(196)
第二十四章 胰腺疾病病人的护理	(200)
第二十五章 周围血管疾病病人的护理	(203)
第二十六章 颅内压增高病人的护理	(207)
第二十七章 颅脑损伤病人的护理	(211)
第二十八章 胸部损伤病人的护理	(217)
第二十九章 肺癌病人的护理	(223)
第三十章 食管癌病人的护理	(226)
第三十一章 体外循环病人的护理	(229)
第三十二章 泌尿、男生殖系统疾病的主要症状和检查	(231)
第三十三章 泌尿系统损伤病人的护理	(234)
第三十四章 尿石症病人的护理	(239)
第三十五章 泌尿系统梗阻病人的护理	(244)
第三十六章 泌尿系统肿瘤病人的护理	(248)
第三十七章 骨科病人的一般护理	(251)
第三十八章 骨关节损伤病人的护理	(254)



第三篇 社区护理学

第一章 社区护理概述·····	(260)
第二章 以社区为中心的护理·····	(263)
第三章 以家庭为中心的护理·····	(267)
第四章 社区健康教育·····	(271)
第五章 以群体组织为中心的护理·····	(274)
第六章 慢性病及传染病病人的保健与护理·····	(281)
第七章 社区环境卫生·····	(294)
第八章 社区灾害与急救·····	(300)

第一篇 内科护理学





第一章 呼吸系统疾病病人的护理

考点

1. 咳嗽与咳痰的护理措施
2. 咯血的概念;病因、咯血量的估计
3. 肺源性呼吸困难的概念、临床类型及特点
4. 支气管哮喘的概念、病因、临床表现、诊断要点、主要治疗药物、用药护理
5. 慢性阻塞性肺疾病(COPD)的概念、慢性支气管炎的诊断标准、慢性阻塞性肺疾病的肺功能检查结果、慢性阻塞性肺疾病患者呼吸功能锻炼的方法
6. 慢性肺源性心脏病的概念、临床表现、诊断要点、用药护理、肺性脑病的护理
7. 支气管扩张症的概念、临床表现、治疗要点、体位引流、咯血窒息的表现及护理
8. 肺炎的概念、分类、肺炎合并感染性休克的抢救配合、肺炎球菌肺炎的临床特征、各种类型肺炎治疗的首选药物
9. 肺结核的传播途径、临床表现、结核菌素实验的方法及结果判断、肺结核的分类、X线表现、肺结核的化疗原则、常用化疗药物的种类及主要的不良反应、肺结核的预防
10. 原发性支气管肺癌的分类、临床表现、治疗原则、疼痛的护理
11. 呼吸衰竭的概念、诊断标准、临床表现、治疗要点、氧疗的护理(给氧方法、氧疗效果监测)、病情观察内容、用药护理、保持呼吸道通畅的措施



模拟题

A1、A2 型题

1. 护士指导病人留取痰标本时不正确的是 ()
- A. 最好清晨留取痰标本
B. 最好是在刷牙后留取痰标本
C. 用力咳出呼吸道深处痰
D. 要注意防止唾液及上呼吸道分泌物污染
E. 留取后及时送检
2. 护士为病人进行体位引流,不正确的是 ()
- A. 确定体位引流很重要
B. 引流应在进餐前 30 分钟完成
C. 每天可引流 1~3 次
D. 每次引流时间可持续 15 分钟
E. 引流后辅以雾化吸入可增加引流效果
3. 护士在为病人进行胸部叩击,下列操作中不正确的是 ()
- A. 从肺底自下而上、由外向内进行叩击
B. 将单层薄布置于病人胸廓叩击部位
C. 每一肺叶连续叩击 1~3min
D. 以轻柔的力度叩击胸部
E. 叩击结束后协助病人用清水漱口
4. 以呼气性呼吸困难为主要表现的是 ()
- A. 急性喉炎 B. 肺炎 C. 慢性支气管炎
D. 支气管哮喘和肺气肿 E. 胸腔积液
5. 吸气性呼吸困难的发生机制是 ()
- A. 大气道狭窄梗阻 B. 广泛性肺部病变使呼吸面积减少
C. 肺组织弹性减弱 D. 上呼吸道异物刺激
E. 肺组织弹性减弱及小支气管痉挛性狭窄
6. 下列关于咯血病人的护理不正确的是 ()
- A. 大量咯血病人应禁食
B. 小量咯血病人可以活动
C. 大量咯血病人应绝对卧床



- D. 咯血量过多时可给予输血
E. 极度紧张咳嗽剧烈的体弱者应给予强效镇咳药
7. 痰量较多、呼吸功能尚好的支气管扩张患者最适合的排痰措施是 ()
A. 有效咳嗽 B. 拍背与胸壁震荡 C. 湿化呼吸道
D. 体位引流 E. 机械吸痰
8. 对于痰液过多且无力咳嗽的病人,为防止窒息,护士在翻身前首先应 ()
A. 给病人吸氧 B. 给病人吸痰 C. 指导病人有效咳痰
D. 给病人雾化吸入 E. 咳嗽伴有高热
9. 病人出现下列哪种情况常提示有厌氧菌感染 ()
A. 大量脓痰 B. 咳出的痰液有恶臭 C. 痰中带血
D. 有持续存在的湿性啰音 E. 咳嗽伴有高热
10. 慢性支气管炎患者的下列表现中,不应使用抗生素的是 ()
A. 偶尔咳少量黏液样痰 B. 发热
C. 喘息伴哮鸣音 D. 肺内大量湿啰音
E. 外周血白细胞 $15 \times 10^9/L$
11. 慢性阻塞性肺病患者给予持续低流量给氧的依据是 PaO_2 ()
A. 75mmHg B. 65mmHg C. 60mmHg
D. 50mmHg E. 38mmHg
12. 诊断阻塞性肺气肿,最有价值的是 ()
A. PaO_2 低于正常
B. 残气量/肺总量 $>40\%$
C. 第1秒用力呼气量/用力肺活量 $<60\%$
D. 最大通气量低于预计值的 80%
E. 潮气量低于预计值的 80%
13. 慢性肺心病的主要病因是 ()
A. 慢支并发阻塞性肺气肿 B. 支气管哮喘
C. 支气管扩张 D. 重症结核
E. 肺血管栓塞
14. 引起 COPD 最常见的病因是 ()
A. 支气管哮喘 B. 尘肺 C. 慢性支气管炎
D. 慢性纤维空洞性肺结核 E. 支气管扩张
15. 慢性支气管炎最突出的症状是 ()
A. 时有喘息 B. 长期反复咳嗽、咳痰 C. 反复发热
D. 咯血 E. 胸痛
16. 阻塞性肺气肿最突出的表现是 ()



- A. 咳嗽、咳痰 B. 肺部啰音 C. 呼吸音粗糙
D. 心音减弱 E. 呼吸困难
17. 下列最适合用于慢性阻塞性肺气肿病人缓解期的措施是 ()
A. 口服抗生素预防感染 B. 应用止咳药 C. 间断吸氧
D. 增强体质和进行缩唇腹式呼吸 E. 使用支气管扩张剂
18. 阻塞性肺气肿病人做腹式呼吸锻炼时,哪项不正确 ()
A. 吸气时挺腹,呼气时收腹 B. 用鼻吸气、用口呼气
C. 吸气时间长,呼气时间短 D. 每分钟呼吸 7 ~ 8 次
E. 每次进行 10 ~ 20 分钟
19. 关于缩唇呼气,不正确的是 ()
A. 防止呼气时小气道过早塌陷 B. 降低支气管内压
C. 有利于肺泡气排出 D. 主要适用于阻塞性肺病病人
E. 与腹式呼吸结合训练,更好调动通气潜能
20. 关于 COPD 氧疗以下哪项不正确 ()
A. 给予氧疗,使氧分压 $> 60\text{mmHg}$
B. COPD 氧疗应低流量
C. 缓解期 COPD 病人 $\text{PaO}_2 < 55\text{ mmHg}$ 可长期氧疗
D. COPD 病人氧疗应当高流量吸入
E. 长期氧疗可改善 COPD 伴慢性呼吸衰竭病人的生存时间
21. 下面哪种疾病是慢性肺源性心脏病的最常见原发病 ()
A. 支气管哮喘 B. 胸廓畸形 C. 肺结核
D. 慢性支气管炎并发阻塞性肺气肿 E. 支气管扩张
22. 肺心病患者使用利尿剂的原则是 ()
A. 缓慢、小量、间歇 B. 缓慢、大量、间歇 C. 缓慢、小量、持续
D. 快速、大量、持续 E. 快速、小量、间歇
23. 慢性肺源性心脏病急性加重期病人应慎用 ()
A. 镇静剂 B. 祛痰剂 C. 解痉平喘药
D. 呼吸兴奋剂 E. 抗感染药物
24. 慢性肺源性心脏病病人右心衰竭时,首选的治疗措施为 ()
A. 用利尿剂降低心脏前负荷
B. 用洋地黄药物增加心脏泵功能
C. 用血管扩张剂降低右心前后负荷
D. 控制呼吸道感染,改善呼吸功能,纠正缺氧和二氧化碳潴留
E. 气管插管机械通气
25. 肺心病的首要死亡原因是 ()



- A. 酸碱失衡 B. 电解质紊乱 C. 肺性脑病
D. 消化道出血 E. DIC
26. 肺心病肺、心功能失代偿期主要表现为 ()
A. 咳嗽、咳痰加重 B. 发热 C. 反复咯血
D. 胸痛、胸闷 E. 呼吸衰竭和心力衰竭
27. 肺心病急性加重期的治疗关键是 ()
A. 低流量吸氧 B. 利用呼吸机改善呼吸功能
C. 强心利尿 D. 积极控制感染、解除支气管痉挛、改善通气功能
E. 纠正电解质紊乱
28. 慢性肺源性心脏病的症状加重主要由于 ()
A. 呼吸道感染 B. 过度疲劳 C. 摄入钠盐过多
D. 心律失常 E. 停止洋地黄类制剂
29. 慢性肺源性心脏病病人发生呼吸衰竭时,给予低浓度给氧的依据是 ()
A. 便于应用呼吸兴奋剂
B. 慢性呼吸衰竭时,呼吸中枢 CO_2 的刺激仍很敏感
C. 缺氧是维持病人呼吸的重要刺激因子
D. 氧浓度大于 30% 易引起氧中毒
E. 高浓度氧疗容易使病人呼吸兴奋
30. 典型支气管哮喘发作时,最主要的临床表现是 ()
A. 伴有哮鸣音的吸气性呼吸困难及双肺哮鸣音
B. 伴有哮鸣音的呼气性呼吸困难及双肺哮鸣音
C. 伴有哮鸣音的混合性呼吸困难及双肺干湿啰音
D. 伴有哮鸣音的混合性呼吸困难及双肺哮鸣音
E. 伴有哮鸣音的呼气性呼吸困难及双肺干湿啰音
31. 治疗慢性反复发作的支气管哮喘,下列哪项不正确 ()
A. 避免接触过敏源 B. 脱敏疗法 C. 糖皮质激素雾化吸入
D. 注射长效糖皮质激素 E. 色甘酸钠吸入
32. 哮喘发作时应用肾上腺能兴奋剂,下列哪种药物最适宜 ()
A. 异丙肾上腺素 B. 麻黄素 C. 去甲肾上腺素
D. 沙丁胺醇 E. 肾上腺素
33. 预防哮喘发作,应首选哪种药物 ()
A. 酮替芬 B. 色甘酸钠 C. 抗生素
D. 吸入糖皮质激素 E. 茶碱控释片
34. 支气管扩张大咯血病人最危险且最常见的并发症是 ()
A. 严重贫血 B. 休克 C. 窒息



- D. 继发感染 E. 肺不张
35. 处理支气管扩张大咯血的重要措施是 ()
- A. 保持呼吸道通畅 B. 输血 C. 抗生素
- D. 镇定剂 E. 止咳药
36. 体位引流的禁忌证是 ()
- A. 痰液粘稠 B. 咳黄色脓痰者 C. 大咯血患者
- D. 频繁咳嗽者 E. 体弱者
37. 干性支气管扩张的唯一症状是 ()
- A. 慢性咳嗽 B. 大量脓痰 C. 咯血
- D. 咳痰与体位变化有关 E. 呼吸困难
38. 下列哪项不是支气管扩张的临床表现 ()
- A. 咳粉红色泡沫痰 B. 慢性咳嗽 C. 大量浓痰
- D. 反复咯血 E. 局限持久存在的湿性啰音
39. 支气管扩张患者在施行体位引流时,错误的护理是 ()
- A. 引流在晚间睡前进行 B. 根据病变部位选择体位
- C. 引流鼓励病人深呼吸 D. 引流时间每次 30 分钟以上
- E. 引流完毕后给予漱口
40. 护理支气管扩张病人最重要的措施为 ()
- A. 促进排痰 B. 增加营养 C. 增强体质
- D. 预防窒息 E. 保持口腔卫生
41. 对肺炎伴中毒性休克的病人应最先给予下列哪项措施 ()
- A. 应用血管活性药物 B. 纠正酸中毒 C. 补充血容量
- D. 应用糖皮质激素 E. 大剂量敏感抗生素静脉给药
42. 肺炎伴胸痛病人适宜的体位是 ()
- A. 俯卧位 B. 仰卧位 C. 健侧卧位
- D. 患侧卧位 E. 半坐卧位
43. 肺炎链球菌肺炎病人不可能出现的临床表现是 ()
- A. 寒战 B. 高热 C. 胸痛
- D. 气急 E. 咳红棕色胶冻样痰
44. 关于肺炎链球菌肺炎的描述不正确的是 ()
- A. 痰标本革兰染色可看见此菌 B. 正常人带菌率高,发病少
- C. 多为外源性感染 D. 致病力与荚膜有关
- E. 可注射疫苗预防其发病
45. 休克型肺炎患者应采取的体位是 ()
- A. 平卧位 B. 平卧位,头抬高 15° C. 平卧位,头抬高 30°



- D. 平卧位,头抬高 60° E. 头低脚高位
46. 下列哪项不是休克性肺炎的表现 ()
- A. 体温不升 B. 脉压差增大 C. 烦躁不安
- D. 脉搏快而弱 E. 四肢厥冷
47. 观察中毒性肺炎病情变化,最重要的是 ()
- A. 意识状态 B. 体温、热型 C. 脉搏、血压
- D. 呼吸频率及深度 E. 痰的性状
48. 肺炎链球菌肺炎最具有特征性的表现是 ()
- A. 咳铁锈色痰 B. 呼吸困难 C. 咳嗽、胸痛
- D. 寒战、发热 E. 支气管呼吸音
49. 治疗肺炎链球菌肺炎首选的药物为 ()
- A. 头孢霉素 B. 林可霉素 C. 链霉素
- D. 青霉素 E. 氯霉素
50. 治疗肺炎链球菌肺炎,停止抗生素的指标一般是 ()
- A. 体温降至正常后 3 天 B. 体温降至正常后一周
- C. 体温降至正常后两周 D. 症状、体征完全消失
- E. X 线示炎症阴影完全消失
51. 成人肺炎最常见的护理诊断是 ()
- A. 体温过高 B. 心输出量减少 C. 有窒息的危险
- D. 体液过多 E. 有皮肤完整性受损的危险
52. 肺炎链球菌肺炎高热病人降温不宜采用 ()
- A. 温水擦身 B. 酒精擦浴 C. 退热药
- D. 大血管区放置冰袋 E. 多饮水
53. 成人结核病最常见的类型是 ()
- A. 原发性肺结核 B. 血行播散型肺结核 C. 继发性肺结核
- D. 结核性胸膜炎 E. 肺外结核
54. 诊断成人肺结核最可靠的依据是 ()
- A. 血沉增快 B. 胸片有渗出性阴影 C. 结核菌素试验阳性
- D. 痰涂片检查结核素阳性 E. 低热、咳嗽、乏力、盗汗
55. 引起肺结核最主要的传播途径是 ()
- A. 肺结核病人使用过的注射器 B. 带菌的飞沫通过呼吸道侵入
- C. 经泌尿道侵入人体 D. 与肺结核病人同时进餐
- E. 引用消毒不彻底的牛奶
56. 结核菌素试验结果(++)是指 48~72 小时观察结果,局部硬结直径达 ()