

最新中药材手册

主编 杨森 刘东义



配合最新版药典

ZUIXIN
ZHONGYAOCAI
SHOUCE



军事医学科学出版社

萬葉集



万葉集

最新中药材手册

主 编 杨 森 刘东义 杭传珍

副主编 杨明慧 焦福民 刘 斌
杨桂芳 孟淑芹 霍怀可

编 委 王学刚 杨拥军 刘鲁西
魏绪华

军事医学科学出版社
· 北京 ·

图书在版编目(CIP)数据

最新中药材手册/杨森,刘东义,杭传珍主编.

-北京:军事医学科学出版社,2010.1

ISBN 978 - 7 - 80245 - 423 - 1

I . 最… II . ①杨… ②刘… ③杭… III . 中药材

- 手册 IV . R282 - 62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 242578 号

出 版:军事医学科学出版社

地 址:北京市海淀区太平路 27 号

邮 编:100850

联系电话:发行部:(010)66931051,66931049,63827166

编辑部:(010)66931127,66931039,66931038
86702759,86703183

传 真:(010)63801284

网 址:<http://www.mmsp.cn>

印 装:北京市顺义兴华印刷厂

发 行:新华书店

开 本: 850mm×1168mm 1/32

印 张: 14.25

字 数: 507 千字

版 次: 2010 年 1 月第 1 版

印 次: 2010 年 1 月第 1 次

定 价: 28.00 元

本社图书凡缺、损、倒、脱页者,本社发行部负责调换

目 录

| | | | |
|-------------------------|--------|---|--------|
| 第一章 根及根茎类 | (1) | 水菖蒲 | (32) |
| 柴胡 | (1) | 白术 | (32) |
| 人参(附:皮尾参、参须) | (2) | 白芍 | (34) |
| 大黄 | (5) | 白芨 | (35) |
| 大戟 | (7) | 白芷 | (35) |
| 山豆根 | (8) | 白蔹 | (36) |
| 山药 | (9) | 白前 | (37) |
| 山奈 | (10) | 白薇 | (37) |
| 山慈姑 | (10) | 白茅根 | (38) |
| 川贝母(平贝、新疆贝) | (11) | 白药子 | (39) |
| 川芎(附:茶芎) | (13) | 白头翁 | (39) |
| 川牛膝(附:麻牛膝) | (14) | 白附子 | (40) |
| 川乌 | (14) | 甘草 | (41) |
| 土茯苓(附:菝葜) | (16) | 甘遂 | (42) |
| 千年健 | (17) | 甘松 | (43) |
| 三七 | (17) | 北沙参 | (44) |
| 三棱 | (18) | 仙茅 | (44) |
| 万年青根 | (19) | 半夏(姜半夏、法半夏、青半 夏、青盐半夏、竹沥半夏、 水半夏、仙半夏) | (45) |
| 木香 | (19) | 龙胆 | (48) |
| 天麻(附:紫茉莉根) | (21) | 玄参 | (48) |
| 天门冬 | (22) | 玉竹 | (49) |
| 天花粉(附:玉露霜) | (23) | 生姜(淡干姜、炮姜) | (49) |
| 天南星(附:胆星) | (24) | 地榆 | (51) |
| 天葵子 | (25) | 地黄(鲜生地) | (51) |
| 升麻 | (26) | 当归 | (53) |
| 丹参 | (27) | 肉苁蓉 | (54) |
| 巴戟天(附:羊角藤、铁箍散) | (27) | 百部 | (55) |
| 毛冬青 | (29) | 百合 | (56) |
| 片姜黄(附:姜黄) | (29) | 延胡索 | (57) |
| 乌药 | (30) | 防已 | (57) |
| 石菖蒲(附:九节石菖蒲) | (31) | | |

| | | | |
|---------------------|--------|---------|---------|
| 防风 | (58) | 秦艽 | (88) |
| 麦门冬 | (59) | 莪术 | (89) |
| 怀牛膝(附:土牛膝) | (60) | 桔梗 | (89) |
| 赤芍 | (61) | 党参 | (90) |
| 何首乌 | (62) | 射干 | (91) |
| 芦根 | (63) | 徐长卿 | (92) |
| 苍术 | (63) | 高良姜 | (92) |
| 远志 | (65) | 浙贝母 | (93) |
| 附子 | (65) | 珠儿参 | (94) |
| 阿尔泰银莲花根(附:竹节香 附) | (67) | 狼毒 | (95) |
| 羌活 | (68) | 拳参 | (96) |
| 青木香 | (69) | 贯众 | (96) |
| 苦参 | (70) | 黄芪 | (97) |
| 板蓝根 | (70) | 黄芩 | (98) |
| 知母 | (71) | 黄连 | (100) |
| 狗脊 | (72) | 黄精 | (101) |
| 明党参(粉沙参) | (73) | 黄药子 | (102) |
| 虎杖 | (73) | 商陆 | (102) |
| 泽泻 | (74) | 常山 | (103) |
| 金果榄 | (75) | 银柴胡 | (104) |
| 金荞麦 | (76) | 续断 | (105) |
| 苎麻根 | (76) | 雪上一枝蒿 | (105) |
| 郁金 | (77) | 猫爪草 | (106) |
| 茜草 | (78) | 紫菀 | (107) |
| 重楼 | (79) | 紫草 | (107) |
| 草乌 | (80) | 葛根 | (108) |
| 南沙参 | (80) | 锁阳 | (109) |
| 胡黄连 | (81) | 萆薢 | (110) |
| 威灵仙 | (82) | 墓头回 | (110) |
| 香附 | (83) | 漏芦 | (111) |
| 前胡 | (84) | 薤白 | (112) |
| 独活 | (85) | 藕节 | (113) |
| 骨碎补 | (86) | 藜芦 | (113) |
| 孩儿参(附:童参) | (87) | 第二章 藤木类 | (115) |

| | | | |
|----------------|-------|----------------|-------|
| 木通 | (115) | 地骨皮 | (141) |
| 白英 | (116) | 合欢皮 | (141) |
| 红藤 | (117) | 肉桂 | (142) |
| 竹茹 | (117) | 杜仲(附:杜仲叶) | (143) |
| 西河柳 | (118) | 牡丹皮 | (144) |
| 寻骨风(附:寻骨风根) | (118) | 连翘 | (145) |
| 鸡血藤 | (119) | 陈棕 | (146) |
| 鸡矢藤 | (120) | 苦棟皮 | (146) |
| 沉香(附:伽喃香) | (121) | 厚朴(附:厚朴花) | (147) |
| 紫苏梗(附:苏叶) | (122) | 桑白皮(附:桑叶、桑椹子) | (149) |
| 苏木 | (123) | 秦皮 | (150) |
| 忍冬藤 | (123) | 钻地风 | (151) |
| 皂角刺(附:皂莢、皂莢子) | (124) | 海桐皮 | (151) |
| 青风藤 | (125) | 黄柏 | (152) |
| 油松节 | (126) | 紫荆皮 | (153) |
| 首乌藤 | (126) | 椿根皮(附:凤眼草) | (154) |
| 鬼箭羽 | (127) | 橘皮 | (155) |
| 络石藤(附:薜荔) | (127) | 橘红(附:橘白、化橘红) | (156) |
| 钩藤 | (128) | 橘络 | (156) |
| 降香 | (129) | 第四章 全草类 | (158) |
| 桑枝 | (129) | 广藿香(杜藿香) | (158) |
| 桑寄生 | (130) | 大蓟草(附:大蓟根) | (159) |
| 桂枝 | (131) | 小蓟 | (159) |
| 通草(附:梗通草) | (132) | 马齿苋 | (160) |
| 海风藤 | (133) | 马鞭草 | (160) |
| 麻黄(附:麻黄根) | (133) | 千里光 | (161) |
| 接骨木(附:陆英) | (134) | 木贼草(附:问荆) | (162) |
| 檀香 | (135) | 凤尾草 | (162) |
| 第三章 皮壳类 | (137) | 水蜈蚣 | (163) |
| 土荆皮 | (137) | 半枝莲 | (163) |
| 大腹皮 | (137) | 半边莲 | (164) |
| 五加皮(附:杠柳皮) | (138) | 白毛夏枯草 | (165) |
| 白鲜皮 | (139) | 白花蛇舌草 | (165) |
| 石榴皮 | (139) | 仙鹤草 | (166) |
| 冬瓜皮 | (140) | 龙葵 | (166) |

| | | | |
|--------------|-------|---------------------|-------|
| 石见穿 | (167) | 蛇莓(附:蛇含草) | (191) |
| 石斛 | (167) | 紫花地丁 | (192) |
| 田基黄 | (170) | 景天三七(附:景天) | (193) |
| 灯心草(灯心炭) | (170) | 葎草 | (193) |
| 刘寄奴 | (171) | 萹蓄 | (194) |
| 老鹳草 | (172) | 鹅不食草 | (194) |
| 地锦草 | (173) | 蒲公英 | (195) |
| 金钱黄 | (173) | 鼠曲草 | (196) |
| 伸筋草 | (174) | 豨莶草 | (196) |
| 谷精草 | (175) | 墨旱莲(附:红旱莲) | (197) |
| 青蒿(附:牡蒿) | (175) | 薄荷 | (198) |
| 垂盆草 | (176) | 爵床 | (198) |
| 败酱草(附:蕲黄) | (177) | 瞿麦 | (199) |
| 鱼腥草 | (178) | 第五章 叶类 | (201) |
| 泽兰 | (178) | 大青叶 | (201) |
| 佩兰(附:草木樨、罗勒) | (179) | 艾叶 | (201) |
| 细辛(附:马辛) | (180) | 四季青 | (202) |
| 连钱草 | (181) | 石韦 | (203) |
| 松萝 | (182) | 苏铁树叶 | (203) |
| 穿心莲 | (182) | 苦丁茶 | (204) |
| 荆芥 | (183) | 枇杷叶 | (204) |
| 挂金灯(附:苦鼓藤) | (183) | 侧柏叶 | (205) |
| 香薷 | (184) | 罗布麻叶 | (205) |
| 茵陈 | (185) | 枸骨叶(附:十大功劳叶) | (206) |
| 荔枝草 | (185) | 荷叶(附:荷梗、荷蒂、荷花 瓣) | (207) |
| 鬼针草 | (186) | 臭梧桐叶(附:臭梧桐花) | (207) |
| 狼把草 | (186) | 淡竹叶 | (208) |
| 浮萍草 | (187) | 甜茶叶 | (209) |
| 益母草 | (187) | 番泻叶 | (209) |
| 铁苋菜 | (188) | 紫珠叶 | (210) |
| 透骨草 | (188) | 橘叶 | (211) |
| 积雪草 | (189) | 第六章 花类 | (212) |
| 鹿衔草 | (190) | 夏枯草 | (212) |
| 黄毛耳草 | (190) | 一枝黄花 | (212) |
| 淫羊藿 | (191) | | |

| | | | |
|-------------------|-------|------------------|-------|
| 丁香(附:母丁香) | (213) | 八角茴香..... | (235) |
| 山茶花 | (214) | 刀豆..... | (235) |
| 月季花 | (214) | 山楂..... | (236) |
| 木芙蓉花(附:芙蓉叶) | (215) | 山茱萸..... | (237) |
| 白槿花 | (215) | 马兜铃..... | (237) |
| 白残花 | (216) | 马钱子..... | (238) |
| 白菊花(黄菊花) | (216) | 大胡麻..... | (239) |
| 玉米须 | (217) | 巴豆(巴壳) | (239) |
| 红花(附:白萍子) | (218) | 牛蒡子..... | (240) |
| 合欢花 | (218) | 小茴香..... | (241) |
| 芫花 | (219) | 千金子..... | (241) |
| 鸡冠花 | (220) | 川楝子..... | (242) |
| 辛夷 | (220) | 女贞子..... | (243) |
| 金银花 | (221) | 木瓜..... | (243) |
| 玫瑰花 | (222) | 木蝴蝶..... | (245) |
| 松花粉(附:松针) | (222) | 乌梅..... | (245) |
| 茅针花 | (223) | 火麻仁..... | (246) |
| 闹羊花(附:六轴子) | (223) | 王不留行..... | (247) |
| 洋金花 | (224) | 天仙子..... | (247) |
| 扁豆花 | (225) | 车前子..... | (248) |
| 玳玳花 | (226) | 五味子..... | (249) |
| 芥菜花 | (226) | 五倍子..... | (250) |
| 凌霄花 | (227) | 白果(附:银杏叶) | (250) |
| 密蒙花 | (227) | 丝瓜络..... | (252) |
| 绿萼梅(附:红梅花) | (228) | 瓜蒌(瓜蒌皮) | (252) |
| 旋覆花(附:旋覆草) | (228) | 瓜蒌仁(附:蒌仁霜) | (253) |
| 野菊花 | (229) | 白扁豆(附:扁豆衣) | (254) |
| 蜡梅花 | (230) | 白蒺藜 | (255) |
| 葛花 | (230) | 白芥子 | (256) |
| 紫花杜鹃 | (231) | 冬瓜子 | (257) |
| 款冬花 | (231) | 冬葵子(附:苘麻子) | (257) |
| 蒲黄 | (232) | 肉豆蔻(附:肉果花) | (258) |
| 槐花 | (233) | 红豆蔻 | (259) |
| 藏红花 | (233) | 地肤子 | (259) |
| 第七章 果仁、种子类 | (235) | 决明子 | (260) |

| | | | |
|--------------------|-------|---------------------------|-------|
| 佛手柑(附:佛手花) | (261) | 鸦胆子 | (287) |
| 豆蔻 | (262) | 茺蔚子 | (288) |
| 沙苑子 | (262) | 荜澄茄 | (288) |
| 芡实 | (263) | 萆薢 | (289) |
| 赤小豆 | (264) | 牵牛子 | (290) |
| 谷芽 | (265) | 梔子 | (290) |
| 吴茱萸 | (265) | 柏子仁 | (292) |
| 诃子(附:藏青果、青果) | (266) | 桃仁 | (292) |
| 补骨脂 | (267) | 益智仁 | (293) |
| 花椒(附:椒目) | (268) | 莱菔子 | (294) |
| 苏罗子 | (269) | 莲子(附:石莲子、莲须、莲房、苦石莲) | (295) |
| 苍耳子 | (269) | 桂花子 | (296) |
| 豆卷 | (270) | 猪牙皂 | (297) |
| 豆豉 | (271) | 蛇床子 | (297) |
| 没食子 | (272) | 菟丝子 | (298) |
| 青皮 | (273) | 黑芝麻 | (299) |
| 青葙子 | (274) | 紫苏子(附:苏子霜、白苏子) | (300) |
| 苦杏仁(附:甜杏仁) | (274) | 楮实子 | (301) |
| 郁李仁 | (275) | 葶苈子 | (301) |
| 使君子 | (276) | 槐角 | (302) |
| 金樱子 | (277) | 蓖麻子 | (303) |
| 香橼 | (277) | 槟榔 | (304) |
| 枳壳 | (278) | 碧桃干 | (304) |
| 枳实 | (279) | 蔓荆子 | (305) |
| 枳椇子 | (280) | 酸枣仁 | (305) |
| 草果 | (281) | 鹤虱 | (306) |
| 草豆蔻 | (281) | 榧子 | (307) |
| 砂仁(附:砂仁壳) | (282) | 薏苡仁 | (307) |
| 胡椒(黑川、白川) | (283) | 橘核 | (308) |
| 葫芦巴 | (284) | 覆盆子 | (309) |
| 胖大海 | (285) | 第八章 树脂类 | (310) |
| 相思子 | (285) | 儿茶 | (310) |
| 韭菜子 | (286) | 干漆 | (311) |

| | | | |
|--------------------------|-------|----------------|-------|
| 血竭 | (311) | 全蝎 | (337) |
| 安息香 | (312) | 地龙 | (337) |
| 冰片 | (312) | 土鳖虫(附:龙虱) | (338) |
| 苏合香 | (313) | 血余炭 | (340) |
| 没药 | (314) | 守宫 | (340) |
| 阿魏 | (315) | 红娘虫 | (341) |
| 芦荟 | (315) | 牡蛎 | (341) |
| 松香 | (316) | 龟甲(附:龟板胶) | (342) |
| 枫香脂 | (317) | 鸡内金 | (343) |
| 乳香 | (317) | 阿胶 | (344) |
| 琥珀 | (318) | 坎气 | (345) |
| 樟脑 | (319) | 青娘虫 | (346) |
| 藤黄 | (319) | 刺猬皮 | (346) |
| 第九章 菌藻类 | (321) | 狗肾(附:狗宝) | (347) |
| 灵芝 | (321) | 鱼线胶 | (348) |
| 马勃 | (321) | 鱼脑石 | (348) |
| 冬虫夏草 | (322) | 夜明砂 | (349) |
| 昆布 | (323) | 玳瑁 | (350) |
| 茯苓(茯苓皮、连皮苓、赤苓、 茯神、神木) | (324) | 珍珠(附:珍珠母、珍珠层粉) | (350) |
| 海粉 | (325) | 穿山甲 | (352) |
| 海藻 | (326) | 虻虫 | (352) |
| 猪苓 | (326) | 哈士蟆(哈士蟆油) | (353) |
| 雷丸 | (327) | 桑螵蛸 | (354) |
| 第十章 动物类 | (329) | 海螵蛸 | (355) |
| 九香虫 | (329) | 海龙 | (356) |
| 干蟾皮 | (329) | 海马 | (357) |
| 马宝 | (330) | 蛤壳 | (357) |
| 五灵脂 | (331) | 鹿茸(附:鹿胎、鹿筋) | (358) |
| 牛黄(附:人工牛黄) | (332) | 鹿角(附:鹿角胶、鹿角霜) | (360) |
| 水蛭 | (333) | 蛇蜕 | (361) |
| 乌蛇 | (334) | 羚羊角(附:山羊角) | (362) |
| 瓦楞子 | (335) | 斑蝥 | (363) |
| 凤凰衣 | (335) | 紫贝齿 | (364) |
| 石决明 | (336) | 紫河车 | (365) |
| | | 紫草茸 | (366) |

| | | | |
|-----------|-------|-------------|-------|
| 猴枣 | (366) | 钟乳石(滴乳石) | (394) |
| 蛤蚧 | (367) | 蛇含石 | (394) |
| 犀角(附:水牛角) | (367) | 海浮石 | (395) |
| 蜈蚣 | (369) | 硇砂 | (396) |
| 蜂蜜 | (370) | 鹅管石 | (397) |
| 蜂房 | (371) | 雄黄 | (397) |
| 蜣螂虫 | (372) | 硫磺(附:天生黄) | (398) |
| 蝉蜕 | (372) | 寒水石 | (399) |
| 熊胆 | (373) | 紫石英 | (399) |
| 蝼蛄 | (374) | 滑石 | (400) |
| 僵蚕 | (374) | 磁石 | (400) |
| 蕲蛇(金钱白花蛇) | (375) | 雌黄 | (401) |
| 蟋蟀 | (376) | 赭石 | (401) |
| 蟾酥 | (377) | 礞石 | (402) |
| 麝香 | (378) | 第十二章 其他类 | (404) |
| 鳖甲(附:鳖甲胶) | (379) | 人中白 | (404) |
| 第十一章 矿石类 | (381) | 人中黄 | (404) |
| 云母石 | (381) | 天竺黄 | (405) |
| 白矾 | (381) | 升药(附:升药底) | (406) |
| 石膏 | (382) | 六曲 | (407) |
| 玄精石 | (383) | 半夏曲 | (407) |
| 龙骨(附:龙齿) | (383) | 东丹 | (408) |
| 自然铜 | (384) | 白降丹 | (409) |
| 朱砂 | (385) | 竹沥 | (410) |
| 阳起石 | (386) | 百草霜 | (410) |
| 芒硝(玄明粉) | (386) | 西瓜霜 | (411) |
| 西月石 | (388) | 青黛 | (411) |
| 花蕊石 | (388) | 柿霜饼 | (412) |
| 赤石脂 | (389) | 秋石 | (412) |
| 针砂 | (389) | 海金沙(附:海金沙藤) | (413) |
| 皂矾 | (390) | 烟胶 | (414) |
| 炉甘石 | (390) | 轻粉 | (414) |
| 空青 | (392) | 硝石 | (415) |
| 砒石 | (392) | 密陀僧 | (416) |
| 禹粮石 | (393) | 霞天曲(附:霞天胶) | (416) |

附录 常见中药知识

| | | | | | | |
|-----|-------------------|-------|-----|-----------------|-------|-------|
| 附录一 | 中药的起源及 简史 | (418) | 第五节 | 其他制法 | | (434) |
| 附录二 | 中药材的命名 | (421) | 第六节 | 炮制辅料及用量 | | (435) |
| 附录三 | 中药材的采集 加工 | (422) | 第七节 | 注意事项 | | (435) |
| 附录四 | 中药材鉴别的意义 和内容 | (424) | 附录六 | 中药材的贮藏和 保管 | | (437) |
| 附录五 | 中药材加工炮制的 作用和方法 | (426) | 第一节 | 中药材保管基本 知识 | | (437) |
| 第一节 | 水制法 | (427) | 第二节 | 中药材的保管和养 护方法 | | (438) |
| 第二节 | 火制法 | (429) | 附录七 | 中药的性能与 应用 | | (441) |
| 第三节 | 净杂切碎法 | (432) | 第一节 | 中药的性能 | | (441) |
| 第四节 | 水火合制法 | (433) | 第二节 | 中药的应用 | | (442) |

第一章 根及根茎类

根及根茎类药材，一般是指植物生长在地下的部分。根类药材有圆柱形根，如黄芪、甘草等；纺锤形根，如天冬、麦冬等；圆锥形根，如白芷、玄参等；块状根，如何首乌、金果榄等。根茎类药材有根茎，如玉竹、黄精等；球茎，如山慈姑等；鳞茎，如百合、贝母等；块茎，如天南星、半夏等，以上统称为根及根茎类。

柴 胡

【来源】 为伞形科植物北柴胡或狭叶柴胡或同属数种植物的干燥根。

【别名】 北柴胡、南柴胡、春柴胡。



【产地】 北柴胡产于辽宁、甘肃、河北、河南等地；南柴胡产于湖北、江苏、四川等地。

【采收加工】 在春季采挖其嫩株，挖起晒干，称“春柴胡”；夏、秋之间采挖者称“秋柴胡”。

【药材鉴别】

1. 北柴胡：又名硬柴胡。根呈圆锥形，主根顺直或稍弯曲，下部有分枝，根头膨大，呈疙瘩状，长6~20厘米。

米。直径0.06~1.5厘米，外皮灰褐色或紫棕色，有纵皱纹及支根痕，顶部有细毛或坚硬的残茎。本品特征：质较坚韧，不易折断，断面木质纤维性，黄白色。气微香，味微苦、辛。

2. 南柴胡：又名软柴胡、香柴胡。外形与北柴胡相似，唯根较细，分枝少，多弯曲不直，长4~10厘米，直径0.6~1厘米，表面淡棕色，有纵皱及须根痕，顶部无疙瘩头，而有地上茎叶枯死后遗留的毛状纤维。本品特征：根皮层树脂管较多，木质部导管排列略呈环状，木纤维较少，质稍软，易折断，断面平坦，呈淡棕色。气微香，味微苦、辛。

以上均以根条粗壮、皮细、叶少、无梗者为质佳；根松、叶多、梗多者为质次。商品分为：辽宁、河北、甘肃北柴胡统装，江苏、湖北南柴胡把统装等规格。

【炮制】 将原药拣去杂质、枝梗、枯叶，将根折下。取柴胡根用水洗净泥屑，即捞起，待润软切0.2~0.25厘米顶头片晒干。取叶抢水洗净，待水沥干，及时切0.3~0.4厘米段片，晒干。分开润切后，晒干合并和匀，一起收藏备用。

醋炒柴胡：取柴胡片，用米醋拌匀，稍闷，置锅内用文火炒至略见焦斑时，取出，摊开晾干收藏。

每100公斤柴胡，用米醋10公斤。

鳖血柴胡:取柴胡片,用鳖血和黄酒少许稀释后,倒入柴胡盆内拌匀,稍闷,入锅内用文火炒干。取出,摊晾收藏。

每1公斤柴胡,用鳖血100克、黄酒150克和匀稀释拌炒之。

【炮制作用】使药洁净,便于入药。醋炒则增强舒肝止痛作用;鳖血炒治久疟。

【性味】苦,微寒。

【功能主治】和解表里,疏肝,升阳。治寒热往来,头痛目眩,胸满胁痛,中气下陷,脱肛,子宫下垂,妇女月经不调,久疟。

【用法与用量】煎服2~6克。

【处方应付】写柴胡、春柴胡、软柴胡均付柴胡;写醋炒付醋炒柴胡;写鳖血拌炒付鳖血炒柴胡。

【保管贮藏】晒干放缸甏内盖好,置干燥处,防霉蛀。

【注意事项】春柴胡必须抢水洗切,最好柴与胡分开饮润切片,以保持药效不受影响。

附注:根据历代对本品的药用部分和现代的动物实验的研究,柴胡的有效部分在根部,为了提高药效,在加工切制时,应以根部入药为佳。

人参(附:皮尾参、参须)

【来源】为五加科植物人参的干燥根及根茎。

【别名】野山参、移山参、红参、边条红参、白糖参、全须白参、生晒参、白干参、掐皮参、大力参、朝鲜红参、朝鮮白参。

【产地】野山参、移山参产于吉林长白山等地;园参类产于辽宁和吉林抚松等地;朝鲜参产于朝鲜。

【采收加工】野山参在9月间采挖其地下根的全株,防止折断须根及分枝,洗净泥土,除去茎叶即得“野山参水子”。园参在9~10月间采挖其生长6年以上的家种人参的地下根茎全株,防止折断须根及分枝,洗净泥土,除去茎叶,即得“园参水子”或移山培植的“移山参水子”。

加工方法分为四种:

(1)白参类:取野山参水子、移山参水子或园参水子,洗刷去表面粗皮,在稀糖水中略浸润后炕干,即得野山参、移山参、全须白参、白人参、掐皮参等商品。

(2)生晒参类:取野山参水子、移山参水子或园参水子,洗净不润糖水,直接晒干或炕干,即得野山生晒参、移山生晒参、生晒参、白干参、皮尾参等商品。

(3)糖参类:取野山参水子、移山参水子或园参水子,洗净,沸水中浸泡50分钟,捞出入凉水中浸10分钟,取出晒至七至八成干时,用硫磺熏过1次。再用大号针沿参体平行及垂直的方向扎小孔,然后浸入浓糖汁中(每100毫升水溶液中加冰糖135克)24小时。取出曝晒1天,再用湿毛巾打潮,使其软化,进行第二次扎孔,再浸入浓糖汁中24小时。取出后,冲去浮糖,晒干或烘干,即得野山糖人参、移山糖人参、白糖参等商品。

(4) 红参类: 取带须园参水子、剪枝园参水子、园参须水子或断芦断枝园参水子, 洗刷干净, 置蒸笼内蒸 2~3 小时, 至参体呈明黄色, 皮呈半透明状为度, 取出晒干或烘干; 或与酒润透, 置蒸笼内蒸至半透明状为度, 取出晒干或烘干, 即得全须红参、红参、边条红参、红参断(别断)、红参须等商品。取园参水子带芦断(除去支根及须根), 投入沸水中煮 10 分钟后取出, 晒干或烘干即得大力参。

【药材鉴别】 野山参与园参的鉴别:

1. 野山参: 根状茎上部四面密生芦碗, 下部具有较长的或略弯的圆芦, 习称“雁脖芦”, 主根上端有细密而深陷的螺旋纹, 人参的年限越久, 螺旋纹越深, 中部和下部一般光而少皱纹, 须根粗细均匀稀疏而长, 不易折断, 软如皮条状, 习称“皮条须”。须根有较多的疣状点, 习称“珍珠点”。商品分为: 1~9 个等级。

2. 移山参: 体形略同野山参, 但是根下部比野山参肥大, 螺旋纹粗而浅, 常延续到主根中部, 须根略软而珍珠点较少, 细根与根须常用线扎成鼠尾状。加工方法同野山参, 功同野山参, 而作用较弱, 价稍低。商品分为: 1~3 个等级。

3. 园参: 人工培植的家种人参, 称“园参”, 根状茎上部只有一面或二面生有芦碗, 芦粗且无圆芦, 主根身长, 上端有粗横纹, 不呈螺旋状, 体周均有横纹, 须根形似扫帚、短而脆、易折断, 须根上的疣状点(珍珠点)小而

极少。

园参的成品品种较多, 以加工不同而定名, 区别如下:

(1) 红参: 长 8~18 厘米, 直径 0.7~0.8 厘米。表面棕红色, 半透明, 有大纵皱纹, 环纹不明显, 有支根痕, 根茎上部土黄色, 顶部有碗状茎痕, 即称芦碗, 一般芦碗 5~6 个, 习称“油盏头”。本品特征: 质坚、体重且脆, 顶端芦碗正, 茎粗且短, 断面平坦, 角质状, 中心有浅棕色的圆心, 分枝 3~4 条。气香, 味微苦。商品分为: 2 支、3 支、4 支、5 支、小抄等 5 个等级。

(2) 边条红参: 外形略同红参, 不同点: 主根短, 支根较长, 身长径圆分枝少, 一般 1~2 条分枝, 芦碗不正略小, 一般碗状茎痕 4~5 个。商品分为: 16 支、25 支、35 支、45 支、55 支、80 支、小货等 7 个等级。

(3) 白糖参: 长 6~15 厘米, 直径 0.2~2 厘米。表面淡黄色, 上部有较多的断续环纹, 体周有表皮剥落及细根痕迹。本品特征: 质重而脆, 茎细, 体周明显见到糖的结晶状物, 断面平坦, 有糖质状粉性, 黄白色, 中心有放射纹。气香, 味甜而微苦。商品分为: 1~4 个等级。

(4) 全须白人参: 长 10~20 厘米, 表面黄白色, 体形略同野山参, 但多为顺直体, 芦略长于红参, 须根分散, 短而特别脆。本品特征: 质脆体实, 芦碗细长, 断面白色, 有放射状花纹, 分枝顺直。气香, 味甘而苦。商品分为: 1~5 个等级。

(5) 生晒参: 长 10~15 厘米, 表

面土黄色，横纹及纵皱纹呈棕黄色，一般分带须和不带须两种，不带须的细枝根均除去，仅有枝根痕，呈带芦断状；带须者，顶部有芦碗，下部有支根及须根，习称“全须生晒参”。本品特征：质松，体粗而芦茎略细，表皮纵纹深而环纹浅，断面平坦，色白，有放射性裂隙。气香，味苦。商品分为：1~5个等级。

(6)白干参：长5~10厘米，表面淡黄色或黄白色，表皮、支根均除去，体表有支根痕，横纹亦不明显。本品特征：外形略同生晒参，但表皮除去，皮色比生晒参淡，质实而略重，无须根及枝根。断面色白，有放射花纹，呈带芦断状。商品分为：1~4个等级。

(7)掐皮参：长10~18厘米，直径1~1.5厘米。掐皮（用骨制片状物，将参体表面刺成小凹点），表面淡黄色，上端环纹不明显，支根和须根浅棕色，用线扎成鼠尾状。本品特征：外形略同移山参，质实而脆，断面白色，有放射状花纹。气香，味甘微苦。商品分为：1~3个等级。

(8)大力参：表面淡棕黄色，略带半透明状，有明显纵皱纹，上端有棕色横纹。本品特征：外形似红参，芦细，体粗而短，质硬而脆，断面平坦，角质状。气香，味苦。商品分为：1~4个等级。

以上商品人参均以身长、质坚、体重、条粗、浆足、纹细、芦长、碗密、珍珠点多者为佳。红参以身长、质坚、体重、条粗、芦粗者为佳；以皮瘦、芦细短、纹粗浅、珍珠点少、糖重者

质次。

4. 朝鲜参：产于朝鲜，又名别直参、高丽参、朝鲜人参。商品分为朝鲜红参和朝鲜白参，以朝鲜红参为胜。

(1) 朝鲜红参：长10~18厘米，直径1~2厘米。生有双马蹄芦与肩齐，习称“粗茎”。表面红棕色，有顺纹，上部棕黄色（显黄衣），体周有明显纵棱纹，分枝粗略弯而交叉。本品特征：质坚而重，粗茎芦短，上部显黄衣，断面角质光亮，有菊花纹。气香浓，味甘微苦。以质坚、体重、茎粗、红棕色、纵棱纹明显、气香浓者为佳。商品分为：天字10~80片、地字10~80片、人字10~80片、翁字40~80片等规格。

(2) 朝鲜白参：体呈圆柱形，短而粗，略有分枝，无须根，有细根残痕，表面黄白色，有浅棕色细纹，质松，断面有圆心。气微香，味甘微酸。以黄白色、质重、纵棱纹明显、气香者为佳。商品分为：15片、20片、30片、50片、80片、120片、140片、160片等规格，每个片级又分1~3个等级，以及小片、大尾、中尾、皮尾等几个等级。

【炮制】 红参、白参服用时，应先去芦，烘软或喷水润软，切0.1~0.15厘米薄片，晾干。糖参类可用冲筒打碎，或研末备用。

【炮制作用】 切片或研末后，使有效成分易煎出。

【性味】 野山参、移山参、白参、糖参、生晒参、白干参、朝鲜白参、白参须（以下简称白参类），甘、微苦，平；朝鲜红参、红参、边条红参、大力参、红参