



把医疗卫生
工作的重点放到
农村去。

毛泽东

忠

广东中兽医常用草药

第一辑

广东农业科学院 华南农学院
中国科学院华南植物研究所 中南林学院 编

广东中兽医常用草药

(内部参攷)

· 第一辑 ·

广东省农业科学院 华南植物研究所
华南农学院 中南林学院

合 编

广东省农业科学院
广东省科学技术协会 出版

一九六八年十月·广州

前 言

伟大领袖毛主席教导我们说：“我们应该走到群众中间去，向群众学习，把他们的经验综合起来，成为更好的有道理的道理和办法，然后再告诉群众（宣传）；并号召群众实行起来，解决群众的问题，使群众得到解放和幸福”。我省广大贫下中农及中兽医工作者，千百年来掌握草药对家畜疾病进行斗争，积累了丰富的经验，解放后，在毛泽东思想的光辉照耀下，中兽医工作得到很大的发展。我们遵照毛主席“从群众中来，到群众中去”的教导，从一九六〇年以来，对我省六十多个县的中兽医的经验进行调查总结，但一直受到陈规旧律的限制。在史无前例的无产阶级文化大革命中，广大革命群众高举毛泽东思想伟大红旗，狠批刘少奇的反革命修正主义路线，踢开了资产阶级的“专家”“权威”的束缚，使这本书得到了新生，与广大革命群众见面，及时地推广交流群众的宝贵经验，更好地为无产阶级政治服务。这是毛泽东思想的伟大胜利，是无产阶级文化大革命的丰硕成果。

由于我们学习毛泽东思想不够，对中兽医经验领会不深，编写中虽一再修改，错误之处在所难免，敬希广大读者批评指正。

编 者

一九六八年十月一日

凡 例

一、本书共收载广东中兽医草药 104 科 345 种分二辑出版，由于草药按疗效分类目前尚有困难，故暂依植物系统排列，以便分析比较各该药物来源、形态、成分及功效等各方面的联系。

二、本书蕨类植物和种子植物各科的排列顺序采用“海南植物志”（1964）所用的分类系统。

三、本书各种草药分述如下各项：

名称：系指每种草药的正名，命名方法如下：

1. 该药已收入历代本草者，尽可能采用最流行的本草命名。

2. 本草未收或本草已收而命名过僻者，一般按广东通称的地方名或原有的广东草药书用名而命名。

3. 本草未收亦无广东通称地方名及广东草药书用名，一般采取较为妥贴的各县地方名命名，如果各县地方名不够妥贴，则依种子植物名称命名，但种子植物名称命名不适用者（如福氏星蕨、福氏紫苑等），必要时另拟新名。

别名：包括有关名称及各县通称的土名。每个别名均注明出处。

学名：采用国际公认的拉丁名称。

形态：根据标本，依植物学方法加以描述，每种草药均附有一图，以资鉴识，便于采集。

分布及生长环境：指出主要分布地区及生长环境，以便

采集及提供栽培的需要。

采集季节：指出每年最适宜的采取季节。

药用部分：指出每种草药的药用部分，如：根、茎、叶、花、果或树皮等等；但广东中兽医对各种草药使用比较节省，某些植物泡制为熟药时仅用一部分，而中兽医往往并用全株。

性味：每种草药按四气五味记录，并多采谈涩二味，凡草药已收入历代本草者，一般按本草记载，但本草未收或本草已收而不切合实际者，以中兽医公认的为主。如中兽医意见有出入，则由编者尝味后而定取舍。

归经：凡本草已收的草药，一般按古籍记载，本草未收者以中兽医公认者为准，如中兽医意见有出入，则由编者按各该药味、形态、色泽、功用来衡量应入何经。

功效：记述各种草药的作用及其主治疾病。主要材料由中兽医介绍，并参考历代本草，广东原有草药书籍及现在一些药物志作为补充。所用病名，一般采用普通中兽医用名，但西兽医病名，如：出血性败血病、猪丹毒、炭疽、牛瘟、猪瘟等，目前也为中兽医所常谈。故本书也一并采用。

用量：指该草药鲜药的用量，广东中兽医专以治牛为传统，解放后才着手研究治猪；因此本项只载牛、猪用量，并以复方中该药所用的剂量为准，如单用一味，可以酌情加重。

附注：本项酌情记载下列各项：

1. 根据现有文献摘录各种草药成份、药理及其主治疾病（指人类疾病），以便西兽医或西医参考。

2. 该草药的特殊用途。

3. 某些草药的同名异物的鉴别方法。

4. 本书植物描写的长度采用公制，但用量仍用市制（以十六两为一斤）。

5. 书末附有、中名（包括正名、别名）索引及疗效索引以便参考。

6. 广东中兽医常用草药繁多，本册未及收载的草药以后陆续编写出版。有关中兽医草药验方正在整理之中，以另编：《广东中兽医诊疗经验》进行介绍。

7. 草药名称不少有四旧色彩，但沿用已久，目前为了避免误用起见，暂时保留，今后应在群众协商基础上予以纠正。

第一輯 目 录

石松科.....	2	地耳蕨.....	26
石子藤.....	2	水龙骨科.....	28
铺地蜈蚣.....	4	大星蕨.....	28
木贼科.....	6	崖姜.....	30
纤枝木贼.....	6	石韦.....	32
海金砂科.....	8	松科.....	34
海金砂.....	8	松.....	34
陵齿蕨科.....	10	杉科.....	36
乌韭.....	10	杉.....	36
骨碎补科.....	12	柏科.....	38
石黄皮.....	12	桧.....	38
凤尾蕨科.....	14	买麻藤科.....	40
剑叶凤尾蕨.....	14	小叶买麻藤.....	40
凤尾草.....	16	番荔枝科.....	42
半边旗.....	18	鸡爪树.....	42
铁线蕨科.....	20	紫玉盘.....	44
铁线蕨.....	20	樟科.....	46
金星蕨科.....	22	无根藤.....	46
草鞋青.....	22	阴香.....	48
乌毛蕨科.....	24	樟.....	50
乌毛蕨.....	24	干打捶.....	52
叉蕨科.....	26	乌药.....	54

山苍子.....	56
潺槁树.....	58
豺皮樟.....	60
毛茛科.....	62
威灵仙.....	62
具裂铁线莲.....	64
黄连.....	66
莲.....	68
防己科.....	70
毛木防己.....	70
百解.....	72
黄藤.....	74
粪箕笃.....	76
石蟾蜍.....	78
金果榄.....	80
宽根藤.....	82
马兜铃科.....	84
大叶马兜铃.....	84
猪笼草科.....	86
猪笼草.....	86
胡椒科.....	88
山药.....	88
假药.....	90
三白草科.....	92
鱼腥草.....	92
三白草.....	94

金粟兰科.....	96
九节茶.....	96
白花菜科.....	98
膜叶马槟榔.....	98
堇菜科.....	100
犁头草.....	100
远志科.....	102
金不换.....	102
小远志.....	104
景天科.....	106
裂叶假川连.....	106
落地生根.....	108
佛甲草.....	110
石竹科.....	112
荷莲豆.....	112
粟米草科.....	114
簇米粟米草.....	114
马齿苋科.....	116
马齿苋.....	116
土人參.....	118
蓼科.....	120
竹节蓼.....	120
火炭母.....	122
虎杖.....	124
箭草蓼.....	128
水蓼.....	128

何首乌.....	130
藜科.....	132
藜.....	132
土荆芥.....	134
苋科.....	136
土牛膝.....	136
牛膝.....	138
虾钳菜.....	140
红草.....	142
野苋.....	144
青葙.....	146
鸡冠花.....	148
落葵科.....	150
落葵.....	150
酢浆草科.....	152
五敛子.....	152
红花酢浆草.....	154
酢浆草.....	156
凤仙花科.....	158
水凤仙.....	158
柳叶菜科.....	160
草龙.....	160
水龙.....	162
瑞香科.....	164
土沉香.....	164
了哥王.....	166

五亚果科.....	168
锡叶藤.....	168
大风子科.....	170
柞木.....	170
怪柳.....	172
西番莲科.....	174
龙珠果.....	174
南瓜科.....	176
苦瓜.....	176
木鼈子.....	178
仙人掌科.....	180
仙人掌.....	180
茶科.....	182
岗茶.....	182
小叶两耳桧.....	184
荷树.....	186
桃金娘科.....	188
水翁.....	188
大叶桉.....	190
番石榴.....	192
桃金娘.....	194
蒲桃.....	196
野牡丹科.....	198
红背野海棠.....	198
野牡丹.....	200
地稔.....	202

毛稔.....	204	五月茶.....	244
天香炉.....	206	黑面神.....	246
金丝桃科.....	208	土蜜树.....	248
黄牛木.....	208	丢了棒.....	250
田基黄.....	210	鸡骨香.....	252
山竹子科(藤黄科)...	212	毛果巴豆.....	254
横经席.....	212	火殃筋.....	256
椴树科.....	214	飞扬草.....	258
布渣叶.....	214	乳汁草.....	260
细叶藕头槌.....	216	白饭树.....	262
梧桐科.....	218	毛果算盘子.....	264
山芝麻.....	218	算盘子.....	266
半枫荷.....	220	白背叶.....	268
假频婆.....	222	毛桐.....	270
蛇婆子.....	224	石岩枫.....	272
锦葵科.....	226	红雀珊瑚.....	274
黄葵.....	226	乌蝇翼.....	276
磨盘草.....	228	叶下珠.....	278
扶桑.....	230	蓖麻.....	280
黄花稔.....	232	山乌柏.....	282
白背黄花稔.....	234	乌柏.....	284
地桃花.....	236	龙脷叶.....	286
狗脚迹.....	238	蔷薇科.....	288
大戟科.....	240	枇杷.....	288
红背叶.....	240	梅.....	290
木油树.....	242	桃.....	292

春花.....	294	大叶山马蝗.....	332
月季花.....	296	排钱草.....	334
金樱子.....	298	金钱草.....	336
大叶蛇泡筋.....	300	假木豆.....	338
蛇泡筋.....	302	葫芦茶.....	340
蔷薇莓.....	304	长柄野扁豆.....	342
含羞草科.....	306	圆叶野扁豆.....	344
过江龙.....	306	山葛.....	346
苏木科.....	308	鸡眼草.....	348
龙须藤.....	308	铁扫帚.....	350
南蛇筋.....	310	山鸡血藤.....	352
山扁豆.....	312	印度鸡血藤.....	354
望江南.....	314	鸡血藤.....	356
决明.....	316	牛大力.....	358
蝶形花科.....	318	千斤拔.....	360
毛相思子.....	318	蔓性千斤拔.....	362
鍊荚豆.....	320	粉葛.....	364
花生.....	322	红血藤.....	366
木豆.....	324	灰叶.....	368
猪屎豆.....	326	长穗貓尾草.....	370
毛排钱草.....	328	丁癸草.....	372
娘带归.....	330		

蕨类植物門

石 松 科

1. 石子藤（广州植物志）（图 1）

【别 名】 老虎须（广东西南部）；收鸡草（钦州、高州）；灯笼草（广州）。

【学 名】 *Lycopodium casuarinoides* Spring

【形 态】 多年生草质藤本；茎长 1.5—2 米，径 3—5 毫米，多回二歧分枝，圆筒形，但顶部的茎则呈扁平状；小枝下垂，长约 8—22 厘米，径 1.5—2 毫米，无毛，绿色，嫩茎浅绿色；圆茎上的叶长 3—5 毫米，宽 1 毫米以下，先端呈灰白色，膜质，基部棕褐色，革质；扁茎上的叶长 1—2 毫米，先端尾尖，透明膜质。孢子囊穗两两成对，着生于末回分枝上，圆柱状，长 2.5—7.5 厘米，径 4—5 毫米，浅黄色；孢子叶阔卵形，先端膜质，尾尖，基部腋生孢子囊 1 枚。

【分布及生长环境】 广东各地均有。通常生长在地势较高的地方，攀附在林缘的灌木丛或小乔木上。

【采集季节】 四季。


【药用部分】 全株。

【性 味】 甘，凉。

【归 经】 心、肝。

【功 效】 1. 清热，降火，治各种热症。2. 消肿，止痛，外敷疮疡肿毒。

【用 量】 牛 3—6 两。






图1. 石子藤

1. 植株的一部分; 2. 枝的一部分; 3. 枝的一部分; 4. 孢子囊穗;
5. 6. 孢子囊的孢子叶 (左: 正面, 右: 背面)。

2. 铺地蜈蚣 (广州植物志) (图2)

【别名】猫爪草(徐闻、廉江、海康、遂溪、电白); 偷鸡草(广宁、四会、德庆、封开、怀集); 蛇栏草(琼中、乐东、琼海); 狗仔草(从化、广州); 金牙松(普宁、惠来、陆丰); 猫毛草(五华、清远、罗定); 金猫草(茂名); 奄猫草(高州); 狗仔毛(台山、新会); 蜈蚣草(始兴); 落地蜈蚣(潮安); 山茜(广州)。

【学名】*Lycopodium cernuum* Linn.

【形态】多年生草本; 茎直立、平卧或倾斜, 二歧分枝, 分枝多, 全株呈圆锥状, 长30—80厘米, 间有1米以上的, 径2.5—3.5毫米; 主茎带木质。叶二型: 营养叶绿色而略带浅黄色, 无柄, 线状钻形, 弯曲向上, 长2—7毫米, 宽1毫米以内; 孢子叶三角形, 尾状渐尖, 膜质, 浅黄色, 长1毫米。孢子囊穗着生于小枝顶部, 圆柱形、卵圆形或圆球形, 长3—15毫米; 孢子囊着生于孢子叶的基部。

【分布及生长环境】广东各地山野间均有。喜生于小坑边、山脚、丛林及沟边等处。

【采集季节】四季。

【药用部分】全株。

【性味】甘, 凉。

【归经】肝、肺、心。

【功效】1. 清肝热, 治目赤肿痛。2. 舒筋活络, 消肿, 止痛, 治风湿、跌打、骨折及痈疮。3. 祛痰止咳, 治痰多咳嗽。

【用量】牛4—8两。猪1—2两。




图2. 铺地蜈蚣

1. 植株; 2. 示一个孢子叶穗(放大),

木 賊 科

3. 纤枝木贼（广州石牌植物名录）（图3）

【别名】木贼（广东通称）；土木贼（从化、新会、台山）；木贼草（潮安、徐闻、海康、廉江、遂溪、电白）；驳节草（河源、始兴、兴宁、五华）；笔塔盐（茂名、高州、化州、阳江、阳春）；笔塔草（罗定、新兴）；驳骨草（增城）；田葛（澄迈、琼海）；驳节花、虾公脚、马节草（五华）；作作草（潮阳）。

【学名】*Equisetum debile* Roxb.

【形态】多年生草本；根状茎匍匐，黑褐色，各节生有不定根；地上茎绿色，直立，长40—100厘米，直径3—6毫米，中空有节，节间一般长2—6厘米，易逐节折断，表面具稜11条左右。退化叶膜质，轮生，三角状，长1.5—3毫米，宽1毫米以内，基部合生呈鞘状，长约4—8毫米，包裹茎节上。孢子囊群圆形，黄色，密集轮生茎顶呈密穗状，囊群穗长椭圆形，黑色，长1.3—2.5厘米，径3—4毫米。

【分布及生长环境】广东各地均有。生于水沟边及山上石隙等处。

【采集季节】四季。

【药用部分】全株。

【性味】甘、微苦，平。

【归经】肝、胆、肺。

【功效】1.散风解表，治风热感冒。2.清肝热，治目赤肿痛、目翳、眼眵过多、迎风流泪。3.利小便，除湿