

醫學小叢書

女性衛生

商務印書館叢行

民國二十一年一月二十九日

敝公司突遭國難總務處印刷所編譯所書棧房均被炸燬附設之涵芬樓東方圖書館尙公小學亦遭殃及盡付焚如三十五載之經營墮於一旦迭蒙各界慰問督望速圖恢復詞意懇摯銳感何窮敝館雖處境艱困不敢不勉爲其難因將需用較切各書先行覆印其他各書亦將次第出版惟是圖版裝製不能盡如原式事勢所限想荷鑒原謹布下忱統祈垂賜

上海商務印書館謹啓

# 究必印翻版所有權

中華民國十一年十二月初版  
民國廿一年十一月印行  
國難後第一版

(三二八二)

醫學小叢書  
**女性衛生一冊**

每冊定價大洋參角

外埠酌加運費匯費

編著者  
鄧郭人  
麟曠

發刷行者兼  
商務印書館  
上海河南路

發行所

商務印書館  
上海及各埠

# 女性衛生目錄

## 緒論

第一婦人生殖器之構造 第二女性泌尿器之構造 第三婦人之特異的生理變化

第一編 少女時代之衛生.....五

第一章 幼女時代之衛生.....

第一清潔之注意 第二幼女運動時之注意

第二章 初生幼女之疾病及預防法.....七

第一幼女之眼病及其預防法 Ored<sup>e</sup> 氏預防法 第二陰門炎及其預防法

第三章 少女時代之衛生與將來婦人時代之健康.....九

第一身體之虛弱與不姪症 第二對於將來妊娠分娩時之注意 第三便祕之預防 甲  
便祕原因及其障礙 乙便祕之預防及其療法 第四睡眠之注意

第四章 婦人職業生活之於健康

第一職業生活及於婦人健康之影響 第二少女在校之衛生

第二編 青春時代之衛生

第一章 月經之生理

第一續發性生殖的特徵 第二月經之來潮 甲月經之現象 乙月經初潮之年齡 丙

月經閉止之年齡 丁月經之持續及量 戊月經血之性狀 第三月經時身心之影響

第四子宮粘膜之變化 甲月經前期 乙月經期 丙月經後期 丁間歇期 第五月經

對於排卵之作用

第二章 月經時之攝生

第一初經時之注意 第二月經來潮時之精神攝生 第三月經來潮時運動之注意 第

四月經來潮時之清潔 第五通經藥

第三章 月經之異常

第一月經困難症 甲月經困難之原因及其形態 乙月經困難者之注意 第二無月經

甲鎖陰與無月經 乙一時性無月經與真無月經 丙無月經者之注意 第三月經過

少症及稀有症 第四早期月經 第五晚期月經 第六代償月經 第七月經過多症

第四章 結婚與妊娠之關係.....三四

第一章 正規妊娠之經過.....三五

第二編 家婦時代之衛生.....三六

第一章 正規妊娠之經過.....三六

第一妊娠之定義 第二妊娠各月中胎兒之變化 第三妊娠中母體之變化 甲乳房之  
變化 乙內臟之障礙 丙皮膚之變化 丁精神之變化 戊妊娠婦體位之變化 第四  
生殖器之變化及卵之變化 甲子宮粘膜之變化 乙卵膜 丙胎盤 丁膀帶 戊羊水  
己子宮及其他之變化 第五單胎及複胎

第二章 妊娠中之攝生法.....四六

女性衛生 目錄

第一飲食物之注意 第二便祕之注意 第三運動之注意 第四衣服之注意 第五清潔之注意 第六乳房之注意 第七精神之攝生

第三章 分娩之種類.....五〇

第一定期產及非定期產 甲定期產 乙非定期產 第二流產早產之原因及其預防法  
第四章 正規分娩.....五二

第一胎兒之位置 甲縱位 乙橫位 第二分娩之成立 甲陣痛 乙腹壓 第三正規分娩之經過 甲前驅陣痛 乙分娩開始 丙胎兒之娩出 丁後產期 戊分娩之持續時間 己分娩時之會陰保護法

第五章 分娩之準備.....五八

第一醫師與產婆 第二分娩時必需之器具 第三產室產牀之注意 第四清潔及消毒

第六章 正規產褥.....六〇

第一產褥之定義 第二正規產褥之經過 甲惡寒 乙體溫 丙脈搏 丁尿量 戊惡

露

第七章 產褥期中之發熱.....

六四

第一由生殖器以外之原因而發熱者 甲宿便 乙腎盂炎 丙膀胱炎 丁乳汁蓄積

戊其他內科疾患 第二由生殖器疾病之原因而發熱者 甲輕症 乙中等症

六七

第八章 產褥熱.....

第一產褥熱之原因 第二產褥熱之症狀 甲產褥性腹膜炎 乙產褥性潰瘍性心內膜炎  
丙產褥性膿毒症 丁產褥性敗血症 第三產褥熱之預防及其注意

第九章 產褥期中之攝生及其保護法.....

七二

第一產褥婦之臥位 第二陰部之清潔 第三惡露之注意 第四發汗之注意 第五利尿之注意 第六排便之注意 第七產褥婦之沐浴 第八飲食物之注意 第九授乳之注意

七八

第四編 老年時代之衛生.....

女性衛生 目錄

五

第一章 老年時代身心之變化

七八

第一閉經期之身心變化 第二老年時代與癌腫之關係 第三閉經期之精神變化

第二章 閉經期及老年期之注意

七九

第一脂肪過多症之預防 第二子宮疾患之注意 第三體位之矯正 第四飲食之注意

第五編 婦人科花柳科之疾患及其注意

八一

第一章 子宮及其附屬器之疾患

八二

第一子宮內膜炎與帶下 第二子宮肌腫 第三子宮癌腫 第四卵巢囊腫 (附) 卵巢剔出之影響 第五子宮之位置及移動性之異常 甲子宮垂脫 乙子宮前屈 丙子宮後傾後屈

第二章 婦人梅毒及其注意

九二

第一先天梅毒與流產 第二梅毒之感染徑路 甲先天梅毒之感染徑路 乙後天梅毒之感染徑路 第三梅毒之經過及其病狀 第四梅毒之預防法

第三章 淋病及其注意

九六

第一淋病之原因及其傳染徑路 第二淋病之症狀  
甲淋毒性陰門炎 乙淋毒性陰道炎  
丙淋毒性尿道炎 丁淋毒性膀胱炎 戊淋毒性輸卵管炎  
炎 第三淋病患者之攝生

# 女性衛生

## 緒論

凡女子自出世以至老死。其間之生活現象。變幻曲折。殆如海潮之起伏。實較男子為複雜。此蓋由生殖器之特異構造特異變化有以致之。

### 第一 婦人生殖器之構造

婦人生殖器之構造。可分為內外二部。在骨盆外者。曰外生殖器。在骨盆內者。曰內生殖器。外生殖器由小陰唇、大陰唇、陰核、及前庭膜等部組合而成。內生殖器由陰道、子宮、輸卵管、卵巢等部組合而成。其他尿道、輸尿管、膀胱等。乃婦人生殖器中之附屬器官。泌尿器之一部也。

#### 甲、婦人外生殖器

外生殖器在骨盆出口之前。與泌尿器之終末器相一致。在陰道口與小陰唇之間。有薄膜。即處女膜。

若經一次之分娩。即分裂成爲小片。曰處女膜痕。前庭腺爲陰道口與小陰脣間之小腺。在處女膜之外方。易被淋菌侵犯而發淋病。小陰脣爲皮膚之小皺襞。位於陰道口之兩側。後端終於大陰脣之內側。前端達於陰核之上方。大陰脣爲外陰部左右之皮膚隆起。至春機發動期。則此部陰毛叢生。其前端兩陰脣連合之處。曰前連合。後端曰後連合。其前方有菲薄之橫皺襞。即陰脣繫帶也。陰核爲勃起性之圓形小體。位於小陰脣前端。外包結締組織。與男子之陰莖爲同質異形之物也。

## 乙、婦人內生殖器

一、陰道 陰道在子宮之下方。爲延長性之肌肉器官。前方爲膀胱、尿道。後方爲直腸。前後兩壁。互相接觸。上方爲囊狀。前後有凹陷。即前後陰道穹窿是也。

二、子宮 子宮爲平滑肌之囊狀器官。其形如西洋梨。在小骨盆內。前方爲膀胱。後方爲直腸。兩側爲卵巢、輸卵管。分子宮體、子宮頸、子宮陰道段之三部。體部堅厚。其頂向上隆起。頸部細小。與陰道相連。其卜端有橫裂孔。即子宮外口。子宮陰道段則甚狹小。其橫斷面呈三角形。

三、輸卵管 輸卵管爲管狀之器官。長約八乃至十五厘米。由子宮之角部起。向骨盆壁上行。復折

向下方。至卵巢而終。

四 卵巢 卵巢為扁平卵圓形之腺狀臟器。司產卵及分泌之作用。在少女時為扁平形。至春機發動時。則特別發育。開始排卵。由輸卵管以達於子宮。

## 第二 女性泌尿器之構造

一 尿道 婦女之尿道較男子為短。下方開口於陰道。曰尿道外口。上方開口於膀胱。曰尿道內口。尿道周圍與陰道之結締組織結合。

二 膀胱 膀胱為小骨盆內貯尿之肌肉囊狀物。其上部曰膀胱頂。與尿道內口交界處。曰膀胱頸。中間部曰膀胱體。

三 輸尿管 輸尿管為由腎盂起至膀胱底之粗鬆結締組織所構成之長管。長約二十五厘米。有運動性。專司送尿於膀胱之用。

## 第三 婦人之特異的生理變化。

婦人之特異的生理變化。可分四期。

甲、少女時代

少女時代。爲生後至春機發動期止之時代。即女子十三四歲以前之時代也。女子在此期間之生活現象與男兒無大區別。蓋其生殖器之特殊機能尚未開始故也。

乙、青春時代

青春時代。自月經初潮起至第一次妊娠前之時代。即十三四歲至二十歲左右之時代也。本期間內女子之生活現象較爲複雜。生殖器每月有月經之來潮。卵巢亦開始其排卵機能。而身心上遂發種種之影響矣。

丙、家婦時代。家婦時代。自結婚起至月經閉止期間之時代。即自二十歲左右至四十五六歲之時代也。此期婦人之生活現象愈爲複雜。月經以外。更有妊娠分娩產褥等變化。

丁、老年時代。老年時代。自月經閉止期以至老死之時代。即四十五六歲以後之時代也。此期婦人之生活現象又復簡單。生殖器起退行性萎縮。一切之特異變化均行停止。

綜上所述。女子之生活現象。若以圖線表之。少女時代及老年時代爲直線。青春時代及家婦時代。則

如波紋之曲折。若衛生失當。則諸病易生。今分編論述於次。

## 第一編 少女時代之衛生

### 第一章 幼女時代之衛生

#### 第一 清潔之注意

幼女之陰門，往往因有蟣蟲寄生，而發搔痒。務宜及早醫治。否則日久即成惡疾。此症多由不潔而起。故幼女之外陰部尤宜保持清潔。時行沐浴。又小兒乳房多豐滿。切忌壓搾以免化膿。

#### 第二 幼女運動時之注意

幼女之生殖器。生後無甚變化。至六歲時。子宮卵巢逐漸發育。至月經初潮期。其發育乃最盛。此時衛生。最宜注意。

當月經未來時。男子與女子之衛生。無大區別。至月經已潮。則其衛生方法。大相懸殊。當月經來潮時。最要者。即須禁行劇烈運動。

女子在幼年時代。其運動當與男子有同等之注意。若運動不足。則營養不良。營養不良。則發育不盛。

我國女子通常多運動不足之至。西人拿爾頓氏曰。女子二十一歲至四十歲之間。為其生殖時期。於此時期。有不能生殖者。實多由於少女時代運動缺乏及患重篤疾病之故。誠哉是言也。

少女時代。對於身體各部之營養。能善為注意。則其生殖器之發育。自亦佳良。欲使營養佳良之道。無他。曰注重運動而已。如跳舞、體操、散步、近程旅行等一切運動。當與男子相等。但過於劇烈。則亦有礙。是不可不慎也。

## 第二章 初生幼女之疾病及其預防法

### 第一 幼女之眼病及其預防法

幼女眼病。多為膿漏眼。因母患淋病。小兒出產時。於產道染其病毒而發。故又名淋毒性結膜炎。俗名風眼。其症狀。紅腫多膿。若不加以適當之治療。遂成盲目。凡小兒之盲目者。多由本症而起。欲預防之。用 Crede 氏法。最為有效。

Crede 氏預防法。法於小兒初生時。將全身污物。用清水淨洗。以昇汞棉。拭去眼之不潔物。再用五

十倍硝酸銀溶液點眼。而復洗去之。歐美產科醫院自行本法以來。其原有百分之十八膿漏眼者。竟減至千分之一云。

## 第二 陰門炎及其預防法

外陰部及陰道。易爲淋毒所侵犯。因之發陰門炎者。比比皆是。初生之女嬰尤甚。往往因襁褓處置失宜。淋毒侵入而發本病。或母體有淋毒附着。接觸兒體。遂受其傳染。故母患淋疾時。宜母子離寢。或倩人保護。卽他人之手。亦禁其接觸幼兒陰門。總之。母患淋病。則其小兒之保護。均宜倩人替代。不得已時。亦須將手嚴重消毒。又產母排出之惡露。亦勿使侵及兒體。

此外五六歲幼女之淋疾。多由保姆家族。或乳母之淋疾感染而來。均宜注意。

淋毒性陰門炎。幼兒所患者與成人無異。決不延及子宮附屬器及腹腔等部。本病發生。則陰門糜爛。若其分泌物傳染及眼。卽發淋毒性結膜炎。

凡養育小兒。總以清潔爲第一義。除淋病外。襁褓之不潔。或大便之處置不宜。亦有惹發陰門炎者。故幼兒之衣服襁褓等。均須十分清潔。拭大便時。宜向後抹去。若向前抹。則便中之大腸菌。易於侵入陰