

徐伟祥

刘祥节

编著

胆腸病防治指南

张思麟

上海科学文献出版社

R65
XDX

肛肠疾病防治指南

徐伟祥
刘祥芳

编著

上海科学技术文献出版社



A0065331

(沪)新登字301号

肛肠疾病防治指南

徐伟祥 刘祥节 编著

*

上海科学技术文献出版社出版发行
(上海市武康路2号 邮政编码 200031)

全国新华书店 经销

上海科技文献出版社昆山生产基地印刷

*

开本 787×1092 1/32 印张 7 字数 169,000

1994年8月第1版 1994年8月第1次印刷

印数：1—3,000

ISBN 7-5439-0452-7/R·181

定 价：7.50元

《科技新书目》318—289

内 容 提 要

本书系统、全面地从中医、西医、中西医结合三方面，介绍了肛门直肠系统常见的痔疮、肛裂、肛瘘、肛门直肠癌、大肠息肉，直肠脱垂、肛门湿疹、肛门尖锐湿疣、慢性结肠炎等疾病的病因病理、症状、诊断、治疗及预防保健、饮食治疗、生活调理等方面的知识。内容丰富、通俗易懂，可供肛肠疾病患者、基层医务人员及医学院校师生参考。

序

祖国医学对肛肠疾病的防治有着悠久的历史和独特的理论体系，上海中医药大学附属曙光医院徐伟祥医师，刻苦钻研、勤奋好学，参考国内外有关文献，把中医肛肠病传统理论和现代医学理论进行有机结合，经过二年的辛勤努力，编撰完成了《肛肠病防治指南》一书。

由于肛肠疾病是一种常见病、多发病，而广大患者对其缺乏预防保健知识，致使疾病反复发作，因此，为普及肛肠病的防治知识，本书的出版具有一定的现实意义。

《肛肠病防治指南》一书，内容丰富详尽，在介绍手术治疗方法的同时，尤其突出了他所研究的一套行之有效的预防保健疗法和饮食疗法，在临床实践中深受广大患者的好评。在此我谨祝徐伟祥医师在未来的工作中取得更大的成就，故以此为序。

洪嘉禾

1993年10月于上海

前　　言

《肛肠病防治指南》是我们在参阅了大量的国内外有关肛肠疾病的文献资料，并结合临床实践，编撰而成的一本中西医结合的书籍。它对痔疮、肛裂、肛瘘、慢性结肠炎、直肠癌等各种常见的肛肠病的病因病理、临床表现、治疗方法、预防保健等进行了全面而系统的总结。

肛肠病是一种常见病、多发病，然而人们对其缺乏有关预防保健知识，尤其是痔疮，由于这是一种血管病，有其特殊的解剖原因，术后极易复发。所以我们在介绍各种肛肠疾病治疗方法的同时，突出了一套行之有效的饮食疗法和气功保健疗法，在临床实践中深受广大患者的好评。

作为一名青年医师，深感此书得以顺利出版，是与各方面的支持、关心分不开的。上海市卫生局副局长张明岛教授为本书题写了书名。上海中医药大学党委书记洪嘉禾教授写了序，在编写过程中得到了著名肛肠病专家柏连松先生的悉心指导，在此特向他们表示衷心的感谢。

本书内容简明扼要，深入浅出，适应于基层医务工作者、医学院校的学生以及广大患者阅读。本书不足或错误之处，敬请同行和读者不吝赐教，批评斧正。

编　　者

1993年8月于上海

目 录

第一章	肛门直肠的解剖和生理	(1)
第一节	肛门直肠的解剖	(1)
第二节	肛门直肠生理	(11)
第二章	肛肠疾病常见的术后并发症和处理	(13)
第一节	尿潴留	(13)
第二节	出血	(15)
第三节	疼痛	(18)
第四节	肛缘水肿	(20)
第五节	发热	(22)
第六节	排便困难	(23)
第七节	肛门感染	(25)
第八节	创面生长缓慢	(26)
第三章	常见的肛肠疾病	(28)
第一节	痔	(28)
第二节	内 痔	(31)
第三节	外 痔	(45)
第四节	混合痔	(48)
第五节	肛 裂	(51)
第六节	肛门直肠瘘	(62)
第七节	肛门直肠周围脓肿	(75)
第八节	肛门直肠恶性肿瘤	(84)
第九节	非特异性溃疡性结肠炎	(97)
第十节	克隆氏病	(104)
第十一节	大肠上皮组织良性肿瘤(大肠息肉)	(110)
第十二节	直肠脱垂	(118)

第十三节	肛窦炎、肛乳头炎	(128)
第十四节	肛门失禁	(132)
第十五节	肛门直肠狭窄	(141)
第十六节	肛门湿疹	(147)
第十七节	肛门瘙痒症	(152)
第十八节	肛门尖锐湿疣	(158)
第十九节	肛门皮肤结核	(161)
第四章	肛肠疾病的预防保健	(164)
第一节	生活调理	(164)
第二节	保持大便通畅	(168)
第三节	掌握肛门保健措施	(170)
第四节	体疗保健	(172)
第五节	气功保健	(178)
第六节	按摩保健	(179)
第五章	肛肠疾病的饮食疗法	(182)
第一节	药茶疗法	(182)
第二节	药粥疗法	(185)
第六章	肛肠疾病常用方药	(191)
第一节	外用药	(191)
第二节	内服药	(195)
附 录	方剂索引	(202)

第一章 肛门直肠的解剖和生理

第一节 肛门直肠的解剖

一、肛门

肛门是人体消化道的最末端，也是肛管的外口，它位于肛门三角的正中，在臀部正中线上、会阴体与尾骨之间。（图 1-1）。




图 1-1 肛门示意图

其前方借肛门外括约肌浅层肌纤维和会阴浅横肌与会阴体相连，后方与尾骨间形成一条明显的沟，称肛尾间沟，沟内有肛尾韧带与尾骨相连，两侧有浅筋膜与坐骨结节相连。平时因肌肉的收缩而处在关闭状态。男性闭缩成圆形纵裂状，女性呈圆形星芒状。可受一些先天性因素或手术因素而引起肛门移位。

肛门闭合处的外围皮肤为鳞状上皮，因色素沉着而呈暗褐色，皮内有毛囊、汗腺、皮脂腺等。感染时可形成毛囊炎、汗腺炎、皮下脓肿等。肛门部皮肤比较松弛，这是生理的需要，因为肛门要经常开放和闭合。

由于肛门皱皮肌的收缩，肛门部的皮肤形成许多放射状皮

肤皱褶。正常人皱褶小，整齐而平坦，富有弹性；病态时多呈脱垂样，所以容易感染，产生水肿和诱发外痔。

肛门周围皮下大多是脂肪组织，它直接与坐骨直肠窝内蜂窝组织相连。所以，临幊上肛周皮下感染时可扩延到坐骨直肠窝；坐骨直肠窝脓肿也常在肛周皮肤上溃破。

二、肛管

肛管为一管状结构，上端与直肠相接，下端与肛门相连，全长3厘米左右。在活体由于括约肌经常处于收缩状态，故管腔呈前后位纵裂状，排便时则扩张成管状。肛管的上界平面，在男性与前列腺齐高，在女性与会阴体齐高。

肛管由皮肤、皮下组织和肛门括约肌等构成。肛管皮肤是一种厚而脆弱的移行上皮，皮内缺乏汗腺、皮脂腺、毛囊和色素沉着，肛管周围为内、外括约肌所围绕，内、外括约肌之间有联合纵肌纤维、肛提肌及直肠纵肌纤维，并交织在内、外括约肌上，形成扇形分布，与肛管皮下部相连，向外、向上牵拉固定和支持肛管而防止外脱。

三、齿线

肛管内面，沿肛瓣的根部有一锯齿状的环形线叫齿线。齿线约距肛缘2厘米，在内括约肌中部或中下 $1/3$ 交界处的平面上，其附近的上皮附着十分牢固，表面光滑无毛，直肠粘膜脱垂时，就是越过这条线而脱出的。

齿线无论在解剖上或临幊上都有重要意义。齿线以上是直肠，属内胚层，以下是解剖肛管，属外胚层。两者来源和本质不同，故齿线上下的组织、血液供应、淋巴回流、神经支配各不相同（表1-1）。

四、肛直环、直肠柱、肛瓣、肛隐窝、肛腺

1. 肛直环(Herrmann氏线) 距齿线上方约1.5厘米，是直

表 1-1 齿线上下不同的组织结构

	齿线上部	齿线下部
来源	内胚层	外胚层
上皮	单层立方或柱状上皮 (直肠粘膜)	移行扁平上皮和复层 扁平上皮(肛管上皮)
神经支配	植物性神经(痛觉迟钝)	脊神经(痛觉敏锐)
动脉分布	直肠上动脉(肠系膜下动脉分支)直肠下动脉(髂内动脉分支)	肛门动脉(阴部内动脉分支)
静脉回流	直肠上静脉→肠系膜下静脉→脾静脉→门静脉	肛门静脉→阴部内静脉→髂内静脉→下腔静脉 腹股沟淋巴结

肠柱上端的连线。指诊时,手指渐次向上触及狭小管腔的上缘,即达该环的位置。此环与内括约肌上缘、联合纵肌上端以及肛管直肠肌的位置基本一致。




图 1-2 齿线上区

2. 直肠柱(Morgagni 氏柱)

或称肛柱，为肠腔内壁垂直的粘膜皱襞，有6~10个，长约1~2厘米，宽0.3~0.6厘米，儿童比较显著。直肠柱是肛门括约肌收缩的结果，当直肠扩张时此柱可消失。直肠柱上皮对触觉和温觉刺激的感受以齿线下部肛管更敏锐。各柱的粘膜下有痔上动、静脉终末支构成的血管丛，内痔核是由这些血管丛曲张膨大而形成。直肠柱最易被误认为初期内痔，前者色泽粉红、光滑、质韧、呈直条形；后者色鲜红、粗糙或有糜烂、质柔软、呈圆形或椭圆形。

3. 肛瓣

在两个肛柱底之间有半月形的粘膜皱襞与之连接，这些半月形的粘膜皱襞称之为肛瓣，约有6~12个，它没有“瓣”的功能，当粪便干结而粗时易被撕裂。

4. 肛隐窝

在两个相邻肛柱底之间，由肛瓣包围，形如袋状的小凹陷称为肛隐窝，又称肛窦。肛隐窝深约3~5毫米，有6~10个，呈漏斗形，窝底在下，伸向外下方，窝口朝上，向肠腔的内上方，基底部有肛腺导管的开口。

5. 肛腺

肛腺是肛门部的腺体组织，分支众多，呈管状结构，终末为盲端，呈房状结构。肛腺分泌的粘液，通过肛腺导管，经肛隐窝开口流向肛管。大便时由于粪便挤压和肛管扩张，而致肛腺分泌粘液，润滑肛管，有利于排便，从而减轻粪块和肛门间磨擦。

肛腺一般有4~10个，通常位于肛管下半部的粘膜下层、内括约肌内或联合纵肌层，多数集中于肛管后部。一般情况下，每个肛腺开口于一个肛隐窝内，但也有几个肛腺同时开口于一个肛隐窝内。值得注意的是，肛隐窝并不都与肛腺相连，有相当部

分的肛隐窝内没有肛腺的开口。

肛腺是肛周感染的主要途径，绝大部分的肛旁脓肿都是继发于肛腺感染。

五、肛乳头、栉膜、栉膜带和括约肌间沟

1. 肛乳头

在直肠柱的底端，沿齿线排列，数目约2~8个，基底部略红，尖端灰白色，呈椎体形、三角形或弦样的乳头状突起，称为肛乳头。肛乳头由纤维结缔组织组成，内含毛细淋巴管，表面覆以皮肤。乳头可小如芝麻大至胡桃，高约1~2毫米，严重肥大的肛乳头可长达1~2厘米。

2. 栒膜

位于齿线和肛门白线之间的环状平滑区，与肛周感染有较密切的关系，先天或后天造成的肛管狭窄症、肛裂均好发于此，低位肛瘘内口也常发生在此区。

3. 栒膜带

是栉膜下一种病理性纤维组织环状带，它束缚肛门括约肌和肛管上皮，使之失去弹性。由于大便时努挣，可导致肛裂，临幊上常用栉膜带切断术治疗慢性肛裂。

4. 括约肌间沟

括约肌间沟即为肛门白线，在肛缘上方约1厘米的内括约肌下缘和外括约肌浅部，皮肤色泽变淡的环状线称为括约肌间沟，此沟的宽度约为0.6~1.2厘米，是内外括约肌的分界线，临幊治疗中多作为手术标志。

六、直肠

直肠位于盆腔内，是大肠的末端，全长约12~15厘米，上起自第三骶椎上缘，向下穿过盆膈而终止于肛门。

直肠的行程并非笔直，它依随骶尾骨面形成两个弯曲。上部

沿骶骨向后弯，称为直肠骶曲。下部向前弯，绕过尾骨尖，在前列腺（男性）或阴道（女性）的后方，称直肠会阴曲。会阴曲呈直角，又名肛管直肠角，直肠的这些弯曲在进行乙状结肠镜检查或经会阴切除前列腺时，必须注意其解剖特点，以免损伤直肠。

直肠与乙状结肠连接处肠腔较小，是整个大肠最狭窄处，自此以下直肠腔显著扩大，称直肠壶腹，穿至盆底处肠腔又再度变狭窄。直肠壶腹内有呈半月形的粘膜横皱襞称直肠瓣。直肠瓣宽约0.7~1.5厘米，长约1.3~5.5厘米，边缘薄而柔软，由粘膜、环肌和纵肌层共同构成，有上、中、下三个，把直肠分隔成三部分，直肠瓣在粪便通过时，具有防止粪便逆行的功能。

直肠两侧借助直肠侧韧带连于盆壁，并于闭孔内肌和肛提肌表面的筋膜相延续。此韧带内有直肠下血管、神经及淋巴组织。在下段的直肠癌手术，必需彻底清除韧带内的淋巴结，但要避免损伤在侧韧带上方的神经丛。女性直肠的两侧尚有由腹膜形成的子宫直肠壁，它与盆腔侧壁之间形成直肠旁窝，位于该处的腹膜后蜂窝组织中，有输尿管和髂内血管的分支。

七、肛门肌肉

肛门肌肉主要由内括约肌、外括约肌、肛提肌和联合纵肌等组成。

(1) 肛门内括约肌是直肠环肌层的延续，属平滑肌。上界平肛管直肠环平面，下达括约肌间沟，包绕肛管上2/3部。

内括约肌受植物神经支配，不受意识的控制，不能随自己的意志而收缩或放松，为不随意肌。它有协助排便的功能，但无括约肛门的功能。

(2) 肛门外括约肌是随意肌，围绕肛管下端，由三部分组成(图1-3)。

① 皮下部。肌束环绕肛门呈圆形，位于皮下，上缘与内括




图 1-3 肛门直肠周围肌肉

约肌下缘相邻，两者之间有联合纵肌纤维构成的肛门肌间隔穿行至肛管皮下，与括约肌间沟相对应，手术切断皮下部时，不会引起肛门失禁。

② 浅部位于皮下部的外侧深层，在外括约肌深部与皮下部之间，呈椭圆形，起于尾骨分为两束，在肛门内括约肌之外环绕着肛管；在肛管前方又合二为一，止于会阴体，有固定肛管位置的作用。

③ 深部环绕内括约肌和直肠纵肌层的外面，为环形肌束，其最深部肌纤维与耻骨直肠肌相融合。

④ 肛提肌是成对的薄而阔的肌肉，附着于骨盆的内面。左右肛提肌连合成漏斗状，尖向下，封闭骨盆下口的大部，两侧肌纤维向后、下、内方斜行，在肛尾缝处交叉。

肛提肌包括耻骨直肠肌、耻骨尾骨、肌腱骨尾骨肌三块肌肉。受人意识控制，是随意肌。收缩时可使肛门上提，便于肛门闭合。

⑤ 联合纵肌是内、外括约肌之间的一层纤维肌性组织，由耻骨尾骨肌和直肠纵肌的部分纤维汇合而成。上端约平肛直

线，下端至外括约肌皮下部的上方。联合纵肌的主要成份除横纹肌和平滑肌外，还有大量的弹性纤维。联合纵肌向下向内穿插在内外括约肌之间，分布在肛管及肛门皮下，与肛门皮下皱皮肌相连。

联合纵肌各层之间有六个肌间隔，即肛门内侧隔、肛门外侧隔、括约肌间内侧隔，括约肌间外侧隔、纵肌内侧隔和纵肌外侧隔。肌间隔对肛管的手术和病理具有重要的临床意义。

联合纵肌的主要功能有固定肛管，协助排便、参与肛门括约功能等作用。

(5) 肛管直肠环，简称肛直环是环绕肛管与直肠连接处的括约肌群的总称。主要由耻骨直肠肌、外括约肌深层、浅层，内括约肌一部分及联合纵肌起始部共同组成。肛指时，手指由括约肌间沟沿内括约肌向上移动，至肛管上端突然向后触到一清楚的边缘，即为此环的正常位置。此环形如绳索，后部较前部发达，而前部较后部稍低。肛直环有环约肛门作用，如手术时切断此环，即可引起肛门失禁。所以在肛瘘手术时，必须注意此环的位置。手术中，如切断全部外括约肌和内括约肌，而肛直环未完全损伤，括约肌断端也未分离，可以保持肛门括约功能。在肛门后方，肛门外括约肌部分肌纤维附于尾骨，如在后方正中切断，断端不能回缩，两端不能分离，所以不致造成肛门失禁；而在其它部位切断，断端回缩，形成疤痕组织，可影响括约功能。如在两处或更多处切开括约肌，也会导致肛门失禁。

八、肛门直肠血管、淋巴、神经

1 肛门直肠血管

(1) 肛门直肠动脉：

① 直肠上动脉，又称为痔上动脉，是肠系膜下动脉的末段，向下经过盆缘，横过左髂总动脉，在直肠上端分为左、右两支，循

直肠两侧向下，并斜向前到直肠下部，分成数支，穿过肌层至粘膜下层。在肛柱内，向下分支分布于齿线以上直肠部，并有许多小支与直肠下动脉、肛门动脉吻合，在肛管上方的右前，右后和左侧三处有主要分支。损伤或破溃时容易引起大量出血。

② 直肠下动脉，又称为痔中动脉，是髂内动脉的分支，在腹股沟下向前内行，经直肠侧韧带达直肠下段的前壁，并在粘膜下层与直肠上动脉和肛门动脉有广泛的吻合。此处动脉管径虽然很小，但在手术时也应予以结扎。

③ 肛门动脉，又称痔下动脉，起自阴部内动脉，主要分布于肛提肌、内括约肌和肛周皮肤。肛门动脉有三个分支，分别分布于肛提肌、肛尾韧带和外括约肌后部及外括约肌中部，至肛管粘膜下与直肠上、下动脉吻合。

④ 髂中动脉，由腹主动脉分叉处稍上方的动脉后壁发出，沿骶尾骨前面下降，分支到直肠后壁，其终末分支可至肛管。

(2) 肛门直肠的静脉：肛门直肠静脉与同名动脉伴行，在肛管部形成两个静脉丛，即齿线上的痔上静脉丛(直肠静脉丛)和齿线下的痔下静脉丛(肛门静脉丛)(图 1-4)。

痔上静脉丛在肛管上方环绕直肠下部排列，向上穿出直肠壁形成直肠上静脉，经肠系膜下静脉入门静脉。

痔下静脉丛位于直肠肌膜表面和肛门皮下，由肛管内壁静脉、肛周静脉、直肠壁外静脉汇集而成，其静脉血分别汇入直肠上静脉、直肠下静脉和肛门静脉。

由于直肠静脉无静脉瓣，并斜行穿过直肠壁，再加上其它原因，如经常便秘，使硬结粪块积存于直肠内，从而压迫肠壁静脉，使血流不畅，或盆内肿瘤压迫；以及门静脉高压阻碍直肠上静脉的血液回流时，可使直肠静脉丛瘀血，静脉扩张而形成痔。

(3) 肛门直肠淋巴：肛门直肠处的淋巴以齿线为界，分为