

世界文化丛书

A SERIES OF
THE CULTURES OF THE WORLD



非洲黑人文化

宁 骚主编

〔浙〕新登字1号

封面设计：池长尧

责任校对：韦 伟

非洲黑人文化

宁骚主编

浙江人民出版社出版

浙江新华印刷厂印刷

(杭州体育场路169号)

(杭州环城北路大木桥堍)

浙江省新华书店发行

开本 870×1168 1/32 印张 15 插页 2 字数 39万 印数 1 000

1993年10月第1版 1993年10月第1次印刷

ISBN 7-213-00957-5/G·220

定 价：8.80元

目 录

《世界文化丛书》序 周谷城

前言 1

第一章 文化生态与文化变迁 1

第一节 骄阳赐予肤色的人民 3

第二节 “广谷大川异制，民生其间者异俗” 23

第三节 黑人文化的年轮 38

第二章 社会规范与节日庆典 65

第一节 个人行为与社会规范 66

第二节 生育文化与儿童期文化 75

第三节 青春期文化 81

第四节 婚姻文化 87

第五节 丧葬文化 103

第六节 节日庆典 109

第三章 此岸世界的偶像化 121

第一节 自然崇拜 125

第二节 图腾崇拜 132

第三节 祖先崇拜 141

第四节 部落神崇拜 149

第五节 走向一神教 159

第四章 技术文化与思想文化 168

第一节	工具与技术的演进	168
第二节	在想象中支配世界	195
第三节	对世界的哲学思考	212
第四节	政治认同与政治忠诚	232
第五章	对美的追求(上)	247
第一节	刻绘在石头上的艺术	248
第二节	刻在木头上的艺术	257
第三节	用泥土塑成的艺术	266
第四节	铜雕和骨雕艺术	273
第五节	人体装饰艺术	284
第六章	对美的追求(中)	293
第一节	文化遗产的保存者和讲述人	293
第二节	绚丽多彩的口述故事	311
第三节	富矿般的谚语	333
第七章	对美的追求(下)	345
第一节	寻求强烈而奔放的节奏	345
第二节	非洲鼓、葫芦琴与其他	359
第三节	非洲黑人的舞蹈	371
第八章	非洲黑人文化与世界文化：吸取与贡献	386
第一节	撒哈拉以南非洲与地中海世界之间的文化交流	389
第二节	东非黑人文化与世界文化的交流和相互影响	403
第三节	非洲黑人文化对拉丁美洲的影响	416
第四节	美国和欧洲文化中的非洲黑人文化成分	440
参考书目		453

第一章 文化生态与文化变迁

在世界第二大陆——非洲，存在着三大文化地理区：阿拉伯-伊斯兰文化区、贝扎-安哈拉-索马里文化区和黑人文化区。虽然这三大文化区是相互穿插的，而且在历史上存在着此消彼长、你进我退、变动不定的情况，但是，我们仍然可以大概地在它们之间划出一条分界线。今天，如果我们从塞内加尔河口开始划一条线，向东经过廷巴克图到喀土穆，从那里往南和往东划到北纬 12°埃塞俄比亚边界，再沿着埃塞俄比亚的西部和南部边界划到朱巴河，接着从朱巴河划到印度洋，这样就把非洲分为两部分。^① 在线的以北和以东居住的基本上是肤色从淡白到浅棕的高加索人种(或称“欧罗巴人种”，也就是通常所说的“白种人”)各族人民。这一部分又可一分为二：沿着苏丹共和国和埃及在努比亚沙漠的边界划一条线到红海，以南包括苏丹东北部、埃塞俄比亚、厄立特里亚、吉布提、索马里以及肯尼亚北部。在这片土地上，生活着在体质特征上属于高加索人种埃塞俄比亚类型的各族人民，其中在语言上属于亚非语系闪米特语族、在宗教上大部分信仰基督教的部族有安哈拉人、蒂格赖人、古拉格人、蒂格雷人等，在语言上属于亚非语系库施

^①塞利格曼：《非洲的种族》，商务印书馆 1982 年版，第 35 页。

特语族、在宗教上大部分信仰伊斯兰教的部族有贝扎人、加拉人、索马里人、阿法尔人(也称达纳基尔人)、奥梅托人、锡达莫人等。我们把这一部分称作贝扎-安哈拉-索马里文化区,其土地面积约 190 万平方公里,人口约 5600 万。另一部分包括埃及、利比亚、突尼斯、阿尔及利亚、摩洛哥、西撒哈拉、毛里塔尼亚以及马里、尼日尔、乍得、苏丹四国的北部,面积约 900 多万平方公里,人口约 1.3 亿。这里的居民在体质特征上属于高加索人种地中海类型,在语言上现在通行阿拉伯语,在宗教上普遍地属于伊斯兰教逊尼派。7 世纪以前,埃及人曾在长达 3000 年左右的时间里信仰阿蒙神教,然后,改宗基督教科普特教派;埃及以西居住着在语言上和文化上具有相当高的同质性的柏柏尔人。但是今天,埃及人早已阿拉伯-伊斯兰化(只有为数不多的居民继续信仰科普特教);柏柏尔人虽然在文化上仍可区分出塔马齐格特人、施卢赫人、里夫人、沙威亚人、卡比尔人、图阿列格人、摩尔人、泽纳加人等部族,然而也已经基本上阿拉伯-伊斯兰化了。因此,我们把非洲的这一部分叫作阿拉伯-伊斯兰文化区。

以上两个文化区,从面积来说,占到非洲大陆总面积的 1/3 强;从人口来说,则不到非洲大陆总人口的 1/3。非洲大陆另外约 2/3 的土地和人口属于黑人文化区,或者叫作黑非洲文化区。上述撒哈拉沙漠南缘那一条分界线以南的非洲大陆,土地面积约 2000 万平方公里;居住着约 500 个部族,今天总人口约有 4.5 亿。人们通常把非洲的这一部分称作“撒哈拉以南非洲”、“黑非洲”或“热带非洲”。事实上,在这一片土地上居住的不全是黑人,一些属于高加索人种地中海类型或埃塞俄比亚类型的部族,如阿拉伯人、图阿列格人、摩尔人、伊拉库人、加拉人等,很早以前就已经迁居于上述分界线以南的土地上,17 世

纪以来又有一部分外来移民到那里定居，今天在南部和东部非洲生活着 550 万欧洲白人(主要来自荷兰、英国、法国和葡萄牙)、100 多万印度人(来自分治前的南亚次大陆)、数万名中国人以及 300 万由欧洲人、马来人与当地居民混血而形成的混血种人(主要是开普有色人)。尽管如此，在撒哈拉以南非洲居住的基本上是黑人，从传统文化上将这一地理区称作“黑人文化区”，还是比较恰当的。

文化区指的是在一定的地理范围内盛行一种文化特征的地区。一个文化区拥有各种各样的行为系统，明显的居住形式，特殊的语言，一定的经济体系，一种特定的社会组织，以及某一种宗教信仰和仪式等。非洲有多少个黑人部族就有多少个传统社会，每个传统社会都有自己的传统文化。要通过比较研究来概括出所有这些传统文化的共同特征，从而对整个非洲黑人文化区的方方面面做出确切的描述和分析，决非轻而易举之事。因为与上述阿拉伯-伊斯兰文化区比较起来，非洲黑人文化区缺乏显而易见的共同文化特征。在撒哈拉以南非洲，比较明显的统一性是种族上的同质性，然而种族与文化之间的联系是极其复杂和含混不清的。这本著作里论述的“非洲黑人文化”，指的是非洲黑人各个部族的传统文化，而不是黑人这一种族的文化。而非洲黑人各个部族的文化，譬如说西非豪萨人的文化与赤道雨林地区的班布蒂人的文化，不啻有天壤之别。在这个意义上，本书对非洲黑人文化所做的描述与分析，只能是探讨性的。

第一节 骄阳赐予肤色的人民

如前所述，在撒哈拉以南非洲生活的绝大多数居民，在体质特征上具有显而易见的同质性，即他们都属于黑色人种。其实，在人类学家看来，这种统一只是多样性中的统一。通过深

入而细致的观察、测量、取样化验和比较分析，人类学家将非洲黑人区分为一系列种族群体。按照现在通行的人种系谱，尼格罗-澳大利亚人种即赤道人种(人们通常所说的“黑色人种”)在非洲分布着三个类型：尼格罗人种、尼格利罗人种和科伊桑人种。

属于尼格罗人种的各族人民分布于撒哈拉以南非洲 37 个国家的土地上，是这些国家的主要居民。这个人种的基本特征是：皮肤色素很深，呈深褐色、巧克力色或黑色；头发色黑质硬，并呈螺旋状鬈曲；胡须和体毛不很发达；面部稍呈扁平，颧骨较低；眉脊不高；眼裂较大，眼球呈黑色或深褐色；鼻梁不高，鼻翼很宽，鼻子扁平，鼻孔大而呈横向；嘴裂较大，唇型很厚，上唇翻翘，吻部鼓胀；颌部明显突出；身材较高，下肢较长。尼格罗人种分苏丹、尼罗特和班图三个类型。苏丹类型分布在西非、乍得以及中非和喀麦隆北部、苏丹共和国西部(科尔多瓦、达尔富尔和加扎勒等省)，其典型特点是：皮肤色素极深，头发较短，鼻子更趋扁平，足部阔而扁。尼罗特类型分布在尼罗河中上游地区，包括苏丹共和国中部和南部，以及乌干达、坦桑尼亚、肯尼亚、卢旺达、布隆迪、扎伊尔、埃塞俄比亚和埃及部分地区。属于这个类型的部族有努比亚人、丁卡人、努埃尔人、希卢克人、巴里人、洛图科人、图尔卡纳人、阿乔利人、马赛人(或译作“马萨伊人”)、卡拉莫琼人、卡伦津人、卢奥人、图西人等，因尼罗河中上游流域为其发祥地，所以被称作“尼罗特人”或“尼罗人”。7 世纪以后，特别是从 11 世纪起，尼罗特人中有一部分南迁。尼罗特人区别于尼格罗人一般特征的特殊之处是：身材高大，躯干瘦削，两腿甚长，男子平均身高 180 厘米，有“巨人”之称；肤色黝黑；前额后缩。班图类型分布在非洲北纬 4° 以南的广大地区，这一地区约占撒哈

拉以南非洲的一半(占非洲大陆的 1/3)，大约 300 个部族在体质特征上属于这个类型。它区别于尼格罗人一般特征的特殊之处是：肤色较为浅淡，呈黄棕色或浅黑色；鼻梁略高；颧骨微显；眼球大而圆；前额和颌部微突。

尼格利罗人种就是我们通常所说的俾格米人，意即“矮黑人”。属于这个种群的居民在远古和上古时代在非洲曾有相当广泛的分布，后来随着尼格罗人种的迁移和热带森林地区的缩小，现在只分布在扎伊尔、刚果、乍得、喀麦隆、加蓬、中非共和国、布隆迪、卢旺达和乌干达等国的赤道雨林地带，以韦累河和伊图里河地区为最多。属于这个种群的部族有班布蒂人(或称“姆布蒂人”)、特瓦人(或称“巴特瓦人”)、特维德人、阿卡人、埃菲人、宾加人(或称“巴宾加人”)、克维人(或称“巴克维人”)、苏亚人(或称“巴苏亚人”)等，共约 30 万人口。尼格利罗人种的典型特征是：肤色棕褐；头发鬈曲，体毛较多但胡须不甚发达；鼻子较高；唇型稍薄；身材矮小，下肢较短，平均身高在 150 厘米以下。

科伊桑人种的典型特征是：肤色较浅，呈古铜色或黄色；头发极短且稀疏，呈胡椒粒状鬈曲，胡须和体毛较少；面部扁平并多皱纹；颧骨较高；眼裂狭长并稍有倾斜，内眦褶较多；两耳常无耳垂；鼻梁不高，鼻翼较窄；唇型稍薄，上唇微翘；臀部肥大并突出，尤以妇女为甚；身材矮小，四肢较短，男子平均身高 158 厘米左右。科伊桑人在 2500 年前曾广泛分布在除刚果盆地以外的今日班图尼格罗人居住的广大地区，是石器时代斯蒂尔拜文化的创造者；随后由于班图尼格罗人的一再南迁而分布地区逐渐缩小，到 17 世纪主要居住在今南非开普地区、纳米比亚、博茨瓦纳和安哥拉南部。由于荷兰、英国和德国殖民者推行种族灭绝和种族同化的政策，今天这个种群在开普地区

已不复存在。科伊桑人在受班图尼格罗人的挤压而南迁的过程中，在东非有些地区遗留下来了一些小群体。现在这个人种由布须曼人、霍屯督人、达马拉人、金迪加人(又称“哈察人”或“哈查皮人”)和桑达维人组成。霍屯督人自称“科伊-科伊人”，他们把布须曼人叫作“桑人”，二者在体质特征上稍有差异。布须曼人南支已灭绝；北支以纳米比亚东北部为中心，比较重要的群体有海昆人、奥恩人、昆人和科罗卡人，其中有些群体生活在安哥拉南部；中支分布在卡拉哈里沙漠，比较重要的群体有胡奎人、纳龙人(艾奎人)、纳米布人、奥赫奎人、汤内奎人和努桑人。霍屯督人分布在纳米比亚中部和南部、博茨瓦纳东北部，包括纳马人、雷霍博思人、科拉人、德米萨人和丘瓦乌人。达马拉人又称“山地达马拉人”或“贝格达马人”，主要分布在纳米比亚中部的达马拉山地，是班图尼格罗人的一支赫雷罗人与纳马人的混血种。桑达维人讲霍屯督语言，金迪加人讲布须曼人语言，他们分别居住在坦噶尼喀北部孔多阿地区和埃亚西湖西岸一带。科伊桑人种各群体的总人口现在约为 30 万人。

人种与种族是生物学概念，因为人类在体质特征上的差异是自旧石器时代晚期以来各个族群在彼此隔绝的状态下适应特定的自然环境的结果。人类种族的差别是靠生殖细胞中的很多基因联合遗传给下一代的，而文化只能通过学习而获得却不能遗传。“严格说来，种族这个概念不应当用于区别某一个人，而只能用于区别某一群人。”种族类型实际上是对人体的各项特征进行测量而得到的一组组平均数的集合。^① 人类学家强调指出：非洲黑人的种族特征来源于人类使自己适应其所处的热带非洲特殊的环境，适应那里的阳光、气候、植被、湿度等等情况。

^①雷蒙德·弗思：《人文类型》，商务印书馆 1991 年版，第 17—19 页。

“人们注意到，在身材与最热月份的最高温度之间存在着一种正比关系，而在身材与湿度之间则存在着反比关系。同理，窄鼻子在较冷的气候中更能使空气变暖和，并使干燥的空气变湿润。这就是为什么撒哈拉沙漠以南的各民族从沙漠地带穿过热带大草原来到森林时，他们的鼻指数有明显升高的倾向。虽然他们有着跟白人一样多的汗腺，但他们排的汗多一些，这使他们的身体和皮肤保持较低的温度。”^① 非洲黑人的肤色也与湿热气候的生活条件相关：肤色的深浅差异同体内含有各种不同的色素及其多寡有关系，色素越多，皮肤越黑。皮肤中的色素可以抵御太阳的射线，特别是紫外线的渗透，因此住在热带非洲的最早的居民的肤色必然是黑的。另外，非洲黑人的皮肤比高加索人种的皮肤要薄，辐射散热会比较容易；非洲黑人皮肤中的毛细血管较多，较扩张，会有利于热量的散失，这说明皮肤赋予黑人在炎热多雨的气候条件下生存的特殊能力。不过，人类学家同时又指出，人类的种族特征与地理环境之间的关系是很复杂的。“人类对于环境的这种适应可以说是必然有的。但是要用事实来证明这些体形上的特征是由环境来决定的，则又是一回事。因为目前我们只能说有相关性，还不能说有因果性。”^②

种族与文化的关系问题，自 19 世纪中期以来一直是一个聚讼不已的课题。人类学资料表明，具有某种类型的体质特征的人类群体在有选择地适应某种特殊的自然环境的过程中发展了这些特征，而文化本身对某些特征的发展也起了一定的作用。在撒哈拉以南非洲，通过对人类化石与石器工具进行的科学研究，现在已经可以比较清晰地描绘出人类体质进化与文化进化相互

^①J·基-泽博：《编者的说明：关于非洲“人种”与历史的若干理论》，载 J·基-泽博主编：《非洲通史》第 1 卷，中国对外翻译出版公司 1984 年版，第 193 页。

^②雷蒙德·弗思：前引书第 24 页。

影响的一条主线，即：

人类体质特征发展的阶段(单位：万年)

发展阶段	腊玛古猿	南方古猿	直立人	早期智人	晚期智人
距今年代	1400—700	400—100	200—20	25—5	5—

伴随着体质进化的历程这条主线，形成中的人类在文化上也有一个从使用天然工具到早石器时代到中石器时代再到晚石器时代这样一个由低级向高级发展的演变过程。在这个过程中，身体的直立、脑容量的增大等体质特征的形成对文化的发展产生了深远的影响；而工具的使用、制造和改进，火的使用，营养卫生条件的改善等文化的进化，对体质特征的变化也起了显著的作用。不过，在晚期智人即现代人形成以后，体质特征与文化之间的关系就显得模糊不清了。现在可以确定的是，撒哈拉以南非洲某些种族群体特有的生理障碍，如乳糖不耐症、镰状细胞性贫血，就是文化影响的结果。世世代代生活在赤道雨林地带的那些种族群体，如俾格米人，在其饮食文化中长期以块根、水果等淀粉质食物为基础，缺乏足够的蛋白质和热量，不饲养乳牛及其他产奶牲畜，结果就造成人体内酶的缺失，而酶在人体内的化学反应中起着关键性的催化作用。人体内缺少酶，就不能够离析牛奶中的乳糖，因此人对乳糖的厌恶程度就很高。由于乳糖不耐症的病因在于人的染色体和基因，因此它可以代代相传，并形成一种群体特征。另外，在非洲黑人的血液中有的一种特有的抗原体血红蛋白S(Hbs)，因此所有的或部分的红血球呈镰刀状。这是在传统的黑人文化不能有效地抵御为害甚烈的热带蚊虫的条件下，人体对疟疾寄生虫的存在的一种适应性变化。镰状红血球有抗御疟疾的作用。虽然镰状细胞性贫血会导致患者死亡，但是它造成的损失远远被它减少疟疾死亡率的

好处所补偿。例如，在奎宁发明以前，欧洲殖民者将几内亚湾沿岸视作“白人的坟墓”，但是非洲黑人却能够在那里生息繁衍并创造发达的传统文化。总而言之，虽然现代人种与文化之间的真实联系（不是种族主义者纯属虚构的那种“联系”）有待于进一步的科学探讨，但是现代科学已经充分证明人种和智力程度之间并无联系，以种族差异去阐释文化优劣的任何企图都是徒劳的。种族主义者编造的种种“白人文化至上论”和“黑人文化低劣论”，都是没有任何科学依据的虚妄之谈。

不管种族与文化之间有什么联系，可以肯定的是，文化的创造者不是靠遗传因素来维系的人的自然共同体，而是靠人的本质即人的社会性来维系的人的社会共同体。文化的主体是人的族类共同体。族类共同体是人们在历史上形成的一个有共同语言、共同地域、共同经济形态以及表现在共同文化上的共同心理素质的稳定的共同体。在非洲各个传统社会里，现代民族还没有形成（本世纪五六十年代以来开始在现代国家的疆域范围内正在形成统一的现代民族），族类共同体的基本形式是部族（ethnicity）。^① 在撒哈拉以南非洲 37 个国家里分布着约 500 个部族，其中人口超过 1000 万的有 4 个：豪萨人（2238 万）、约鲁巴人（1959 万）、富尔贝人（或称“富拉尼人”、“颇耳人”，1689 万）和伊博人（1605 万），它们都分布在西非。人口在 500—1000 万的有 11 个，其中南部非洲 5 个，即马夸人（775 万）、绍纳人（705 万）、马拉维人（652 万）、祖鲁人（634 万）和科萨人（561 万）；西非、中部非洲、东非各 2 个，即莫西人（534 万）、伊比比奥人（502 万）、刚果人（或称“巴刚果人”，760 万）、卢巴人（563 万）、尼亚卢旺达人（954 万）和隆迪人（669 万）。人口在

^① 宁骚：《试论当代非洲的部族问题》，《世界历史》1983 年第 4 期。

100—500 万的有 74 个：西非(包括乍得)27 个，东非 24 个，南部非洲 14 个，中部非洲 9 个。其他部族虽然人口不多，有些甚至只有几百人、几千人，但它们各自都有本身特有的文化。

语言是文化的载体。在非洲黑人各个传统社会里，大都只有口头语言而没有书面语言；只有很少几个部族曾经在外来文化的影响下创制了或者试图创制本族文字。因此，非洲黑人各族的传统文化基本上是一种口头文化，一种无文字文化。非洲黑人各族的语言，按照它们彼此间亲缘关系的有无或远近来分析，在地域分布上语言杂乱的地区和语言普遍相近的地区各占撒哈拉以南非洲的一半。语言杂乱地带西起塞内加尔海岸，向东延伸，直达埃塞俄比亚西部边界和东非高原，东西长约 5600 公里，南北平均宽度仅为 1100 公里。具体地讲，这个地带的北界大致与撒哈拉沙漠南缘一线重合，南接热带森林地带北缘，西临大西洋，东到东非高原。据语言学家 D·多尔比计算，非洲语言大约为 1650 种，其中约有 1100 种分布于这一地带，约占总数的 67%。^①语言学家 J·H·格林伯格将非洲大陆的语言划分成四大语系，其中亚非语系(即闪含语系)的柏柏语族、闪米特语族、库施特语族、乍得语族，尼日尔-科尔多凡语系中除班图语以外的各个语言，尼罗-撒哈拉语系的所有语言，都分布在语言杂乱地带。单就这个地带的黑人各族的语言而论，亚非语系乍得语族诸语言分布于乍得、尼日尔南部、尼日利亚北部，这些语言分为 9 个分支，其中比较重要的有豪萨语、安加斯语、曼达拉语、马萨语和穆斯古语。豪萨语在历史上早就被用作西非各族之间的交际语和商业用语，现在操豪萨语的人有 5000 万之多。尼日尔-科尔多凡语系在这个地带分布于西非绝大部分地

^①D·多尔比：《非洲的语言地图》，J·基-泽博主编：《非洲通史》第 1 卷，第 229 页注⑧。

区，以及喀麦隆、乍得、中非和苏丹部分地区。这个语系有两个语族：尼日尔-刚果语族和科尔多凡语族，后者有5个语支，但都是些小语言，全都分布于苏丹科尔多凡丘陵地带。尼日尔-刚果语族有6个语支：曼德语支诸语言分布在塞内加尔河和尼日尔河上游地区以及冈比亚河流域，并向南延伸到塞拉利昂、利比里亚、科特迪瓦境内，大语言有马林凯语、班巴拉语、索宁凯语、迪乌拉语、苏苏语、门德语、克培勒语、瓦伊语、洛马语、马诺语、丹麦和古罗语；西大西洋支诸语言分布在从塞内加尔到利比里亚的大西洋沿岸，大语言有沃洛夫语、谢列尔语、迪奥拉语、泰姆奈语、基西语、戈拉语和巴兰特语，以及分布于西非许多国家的富尔贝人讲的富拉尼语；古尔语支(又名“沃尔特语支”)诸语言分布在尼日尔河曲以及黑、白沃尔特河上游地区，大语言有莫西语、古尔马语、格鲁西语、达戈姆巴语、卡布勒语、塞努福语和多贡语，其中最重要的是莫西语；克瓦语支诸语言分布于从利比里亚、科特迪瓦界河卡瓦利河流域到尼日利亚东南部的几内亚湾沿岸地区，大语言有克鲁语、巴乌勒语、阿尼语、贝特语、特维语、芳蒂语、阿散蒂语、埃维语、努佩语、约鲁巴语、埃多语和伊博语；阿达马瓦-东部语支诸语言分布在从尼日利亚和喀麦隆的接壤地带，经过中非共和国，到苏丹和扎伊尔的接壤地带，大语言有伊卓语、桑戈语(其重要方言有班达语、格拜亚语、恩格班迪语)和阿赞德语；贝努埃-刚果语支诸语言分布在从尼日利亚境内的贝努埃河流域起一直到非洲东南端的广大地区内，其中班图语以外的诸语言分布在尼日利亚和喀麦隆的部分地区，大语言有伊比比奥语、蒂夫语、巴米累克语、蒂卡尔语和埃菲克语。从乍得北部的提贝斯提高原到乍得湖地区，再从湖南端的沙立河流域向东到尼罗河上游地区，分布着尼罗-撒哈拉语系诸语言。这个语系的各个语族基本

上可按由西向东的顺序排列如下：(1)桑海语族。由桑海语、哲尔马语、登迪语组成，孤立地分布于尼日尔河中游谷地，即马里东部和尼日尔西部；(2)撒哈拉语族。分布于尼日利亚东北部、乍得北部和苏丹西部，由卡努里-加涅姆布语、特达-达扎语(图布人的语言)、扎加瓦语、贝尔蒂语组成；(3)马巴语族。分布于乍得东部瓦代地区；(4)富尔语族。分布于苏丹西部的达尔富尔地区；(5)科马语族。分布于苏丹南部青、白尼罗河的河间地区。马巴、富尔和科马这三个语族的语言都很小，说这些语言的人现在总共不到100万；(6)沙里-尼罗语族，这是尼罗-撒哈拉语系的最大语族。它分为东苏丹语支和中苏丹语支，前者包括尼罗河流域的努比亚语和苏丹南部地区的丁卡语、努埃尔语、希卢克语、巴里语和洛图科语，以及肯尼亚的卢奥语、图尔卡纳语和南迪语，肯尼亚和坦桑尼亚的马赛语、乌干达的兰戈语、泰索语和卡拉莫琼语；后者包括乍得南部的萨拉语、扎伊尔东北部的芝贝图语、乌干达的卢格巴拉语和马迪语。

非洲语言普遍相近的地区指的是班图语分布区。这个地区的北界被称作“班图线”。这条线西起尼日利亚和喀麦隆的界河里奥德尔雷河口的海岸，大约沿北纬5°线向东转而向南，曲曲折折地到达喀麦隆的东南角，然后由此向东穿过刚果和扎伊尔，沿韦累河南岸抵达莫布图湖(原阿伯特湖)的源头，接着折向东南，跨过基奥加湖，经埃尔冈山南麓，沿维多利亚湖的东部内地，到达它的东南角。它从这里向东到达蒙巴萨内地，最后沿海岸地带向北，终止于索马里境内的朱巴河口。约360种语言属于班图语。“班图(Bantu)一词应写作“Ba-ntu”。在这些语言中，“巴”(Ba)这个前缀表示多数，“恩图”(Ntu)的意思是“人”，“班图”的含义是人们。英国学者布利克于1851年出版的一本著作中，首先用这个词来概括中部、东部和南部非洲黑

人各族语言之间的亲缘关系。所有的班图语言都有同样的语法结构和统一的基本词汇，表现出令人惊异的同质性，以致于语言学家们认为所有的班图语言都只不过是同一种语言的方言。俄国著名的非洲学家奥耳德罗格认为，班图语的各种语言非常相似，以致非洲东部沿岸的居民可以毫不费力地了解津巴布韦、赞比亚、扎伊尔的加丹加地区或刚果居民所说的话。^①属于班图语的大语言有：喀麦隆和加蓬的芳语；喀麦隆的杜阿拉语；扎伊尔、安哥拉和刚果的基刚果语；扎伊尔的林加拉语、蒙戈语、卢巴语、恩加拉语和特克语；乌干达的卢干达语、吉苏语、安科累语和奇加语；肯尼亚、坦桑尼亚、乌干达和扎伊尔西部通行的斯瓦希里语；肯尼亚的坎巴语、卢希亚语和卡伦津语；坦桑尼亚的苏库马语、尼亚姆韦济语、赫赫语、马孔德语、哈亚语、金迪加语、扎拉莫语、查加语和戈戈语；卢旺达的基尼亚卢旺达语；布隆迪的隆迪语；津巴布韦的绍纳语和恩德别列语；马拉维和赞比亚的尼扬扎语；赞比亚的本巴语；安哥拉的隆达语、姆本杜语、乔克维语和奥文本杜语；莫桑比克的马夸语和聪加语；博茨瓦纳和南非的茨瓦纳语；纳米比亚的奥万博语和赫雷罗语；斯威士兰和南非的斯威士语；南非的祖鲁语和科萨语；莱索托和南非的索托语。

在上述语言普遍相近的地区里，还分布着一个科伊桑语系。这个语系诸语言的地域分布是与科伊桑人种的地域分布相吻合的。最早使用“科伊桑”(Khoisan)一词的是英国人类学家夏佩腊。布须曼诸语言和霍屯督诸语言的相似之处在于构词的方法很特别，吸气音起着巨大作用。事实上，这两类语言之间缺乏亲缘关系的证据。这个语系诸语言都是小语言，它们的存在并

^①奥耳德罗格和波铁辛主编：《非洲各族人民》，三联书店1960年版，第136页。