

20132

2005 清点

S2414

4
4

楊
明
亮

广州中医学院
图书馆
图 书

方訣序

或曰世人畏用仲景方。譬如某山有虎。人山遇虎其若之何。子獨敢力辨其無設有聽乎。人山遇虎其若之何。子曰固籌之熟矣。能保無虎矣。但慮人山者不識路徑。或有險阻。則不可量。子故於方訣之後。註明藥品。訂定分兩。錄該方治証之原文。但須學者審証對方。必無差謬。果有誤人之方。亦不成爲醫聖之方。且醫宗金鑑亦何必首將仲景之書。示爲醫宗乎。請思醫宗一書。豈徒具文之書哉。醫治百姓如此。醫治天子傷寒論歸真卷七

亦如此者。子嘗曰。但慮認症之不真。不須慮方之寬險。加減輕重。學者酌量。聖人立法。可以使人規矩。亦不能使人巧。要知傷寒之方。以仲景之方爲正可也。予今編此方訣。果能宗之有功無損。

東莞陳煥堂自序

附景歸真

傷寒全方目錄卷七

太陽經內之方

一桂枝湯

川桂枝加附子湯

川五苓散

人麻杏石甘湯

八十裏湯

上桂枝人參湯

三葛根黃芩連湯

三桂枝去芍湯

久桂枝去芍加附子湯

十桂枝加朴杏湯

仁瓜蒂散

仁大陷胸湯

傷寒論歸真卷七

二

仁小陷胸湯

以三物白散

以大陷胸丸

以文蛤散

仁麻黃湯

甘芍藥甘草附子湯

以桂枝新加湯

以茯苓甘草湯

仁小建中湯

以炙甘草湯

仁桂枝甘草湯

以苓桂朮甘湯

以桂枝去芍加苓朮湯

以苓桂朮甘湯

仁梔子豉湯

仁梔子甘草豉湯

以梔子羌豉湯

以梔子厚朴湯

干姜湯

干姜承氣湯

昨抵當湯

昨凡

昨大黃黃連瀉心湯

昨附子瀉心湯

昨甘草瀉心湯

昨生薑瀉心湯

昨半下瀉心湯

昨赤石脂禹餘糧湯

昨代赭旋覆湯

昨大青龍湯

昨桂二麻一湯

昨麻桂各半湯

昨桂二越一湯

昨小青龍湯

昨干姜附子湯

昨茯苓四逆湯

傷寒論歸真卷七

三

陽明經內方

昨人參白虎湯

昨白虎湯

昨小承氣湯

昨麻仁丸

昨調胃承氣湯

昨大承氣湯

昨導法

昨蜜導

昨胆導

昨瓜根導

昨猪苓湯

昨麻黃連翹赤小豆湯

昨茵陳湯

昨梔子柏皮湯

少陽經內方

小柴胡湯

以柴胡桂枝湯

柴胡桂枝干姜湯

以黃連湯

大柴胡湯

以柴胡加芒硝湯

太陰經內方

以理中湯

以干姜苓朮連人參湯

以羌活甘草人參湯

以桂枝加芍

以加黃湯

少陰經內方

以麻黃附子細辛湯

以麻黃附子甘草湯

傷寒論歸真卷七

四

以附子湯

以四逆湯

以白通湯

以白通加尿胆湯

以真武湯

以通脈四逆湯

以四逆湯

以吳茱萸湯

以黃連阿膠湯

以猪膚湯

以甘草湯

以甘桔湯

以半夏散湯

以苦酒湯

以桃花湯

厥陰經方

外烏梅丸

外當歸四逆湯

外加吳茱萸生羌

外白頭翁湯

合併病方

外葛根湯

外葛根加半夏湯

外黃芩湯

外黃芩加半夏生羌湯

復病方

外枳實梔子豉湯

外牡蠣澤瀉湯

外理中丸

外竹葉石羔湯

外燒視方散

傷寒論歸真

卷七

壞症方

五

外陽旦湯

外陰旦湯

外甘草干羌湯

外芍藥甘草湯

外麻黃升麻湯

外柴胡加龍骨牡蠣湯

外桂枝加桂湯

外桂枝去芍藥

加龍骨牡蠣救逆湯

外桂枝龍蠟湯

瘧症方

外葛根湯

外桂枝加葛根湯

濕症方

桂枝附子湯

又去桂加白朮湯

甘草附子湯

傷寒論歸真卷七

六

讀法

一訣內必將方藥味一一指明，不敢遺失一味。
一訣內必指明該方專治之症，故爲問方知症。
一方分別三款：一曰方訣是包概藥味治症者；一曰論方藥是抄錄原方藥味分兩、煮法、服法；一曰方治原是錄方所治之症，論內原文。

一將原方分兩註明，又註訂定合用分兩。原方一劑分作三服，今訂定分兩，乃訂一劑一服者。原方每味藥一兩，比今實應六錢爲合。原方一劑又分三

傷寒論歸真卷七

七

服。今人一劑作一服，又止三分之一，故原方一兩，今訂二錢爲合。其間藥性太猛者，仍量減少，如半夏麻黃是也。其間藥味平淡無力者，增多些，如茯苓、桂枝、人參是也。

今人以桂枝過於辛溫，豈知桂枝平淡微甘，微見辛氣，微辛則不甚溫，又不甚發。可知愚每服必須四錢，始見其效。如無生羌五六錢佐之，猶恐其無力以驅邪者，學者不可不識也。

先師所立各方，因風立風，因寒立寒。三陰三陽正病

合病立個規矩繩墨者、雖有汗下溫清等一十六法、計得一百一十六方、未曾另立夾痰夾食等夾雜之方、倘有風寒夾雜之症、當加夾雜之藥、亦不必拘定原方、莫謂先師立方不齊、棄而不用、反用俗方、是舍蘇合而取蠅螂矣、

一凡湯頭下論內、抄白刊刻有錯者、可覓醫宗金鑑核之、

仲景歸真

傷寒問方知症歌訣

一〇桂枝湯訣

桂枝首治太陽風。

芍藥、桂枝、草、棗、

脈浮、汗出身發熱。

頭痛、惡風、項脊強。

於今增其加減法。

外感百病合商量。

桂枝三兩訂

芍藥三兩訂

炙草二兩訂

生羌三兩訂

大棗十二枚訂四枚

用水一碗半煎至八分溫服服後飲稀粥一碗。

傷寒論歸真卷七

九

以助藥力取微微汗出愈中風症本來時有汗時無汗身常滋潤不似傷寒身常干燥者此服此藥後無汗者要有汗出有汗者要止汗為合服此不見效一日之內可服至三劑古人原以一劑分三服今訂少其數故以一劑一服或慮生羌三錢恐辣難服因此方炙草大棗係大甜桂枝微甜合之總不見辣而見甜耳照此分而合為一劑予自試之多驗矣。

加減法

嘔者加半夏、陳皮各三錢。

夾食者加山楂、神曲各三錢。

氣喘者加杏仁、厚朴各三錢。

頭痛者加羌活二錢。

夾熱者加黃芩三錢。

渴小便不利合五苓散。

渴而小便利合白虎湯。

溫症合白虎湯。

咳嗽加蘇梗、薄荷、杏仁。

傷寒論歸真卷七

十

夾濕加茯苓、白朮各四錢。

濕黃加茵陳八錢。

論曰：太陽中風，陽浮而陰弱，陽浮者熱自發，陰弱者

汗自出。膏肓惡風，漸漸惡寒，翕翕發熱，鼻鳴干嘔

者，桂枝湯主之。

論曰：太陽病，頭痛發熱，汗出惡風者，桂枝湯主之。

論曰：病人藏無他病，時發熱自汗出而不愈者，此爲

衛氣不和也。先其時發汗則愈，宜桂枝湯。

論曰：太陽病發熱，汗出者，此爲營弱衛強，故使汗出。

欲救邪風者宜桂枝湯論內用桂枝者二十餘條不能備錄。但此方乃仲景得意之方，氣分之藥，如氣虛可加附子、人參、黃芪、飴糖、干羌、白朮，氣盛者可加朴、杏、苓、連、石、羔、大黃、乾葛、知母，百病皆宜。

川○桂枝加附子湯訣

桂枝湯加附子湯

發汗遂漏汗不息。

惡風拘急小便難

風邪未退亡津液。

桂枝湯內再加附子貳兩 訂三錢

用水碗半煎至七分大溫服。

傷寒論歸真卷七

士

論曰：太陽病發汗遂漏不止，其人惡風，小便難，四肢微急，難以屈伸者，桂枝加附子湯主之。

此症初因誤發大汗，汗漏不止而表邪仍然不解，如表邪解是應慮其亡陽，急宜四逆湯者矣。

川○五苓散訣

五苓澤朮二苓桂

脉浮熱渴便不利。

又治渴飲吐水逆。

桂與桂枝內外使。

澤瀉 一兩六錢 訂三錢

茯苓 十八錢 訂三錢

猪苓 十八錢 訂三錢

白朮 十八錢 訂三錢

桂 半兩 訂一錢

桂枝 訂三錢

此方原作散服每服方寸七多飲溫水取汗今訂用湯服用水碗半煎一碗大溫服取汗如身熱惡寒宜用桂枝身不熱者宜用桂不拘飲盛熱盛務須小便不利者始合

論曰太陽病發汗後大汗出胃中乾煩躁不得眠欲得飲水者少少與飲之令胃氣和則愈若脈浮小便不利微熱消渴者五苓散主之

論曰發汗已脈浮數小便不利煩渴者五苓散主之論曰中風發熱六七日不解而煩有表裏症渴欲飲

傷寒論歸真卷七

七

水水入則吐者名曰水逆五苓散主之論曰小便不利渴者五苓散主之

×○麻杏石甘湯訣

麻杏石甘汗下後

喘而無汗大熱候

原書有汗熱不大

何取麻黃石羔湊

錯策古來皆錯解

移那無字天然就

麻黃四兩去節

杏仁

五十枚去皮尖

甘草

炙二兩訂三錢

石羔

半斤碎綿裡訂二兩

用水碗半煎麻黃至一碗去白沫內諸藥再煎

至八分溫服

論曰發汗後不可更行桂枝湯汗出而喘無大熱者
可與此湯

論曰下後不可更行桂枝湯汗出而喘無大熱者可
與此湯

愚意麻杏石羔湯卽麻黃湯減桂枝又卽金匱之
返魄湯加石羔夫麻黃返魂皆爲無汗而用者何
以此症有汗亦敢重用耶又大青龍白虎均以石
羔清火而得名此症無大熱何敢重用且據原文

傷寒論歸真卷七

十三

汗下之後汗出而喘無大熱似係極危之症矣尙
敢再用麻黃石羔大發大清之藥乎此二條文必
係錯字千古而不悟者試將無大熱之無字置於
桂枝之下卽係下後不可更行桂枝湯無汗出而
喘大熱者與此湯則症與方的當不易也何也無
汗出而喘麻黃合用也大熱者石羔合用也況且
論內與金匱從未見有汗出用麻黃無熱用石羔
之例又可知也

八〇十裏湯訣

直立切
音聲汗
出貌

十、大、荒、花、甘、遂、戟、
頭痛、心、硬、引、脇、痛、
發、熱、汗、不、惡、寒、
乾、嘔、短、氣、伏、飲、愈、

又

十、大、荒、花、甘、遂、戟、
汗、漿、發、熱、頭、時、痛、
中、風、表、解、不、惡、寒、
心、硬、引、脇、痛、難、安、
干、嘔、短、氣、便、不、利、
祇、緣、伏、飲、也、為、愈、

荒、花、
甘、遂、
大、戟、
大、棗、
十、枚、擘、

又、三、味、等、分、各、別、搗、為、散、以、水、一、升、半、先、煮、大、
棗、十、枚、取、八、合、去、棗、查、內、藥、末、強、人、服、一、錢、七、

傷寒論歸真卷七
出

弱、人、半、錢、七、溫、服、之、平、旦、服、若、下、少、病、不、除、者、
明、日、更、服、加、半、錢、得、快、下、利、後、服、糜、粥、自、養、
論、曰、太、陽、中、風、不、利、嘔、逆、表、解、者、乃、可、攻、之、其、人、禁、
禁、汗、出、發、熱、有、時、頭、痛、心、下、痞、硬、滿、引、脇、下、痛、干、
嘔、短、氣、汗、出、不、惡、寒、者、此、表、解、裡、未、和、也、十、大、湯、
主、之、不、利、指、小、便、不、利、始、合、飲、症、

上○桂枝人參湯訣

桂、枝、人、參、理、中、桂、
利、下、不、止、心、痞、硬、
太、陽、數、下、協、熱、利、
表、裡、不、解、此、所、謂、

誤下利不
止而心下
痞硬方

人參 三兩 訂六錢

白朮 三兩 訂六錢

干羌 三兩 訂六錢

甘草 炙四兩 訂六錢

桂枝 四兩 訂六錢

右五味 訂用水二碗 先煮四味 取碗半 內桂再煮 取八分 溫服 日二服 夜一服 此方即卑中湯 加桂枝

論曰太陽病外症未除而數下之遂協熱而利利下不止心下痞硬表裡不解者桂枝人參湯主之此因誤下成痞協熱利表症仍然不解者

主○葛根芩連湯訣

葛根芩連湯甘草

誤下太陽利不好

傷寒論歸真卷七

主

脈促是因表未除

喘而汗出此方保

葛根 半斤 訂一兩

黃芩 三兩 訂五錢

黃連 三兩 訂三錢

甘草 炙二兩 訂三錢

訂用水一碗先煮葛根至碗半再內三味煮取八分溫服日一服夜一服

論曰太陽病桂枝症醫反下之利遂不止脈促者表未解也喘而汗出者葛根芩連湯主之

主○桂枝去芍湯

久○桂枝去芍加附湯訣

快下而脈促胸滿方
誤下汗出惡寒方

快下利不止而脈促

汗方

桂枝去芍又加附

均治太陽誤下

下後脈促胸滿者

汗出惡寒加附當

桂枝 五錢

甘草 二錢

生羌 三錢

大棗 四枚

附子 三錢

用水碗半煎八分溫服

論曰太陽病下之後脈促胸滿者桂枝去芍湯主之

若汗出微惡寒者去芍加附湯主之

十○桂枝加朴杏子湯訣

桂枝加朴杏子湯

下之微喘表不解

傷寒論歸真卷七

六

其氣上衝與喘家

通用此方病可快

桂枝湯原方另加厚朴

二兩

杏仁

五十個

餘

依桂枝方法

論曰太陽病下之後微喘者表未解也桂枝加朴杏子

湯主之喘家作桂枝湯加厚朴杏子佳

論曰太陽病下之後其氣上衝者可與桂枝湯方用

前法若不上衝者不可與之

上○瓜蒂散訣

瓜蒂豆豉桂枝症

頭項不痛寸浮時