

世補齋醫書後集

傅氏女科中下

女科卷之五

原序  
而醫者其乘明無解因訥元和陸懋修九芝校訂  
咷妊娠惡阻婦人之體素虛而血氣不益則其道平不  
婦人有娠之後惡心嘔吐思酸解渴見食憎惡困倦欲臥人  
皆混稱之爲惡阻而亦知肝血之獨燥乎夫婦人受孕本於  
腎氣之旺腎旺故能攝精然腎一受精而成孕則腎水生胎  
不暇化潤於五臟而肝爲腎子本日食母氣以舒一日無津  
液之養則肝氣迫索而求救腎水又不之應則肝益急急則

火動而逆矣肝氣既逆嘔吐惡心之證作嘔吐縱不至太甚  
而其傷氣則一也氣既受傷肝血愈耗四物湯治胎前諸症  
正以其能生肝血耳夫補肝以生血未爲不佳然但生血而  
不知生氣則脾胃衰微不勝頻嘔恐氣虛而血正不易生也  
故於平肝補血中必加以健脾開胃之品然後氣能生血而  
胎亦得資其助或疑氣逆而用補氣之藥不益助其逆乎不  
知妊娠惡阻其逆不甚且逆是因虛而逆非因邪而逆也因  
邪而逆者助其氣則逆增因虛而逆未爲不佳然但生血而  
氣於補血之中則陰足制陽又何慮氣虛而血正不易生也

人參一兩

白朮

三錢

茯苓二錢

熟地五錢

當歸一兩

酒洗

白芍

三錢

麥冬

三錢

陳皮三分

砂仁一粒

炒研

蘇子一錢

炒研

神麴

一錢

炒

水煎服一劑輕二劑平三劑全愈此方平肝則肝逆除補腎則肝燥息補氣則血易生凡胎病惡阻但以此方投之無不安者其功更勝於四物焉

妊娠口乾咽痛水不進半陰火甚頭金頭半水而火不  
妊娠三四月自覺口乾舌燥咽喉微痛無津以潤胎動不安甚則血流如經水人以爲火動之極也誰知是水虧之甚乎夫胎也者本精與血之相結而成逐月養胎古人雖分經絡

其實均不離腎水之養故腎水足而胎安腎水虧而胎動或  
者曰腎水何能動胎必腎經之火動而胎始不安耳不知火  
之有餘仍是水之不足所以火炎而胎動者必補水而胎安  
亦既濟之義也惟是水不遽生必先補肺金能生水而火不  
難制再少加以清熱之品則胎自無不安矣方用潤燥安胎

湯

智誠集卷之三

水熟地一兩生地三錢山萸肉五錢麥冬五錢去心  
阿膠二錢蛤粉炒黃芩一錢酒炒益母二錢

水煎服二劑而燥息再二劑而胎安連服十劑而胎如磐  
石之固矣此方專填腎中之精而兼補肺然補肺仍是補

腎之意故腎不乾燥則火不灼胎焉有不安者乎

### 妊娠吐瀉腹痛

妊娠上吐下瀉腹痛急而難忍胎動不安人猶以爲熱而不知脾胃之虛極也夫脾胃氣虛則胞胎無力必有崩墜之虞況又上吐下瀉則脾胃因此益虛欲胞胎之無恙得乎然而尚不至於下墜者全賴腎氣之固也胞胎繫於腎而連於心腎氣固則上交於心而下通於胞胎此胞胎之所以欲墜而不得也且腎氣能固則少火必來生脾心氣能通則君火必來援胃脾胃雖虛未絕則胞胎雖動不墮然則欲固胞胎者可不急救其脾胃乎惟是脾胃當將絕未絕之時只救脾胃

而土難遽生更宜補其心腎之火使之生土則兩相接續胎始固耳方用援土固胎湯

人參一兩  
白朮二兩  
土炒  
山藥一兩  
炒  
山萸肉一兩  
蒸  
枸杞三錢  
菟絲子三錢  
酒炒  
杜仲三錢  
炒黑  
續斷三錢  
炙草一錢  
砂仁三粒  
炒研  
製附子五分  
去  
肉桂二分  
粗研

水煎服一劑而瀉止二劑而諸病悉愈矣此方救脾胃之土者十之八救心腎之火者十之二助火輕於救土者土欲絕而火未甚衰也蓋土崩非重劑不能援火衰雖小劑亦可助妊娠忌桂附是恐傷胎未可多用故方中小熱之品計之以錢大熱之品計之以分不過用以引火而非用

以壯火也若以爲胎必有熱輒用黃芩則大誤矣

妊娠少腹痛

妊娠少腹作痛胎動不安如有下墮之狀人只知帶脈無力也誰知是脾腎之虧乎夫胞胎雖繫於帶脈而帶脈實關於脾胃脾胃虧損胞胎卽無以勝任矣而或者曰胞胎之系通於心腎而不通於脾補腎可也何故補脾不知腎爲先天之本脾卽爲後天之本脾非先天之氣不能化而腎非後天之氣亦不能生是補後天之脾正所以補先天之腎也補先後之二天乃所以固胞胎之氣血也審是而脾腎可不均補乎

方用安奠二天湯

大田人參

一兩

白朮

一兩

土炒

扁豆

五錢

炒去皮

炙草

一錢

熟地

一兩

山藥

五錢

山萸肉

五錢

杜仲

三錢

炒黑

枸杞

一錢

水煎服一劑而疼止二劑而胎安矣夫胎動乃脾腎雙虧  
本之證自非大用參朮熟地補陽補陰之品斷不能挽回於  
頃刻世人畏用參朮或少用以冀建功見證不的是以寡  
效此方正妙在多用也

。妊娠浮腫

。妊娠浮腫

妊娠四五月肢體倦怠飲食無味先兩足腫漸至遍身頭面  
俱腫人以爲溼氣使然也誰知是脾肺氣虛乎夫妊娠雖有  
按月養胎之分其實不可拘於月數總以健脾補肺爲大綱

蓋脾統血肺主氣胎非氣不生非血不成脾健則血旺而蔭  
胎肺清則氣旺而益子苟肺衰則氣餒氣餒則不能運氣於  
皮膚矣脾虛則血少血少則不能運血於肢體矣氣血兩虛  
脾肺失職所以飲食難消精微不化勢必氣血下陷不能升  
舉而溼邪卽乘其所虛之處積而成浮腫之證非由氣血之  
虛而然耶治法補脾之血與肺之氣有不必祛溼而溼自無  
不去者方用加減補中益氣湯

其人參

五錢

黃芪

三錢生用

柴胡

一錢

甘草

一分

當歸

三錢酒洗

不白朮

五錢土炒

茯苓

一兩

升麻

三分

陳皮

三分

水煎服四劑卽愈十劑不再犯夫補中益氣湯之立法也

原是升提脾肺之氣似乎專益氣而不補血然而血非氣不生是補氣卽所以生血觀當歸補血湯之用黃芪爲君其效彰彰矣況溼氣乘脾肺之虛而相犯未便大補其血恐陰太盛而反招陰也只補氣而助以利溼之品則氣升而水尤易散血亦隨之而生矣然則何以重用茯苓而至一兩不幾以利溼爲君乎嗟嗟溼證而不以此藥爲君將以何者爲君乎況重用茯苓於補氣之中雖曰滲溼仍是建脾清肺之品且凡利溼者多耗氣而惟茯苓與參朮合用實爲補多於利所由重用之以分溼邪而卽以補氣血耳

妊娠腰腹疼渴汗躁狂

妊娠有口渴汗出大飲冷水而煩躁發狂腰腹疼痛胎若欲墮者人固知火盛之極也亦知何經之火盛乎此乃胃火炎熾熬煎胞胎之水以致胞中水涸胎失所養故動而不安耳夫胃爲水穀之海多氣多血之經所以養五臟六腑者以萬物皆生於土土氣厚而物始生土氣薄而物必死也然土之所以能厚全賴火氣以生之胃之能行水穀亦賴火氣以化之何反以火盛而致害乎不知無火難以生土而火多又能爍水雖土中有火土不死然亦必土中有水方不燥胃火太旺必致爍乾腎水土且自潤不足又何以分潤胞胎火勢炎

蒸兒胎受逼安得不下墜乎經所謂二陽之病發心脾者正如此義也治法必須滋水洩火使真水得旺則壯火自平火平而胎之狂躁自定矣方用息焚安胎湯

生地

一兩  
酒炒

青蒿

五錢

白朮

五錢

茯苓

三錢

人參

三錢

知母

二錢

花粉

二錢

水煎服一劑而狂少平二劑而狂大定三劑而火盡解胎亦安矣此方藥料頗重人或慮其太峻而不敢全用不知懷胎而火勝若此非大劑何以救焚火不息則狂不止而胎能安耶況方中滋水之味全用甘寒勿過慮也

妊娠子懸脇痛

妊婦有懷抱憂鬱以致胎動不安兩脇悶而疼痛如弓上弦人祇知是子懸之病也誰知是肝氣不通乎夫養胎固係於腎水而非肝血相助則腎水實有獨力難支之勢故保胎必滋其腎水而肝血亦斷不能不顧使肝之氣不鬱則肝之氣不閉而肝之血必旺自然灌溉胞胎合腎水而並協養胎之力今肝氣因鬱而閉則胎無血蔭子必上升此乃鬱氣使然莫認爲子之自懸而妄用洩子之品也治法開肝氣之鬱結補肝血之燥乾則子懸自定矣方用解鬱湯

人參一錢  
白朮五錢  
枳殼五分  
砂仁三分  
山梔三錢  
薄荷二錢

白朮土炒

砂仁炒研

山梔炒

薄荷炒

水煎服一劑而悶痛除二劑而子懸定三劑而全安矣去  
梔子再多服數劑病不復發此乃平肝解鬱之聖藥鬱開  
則木不剋土肝平則火不妄動方中又有健脾開胃之品  
自然水精四布而肝腎並有潤澤之機則胞胎自無乾燥  
之患又何慮子懸之不愈哉

○妊娠子鳴腰痛

妊娠七八月忽然兒啼腹中腰間隱隱作痛人以爲胎熱之  
故也誰知是氣虛之故乎夫兒之在胞胎也全憑母氣以化  
成母呼兒亦呼母吸兒亦吸未嘗有一息之間斷至七八箇  
月則母氣必虛兒不能隨母之氣以爲呼吸必有迫不及待

之勢子失母氣啼於腹中似可異而究無可異病名子鳴氣虛甚也治宜大補其氣使母氣與子氣和協啼自息矣方用扶氣止啼湯

人參一兩 黃芪一兩  
生用 麥冬一兩  
去心 當歸五錢  
酒洗 橘紅五分  
甘草一錢 花粉一錢

水煎服一劑而啼卽止二劑不再啼此方用參芪麥冬以補肺氣肺氣旺則胞胎之氣亦旺而胞中之子氣有不隨母氣以爲呼吸者未之有也

妊娠小便下血病名胎漏

妊娠有胎不動腹不疼而小便中時有流紅者人第知爲血

虛胎漏也誰知是陽不足而激經乎夫血能蔭胎而胎中之  
蔭血必賴氣以衛之氣虛下陷則蔭胎之血亦隨之而下矣  
蓋氣乃血之衛氣虛則血無憑依必燥急而生邪熱血寒則  
靜血熱則動動則外出而莫能遏又安得不下流乎治法宜  
補其氣之不足而洩其火之有餘則血自無不止矣方用助

### 氣補漏湯

人參一兩 白芍五錢  
酒炒黃芩三錢  
酒炒 黑 生地三錢  
酒炒  
益母草 一錢 繢斷二錢 甘草一錢

水煎服一劑而血止二劑而不復漏矣此方用人參以補  
陽氣用黃芩以洩陰火火洩則血不熱而無欲動之機氣