

仲景全書

上海千頃堂書局印行

集註傷寒論卷第六

仲景全書

漢長沙太守張仲景著

晉太醫令王叔和撰次

宋聊攝人成無已註解

宋祠部郎中林億校正

明虞山人

趙開美校句
沈林全校

錢塘

張卿子參

辨太陰脉證并治第十

太陰之為病腹滿而吐食不下。自利益甚。時腹自痛。若下之。必胸下結鞭。

太陰為病陽邪傳裏也太陰之脉布胃中邪氣壅而為腹滿上不得降者嘔吐而食不下下不得升者自利益甚時腹自痛陰寒在內而為腹痛者則為常痛此陽邪干裏雖痛而亦不常痛但時時腹自痛也若下之則陰邪留於胸下為結鞭經曰病發於陰而反下之因作痞王三陽云此風寒中於太陰經非陽邪傳裏也若陽邪傳裏正當下之何結鞭之有况痞字與鞭字亦有分別邪之初起必先入經而後入腑臟此邪中太陰經其痞猶在上膈非中臟腑之陰證也當用辛甘之藥溫散之則邪散去而自和矣今誤下之則邪氣乘虛入胸膈間作鞭耳

黃仲理云宜理中湯陰經少有用桂枝者如此證若肺浮即用桂枝湯微汗之若惡寒不已者非理中四逆不可

成本不
得上之
上作升

宋板脉
上有病
字
宋板註
合三法
方三首

成本向
陽作向

宋板桂枝湯方
一桂枝
三兩
去皮
甘草
二兩
炙
三兩
二兩
切
十二枚
切
七升
煮
七升
取
三升
溫
服
一升
須臾
更服
熱稀粥

太陰中風四肢煩疼陽微陰澁而長者為欲愈

太陰脾也主營四末太陰中風四肢煩疼者風淫末疾也表邪少則微裏向和則澁而長長者陽也陰病見陽脉則生以陰得陽則解故云欲愈

太陰病欲解時從亥至丑上

脾為陰土王於丑亥子向陽故云解時

太陰病脉浮者可發汗宜桂枝湯

經曰浮為在表沉為在裏太陰病脉浮者邪在經也故當汗散之

王宇泰云在太陽則脉浮無汗宜麻黃湯此脉浮當亦無汗而不言者謂陰不得有汗不必言也不用麻黃而用桂枝者以陰病不當更發其陽也須識無汗亦有用桂枝證

自利不渴者屬太陰以其藏有寒故也當溫之宜服四逆輩

自利而渴者屬少陰為寒在下焦自利不渴者屬太陰為寒在中焦與四逆等湯以溫其臟

張兼善云經言輩字謂藥性同類惟輕重優劣不同耳四逆湯甘辛相合乃大熱之劑苟輕用之恐有過度之失所以仲景不為定擬也莫若以理中循循而用之至為穩當

一升以助藥力
溫覆取汗

成本二
而作爾

三
宋板桂枝湯方
桂枝三兩
芍藥六兩
甘草二兩
大棗十二枚
生薑二兩
五味以水七升

傷寒脉浮而緩手足自溫者繫在太陰太陰當發身黃若小便自利者不能發黃至七八日雖暴煩下利日十餘行必自止以脾家實腐穢當去故也

太陰病至七八日大便鞭者為太陰入府傳於陽明也今至七八日暴煩下利十餘行者脾家實腐穢去也下利煩燥者死此以脾氣和逐邪下泄故雖暴煩下利日十餘行而利必自止

本太陽病醫反下之因而腹滿時痛者屬太陰也桂枝加芍藥湯主之表邪未罷醫下之邪因乘虛傳於太陰裏氣不和故腹滿時痛與桂枝湯以解表加芍藥以和裏

桂枝加芍藥湯方 第八十三

於桂枝湯方內更加芍藥三兩隨前共六兩餘依桂枝湯法

大實痛者桂枝加大黃湯主之

大實大滿自可除下之故加大黃以下大實

桂枝加大黃湯方 第八十四

桂枝三兩 芍藥六兩 生薑三兩切 甘草二兩炙
大棗十二枚 去皮

大棗十二枚 去皮

右六味以水七升煮取三升去滓溫服一升日三服

煮取三升去滓
溫分三服本云桂枝湯今加芍藥成本下
大實作除大實
宋板大黃一兩
二兩
宋板註
下利者
先煎芍藥二兩
宋板註
合二十
三法方
十九首

婁氏云用四逆輩固所當然復用桂枝大黃夫大黃大寒何為用于陰經又兼桂枝寒熱相雜何也曰自利而渴者屬少陰為寒在下焦自利不渴者屬太陰為寒在中焦以四逆等湯溫其藏此本經當用之藥也其太陽病反下之表邪未解乘虛傳於太陰因而腹滿時痛大實痛者桂枝加芍藥大黃為宜趙嗣真云太陰腹滿證有三有次第傳經之邪有直入本經之邪有下後內陷之邪不可不辨

太陰為病脉弱其人續自便利設當行大黃芍藥者宜減之以其人胃氣弱易動故也

腹滿痛者太陰病也脉弱其人續自便利則邪雖在裏未成大實欲與大黃芍藥攻滿痛者宜少與之以胃氣尚弱易為動利也

辨少陰病脉證并治 第十二

少陰之為病脉微細但欲寐也

少陰為病脉微細為邪氣傳裏深也衛氣行於陽則寤行於陰則寐邪傳少陰則氣行於陰而不行於陽故但欲寐

少陰病欲吐不吐心煩但欲寐五六日自利而渴者屬少陰也虛故引水自救若小便色白者少陰病形悉具小便白者以下焦虛有寒不能制水故令色白也

成本少
陰傷寒
作少陰
寒

欲吐不吐心煩者表邪傳裏也若腹滿痛則屬太陰此但欲寐則知屬少陰五六日邪傳少陰之時自利不渴者寒在中焦屬太陰此自利而渴為寒在下焦屬少陰腎虛水燥渴欲引水自救下焦虛寒不能制水小便色白也經曰下利欲飲水者以有熱故也此下利雖渴然以小便色白明非裏熱不可不察

王三陽云此寒中陰經而傳入陰臟者雖引水自救浮陽在上也若有大渴方可論陽邪傳陰熱證

病人脉陰陽俱緊反汗出者亡陽也此屬少陰法當咽痛而復吐利

脉陰陽俱緊為少陰傷寒法當無汗反汗出者陽虛不固也故云亡陽以無陽陰獨是屬少陰內經曰邪客少陰之絡令人嗌痛不可內食少陰寒甚是當咽痛而復吐利

少陰病欬而下利讞語者被火氣劫故也小便必難以強責少陰汗也

欬而下利裏寒而亡津液也反以火劫強責少陰汗者津液內竭加火氣煩之故讞語小便難也

少陰病脉細沉數病為在裏不可發汗

少陰病始得之反發熱脉沉者為邪在經可與麻黃附子細辛湯發汗此少

陰病脉細沉數為病在裏故不可發汗

王三陽云此無發熱證故不可汗

少陰病脉微不可發汗亡陽故也陽已虛尺脉弱濇者復不可下之

脉微為亡陽表虛不可發汗脉弱濇為亡陽裏虛復不可下

王三陽云脉弱濇濇者陰也濇為血少乃亡陰也故不可下陽字誤

少陰病脉緊至七八日自下利脉暴微手足反溫脉緊反去者為欲解也雖煩下利必自愈

少陰病脉緊者寒甚也至七八日傳經盡欲解之時自下利脉暴微者寒氣得泄也若陰寒勝正陽虛而泄者則手足厥而脉緊不去今手足反溫脉緊反去知陽氣復寒氣去故為欲解下利煩躁者逆此正勝邪微雖煩下利必自止

少陰病下利若利自止惡寒而踰卧手足溫者可治

少陰病下利惡寒踰卧寒極而陰勝也利自止手足溫者裏和陽氣得復故為可治

少陰病惡寒而踰時自煩欲去衣被者可治

惡寒而踰陰寒甚也時時自煩欲去衣被為陽氣得復故云可治

少陰中風脉陽微陰浮者為欲愈

少陰中風陽脉當浮而陽脉微者表邪緩也陰脉當沉而陰脉浮者裏氣和也陽中有陰陰中有陽陰陽調和故為欲愈

少陰病欲解時從子至寅上

陽生於子子為一陽丑為二陽寅為三陽少陰解於此者陰得陽則解也

少陰病吐利手足不逆冷反發熱者不死脉不至者灸少陰七壯

經曰少陰病吐利躁煩四逆者死吐利手足不厥冷者則陽氣不衰雖反發熱不死脉不至者吐利暴虛也灸少陰七壯以通其脉

少陰病八九日一身手足盡熱者以熱在膀胱必便血也

膀胱太陽也少陰太陽為表裏少陰病至八九日寒邪變熱復傳太陽太陽為諸陽主氣熱在太陽故一身手足盡熱太陽經多血少氣為熱所乘則血

散下行必便血也

少陰病但厥無汗而強發之必動其血未知從何道出或從口鼻或從目出是名下厥上竭為難治

但厥無汗熱行於裏也而強發汗虛其經絡熱乘經虛迫血妄行從虛而出或從口鼻或從目出諸厥者皆屬於下但厥為下厥血亡於上為上厥下竭

宋板從目出作從目出者

宋板註至一作足成本無不至者之者

為上二字多成本無之

成本難已作難治

成本知死作便知

宋板註一作吐利而躁逆者死

傷氣損血邪甚正虛故為難治

王宇泰云但厥無汗熱入裏而外寒甚也當溫之而強發其汗則衛寒甚而汗不能出必內傷其榮血而妄行也

少陰病惡寒身踈而利手足逆冷者不治

鍼經曰多熱者易已多寒者難已此內外寒極純陰無陽故云不治

少陰病吐利躁煩四逆者死

吐利者寒甚於裏四逆者寒甚於表躁煩則陽氣欲絕是知死矣

少陰病下利止而頭眩時時自冒者死

下利止則水穀竭眩冒則陽氣脫故死

少陰病四逆惡寒而身踈脉不至不煩而躁者死

四逆惡寒而身踈則寒甚脉不至則真氣絕煩熱也躁亂也若憤躁之躁從煩至躁為熱來有漸則猶可不煩而躁是氣欲脫而爭也譬猶燈將滅而暴明其能久乎

少陰病六七日息高者死

腎為生氣之源呼吸之門少陰病六七日不愈而息高者生氣斷絕也

少陰病脉微細沉但欲卧汗出不煩自欲吐至五六日自利復煩躁不得卧寐

者死

陰氣方盛至五六日傳經盡陽氣得復則愈反更自利煩躁不得卧寐則正氣弱陽不能復病勝藏故死

少陰病始得之反發熱脉沉者麻黃附子細辛湯主之

少陰病當無熱惡寒反發熱者邪在表也雖脉沉以始得則邪氣未深亦當溫劑發汗以散之

麻黃附子細辛湯方

〔第八十五〕

麻黃

二兩去節味甘熱

細辛

二兩味辛熱

附子

一枚炮去皮破片味辛熱

右三味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫內藥煮取三升去滓溫服一升日

三服

內經曰寒淫於內治以甘熱佐以苦辛以辛潤之麻黃之甘以解少陰之寒細辛附子之辛以溫少陰之經

少陰病得之二三日麻黃附子甘草湯微發汗以二三日無裏證故微發汗也二三日邪未深也既無吐利厥逆諸裏證則可與麻黃附子甘草湯微汗以

散之

麻黃附子甘草湯方

〔第八十六〕

成本寒
氣作經

麻黃

二兩
去節

甘草

二兩
炙

附子

一兩
炮
去皮

右三味以水七升先煮麻黃一兩沸去上沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升日三服

麻黃甘草之甘以散表寒附子之辛以溫寒氣

趙嗣真云仲景發汗湯劑各分輕重不同至少陰發汗二湯其第十證以少陰本無熱今發熱故云反也蓋發熱為邪在表而當汗又兼脉沉屬陰而當溫故以附子溫經麻黃散寒而熱須汗解故加細辛是汗劑之重者第二證既無裏寒之可溫又無裏熱之可下未具所以用麻黃附子之義則是脉亦沉方可名曰少陰病身亦發熱方行發汗藥又得之二三日病尚淺比之前證亦稍輕故不重言脉證而但曰微發汗所以去細辛加甘草是汗劑之輕者又云四逆生附配乾姜補中有發二湯熟附配麻黃發中有補

三

少陰病得之二三日以上心中煩不得卧黃連阿膠湯主之

脉經曰風傷陽寒傷陰少陰受病則得之於寒二三日已上寒極變熱之時熱煩於內心中煩不得卧也與黃連阿膠湯扶陰散熱

黃連阿膠湯方

〔第八十七〕

黃連

四兩
味苦

黃芩

一兩
味苦寒

芍藥

二兩
味酸平

雞子黃

二枚
味甘溫

宋板黃
芩一兩
作黃芩
二兩

宋板水
五升作
水六升

四

成本去
皮上有
破八片
三字無
字

阿膠

三兩味甘溫

右五味以水五升先煮三物取二升去滓內膠烱盡少冷內雞子黃攪令相得溫服七合日三服

陽有餘以苦除之黃芩黃連之苦以除熱陰不足以甘補之雞黃阿膠之甘以補血酸收也泄也芍藥之酸收陰氣而泄邪熱

少陰病得之一二日口中和其背惡寒者當灸之附子湯主之

少陰客熱則口燥舌乾而渴口中和者不苦不燥是無熱也背為陽背惡寒者陽氣弱陰氣勝也經曰無熱惡寒者發於陰也灸之助陽消陰與附子湯溫經散寒

附子湯方

〔第八十八〕

附子

二枚去皮味辛熱

茯苓

三兩味甘平

人參

二兩味甘溫

白朮

四兩味甘溫

芍藥

三兩味酸平

右五味以水八升煮取三升去滓溫服一升日三服

辛以散之附子之辛以散寒甘以緩之茯苓人參白朮之甘以補陽酸以收之芍藥之酸以扶陰所以然者偏陰偏陽則為病大欲實水當平之不欲偏勝也

王宇泰云背惡寒者陰寒氣盛此條是也又或陽氣內陷有背微惡寒者經所謂傷寒無大熱口燥渴心煩者微惡寒白虎加人參湯主之是也一為陰寒氣盛一為陽氣內陷當於口中潤燥辨之

少陰病身體痛手足寒骨節痛脉沉者附子湯主之

少陰腎水而主骨節身體疼痛支冷脉沉者寒成於陰也身疼骨痛若脉浮手足熱則可發汗此手足寒脉沉故當與附子湯溫經

少陰病下利便膿血者桃花湯主之

陽病下利便膿血者協熱也少陰病下利便膿血者下焦不約而裏寒也與桃花湯固下散寒

桃花湯方〔第八十九〕

赤石脂

一斤一半全用一半歸末味甘溫

乾薑

一兩味辛熱

粳米

一升味甘平

右三味以水七升煮米令熟去滓溫服七合內赤石脂末方寸七日三服若一服愈餘勿服

瀉可去脫赤石脂之瀉以固腸胃辛以散之乾薑之辛以散裏寒粳米之甘以補正氣

少陰病二三日至四五日腹痛小便不利下利不止便膿血者桃花湯主之

咸本服
滿作腹
痛宋注
用前第
六方成
本無痛
者之者

八

宋板吳
茱萸湯
吳九
升人參
二兩生
姜六兩
切大棗
十二枚
學右四
味以水
七升煮
取二升
去滓溫
服七合

二三日以至四五日寒邪入裏深也腹痛者裏寒也小便不利者水穀不別也下利不止便膿血者腸胃虛弱下焦不固也與桃花湯固腸止利也吳氏云凡下血便膿血有陰陽冷熱之不同古人云見血無寒又言血得熱而行此大槩之言也

略曰陽證內熱則溢去鮮血陰證內寒則下紫黑如豚肝也

少陰病下利便膿血者可刺

下焦血氣留聚腐化則為膿血刺之以利下焦宣通血氣

少陰病吐利手足厥冷煩燥欲死者吳茱萸湯主之

吐利手足厥冷則陰寒氣甚煩燥欲死者陽氣內爭與吳茱萸湯助陽散寒

少陰病下利咽痛胸滿心煩者豬膚湯主之

少陰之脈從腎上貫肝膈入肺中循喉嚨其支別者從肺出絡心注胸中邪

自陽經傳於少陰陰虛客熱下利咽痛胸滿心煩也與豬膚湯調陰散熱

豬膚湯方〔第九十〕

豬膚一斤味甘寒

右一味以水一斗煮取五升去滓加白蜜一升白粉五合熬香和相得溫分六服豬水畜也其氣先入腎少陰客熱是以豬膚解之加白蜜以潤燥除煩白粉

日三服
宋板
相和
得令
作和
相得
傳字
本成
搏作

風本使
咽中之
下有傷
字

以益氣斷利

少陰病二三日咽痛者可與甘草湯不差者與桔梗湯

陽邪傳於少陰邪熱為咽痛服甘草湯則差若寒熱相傳為咽痛者服甘草湯若不差與桔梗湯以和少陰之氣

甘草湯方

〔第九十一〕

甘草二兩

右一味以水三升煮取一升半去滓溫服七合日二服

桔梗湯方

〔第九十二〕

桔梗一兩

微溫辛

甘草二兩

味甘平

右二味以水三升煮取一升去滓分溫再服

桔梗辛溫以散寒甘草味甘平以除熱桔梗相合以調寒熱

少陰病咽中傷生瘡不能語言聲不出者苦酒湯主之

熱傷於絡則經絡乾燥使咽中生瘡不能言語聲不出者與苦酒湯以解絡

熱愈咽瘡

苦酒湯方

〔第九十三〕

半夏十四枚

洗破如棗核大

雞子一枚

去黃內上苦酒

宋板錄
作本無
服之二
字

成本無
散一之
一字
宋板有
半夏有
毒不當
散服

十二

右二味內半夏着苦酒中以雞子殼置刀鐸中安火上令三沸去滓少少含嚥之不差更作三劑服之

辛以散之半夏之辛以發聲音甘以緩之雞子之甘以緩咽痛酸以收之苦酒之酸以斂咽瘡

王宇泰云按苦酒本草注曰酸而成氏復云苦酒之酸余則以為名義俱乖安知酒之味苦者不可以已咽痛耶若嫌苦酒性熱則半夏湯更辛況此味苦哉下文發字與斂字自相反

少陰病咽中痛半夏散及湯主之

甘草湯主少陰客熱咽痛桔梗湯主少陰寒熱相搏咽痛半夏散及湯主少陰客寒咽痛也

半夏散及湯方 [第九十四]

半夏

洗味辛溫

桂枝

去皮味辛熱

甘草

炙味甘平以上各等分

已上三味各別搗篩已合治之白飲和服方寸匕日三服若不能散服者以水一升取七沸內散一兩方寸匕更煎三沸下火令小冷少少嚥之

內經曰寒淫所勝平以辛熱佐以甘苦半夏桂枝之辛以散經寒甘草之甘以緩正氣

少陰病下利白通湯主之

少陰主水少陰客寒不能制水故自利也白通湯溫裏散寒

白通湯方〔第九十五〕

葱白

四莖味辛溫

乾薑

一兩味辛熱

附子

一枚生用去皮破八片味辛熱

右三味以水三升煮取一升去滓分溫再服

內經曰腎苦燥急食辛以潤之葱白之辛以通陽氣乾薑附子之辛以散陰寒

張兼善云白通湯及白通加豬膽湯真武湯與通脈四逆湯皆為少陰下利而設除用薑附相同其餘之藥各異何也蓋少陰下利寒氣已甚非姜附則不能治然下利之理無殊而兼有之證不一用藥故不同耳

少陰病下利脈微者與白通湯利不止厥逆無脈乾嘔煩者白通加豬膽汁湯主之服湯脈暴出者死微續者生

少陰病下利脈微為寒極陰勝與白通湯復陽散寒服湯利不止厥逆無脈乾嘔煩者寒氣太甚內為格拒陽氣逆亂也與白通湯和豬膽汁湯以和之內經曰逆而從之從而逆之又曰逆者正治從者反治此之謂也服湯脈暴出者正氣因發泄而脫也故死脈微續者陽氣漸復也故生