

陽明脈證上

陽明之為病胃家實也

此陽明與熱論不同熱論以肌肉言此以胃府言也

問曰陽明

胃實

病外證云何答曰身熱

陽氣盛也

汗自出

熱氣不蒸也

惡寒

邪不在表

反惡熱也

熱在內太陽中風亦身熱汗出但太陽惡寒陽明反惡熱

陽明病脈浮而緊者

熱溢於肌外則浮熱促於絡中則緊太陽傷營脈亦浮緊但太陽身常熱陽

明不必潮熱發作有時

日晡時也陽明為老陽常熱日晡亦老陽時故也

但浮而緊者

陽道

必盜汗出

熱則陽道之氣入於陰道氣盛熱入蒸其陰道而汗出也

傷寒三日陽明脈大

陽明氣血俱多脈應其象也

脈浮而大心下反鞭身熱

胃實病矣然胃實有因胃自熱而實者有脾移熱於胃而實者一屬

胃府一屬脾臟不同也若

屬脾

臟者

太陰下法

攻之不令發汗

若

屬胃

府者胃

傷寒法眼卷下

傷不令溲數

更竭其津液以致

便鞭

仍當汗解

汗多則

熱洩

愈汗少則

熱

洩則內燥胃津則內燥胃

便難

胃熱久蓄勢必傳於脾雖非臟亦可攻但

脈遲

是脾虛

尚未可攻

必脾胃俱熱乃可攻也

此條論屬胃屬脾兩證但言治法未言辨證按屬脾屬胃

之辨在能食不能食能食屬胃不能食屬脾見下陰結陽

結條中

傷寒嘔多

胃口有風有水不定

雖有陽明

胃實

症不可攻

恐反引邪入裡也

陽明

胃實

病自汗出若發汗

傷津液

小便自利

熱不在

此為津

液內竭大便雖鞭

是胃燥非脾熱

不可攻之當須

津液還入胃中

自欲大便

不必宜蜜導以通之若土瓜根及與大猪膽湯可為導



陽明胃實病心下鞭滿腹不滿熱在胃不在脾者不可攻之攻之傷其脾

利遂不止者脾絕死利止者胃熱去而脾不傷愈

陽明病本自汗出醫更重發汗表病已差尙微煩不了了者

此必表解而裡不和大便鞭故也以亡津液胃中乾燥故令大便鞭

當問其小便日幾行若本小便日三四行今日再行故知大

便不久出何以知之今爲其小便之數少以津液不從小便行當還入

胃中故知不久必大便也

蜜煎方 蜜七合

右一味於銅器內煎凝如飴狀攪之勿令焦着欲可丸併

手捻作挺令頭銳大如指長二寸許當熱時急作冷則硬

傷寒法眼卷下

二

以納穀道中欲大便時乃去之

猪膽汁方

大猪膽一枚搗汁加醋少許以灌穀道中如一食頃當大

便出宿食惡物甚效

問曰病有得之一日不發熱而惡寒者何也答曰雖得之一

日惡寒將自罷卽自汗出而發熱也此陽明受邪或從經穴入或從口鼻入不在元

府故不卽發熱以有寒邪故仍惡寒而陽明爲兩陽合明之地陽氣至盛寒雖入而易化故不久寒自化熱汗出而發熱也

問曰惡寒何故自罷答曰陽明居中土也萬物所歸無所復

傳始雖惡寒二日自止此爲陽明病也此申上條之義



問曰太陽緣何而得陽明病、答曰太陽病若發汗、若下、若利、小便、亡津液、胃中乾燥、因轉屬陽明、胃實大便難、此名陽明也、

陽寸脈微而汗出少者為自和也、汗出多者為太過、陽脈實

因發其汗、出多者亦為太過、凡汗太過為陽實于裡、亡津液、有

則氣化無液、則氣不化、不化則結而為陽實、亡津液所致、大便因之鞭也、太陽病汗少則

則轉屬陽明、傷津也、本太陽病初得時發其汗、汗先出不徹、微止因轉

屬陽明也、

傷寒轉屬陽明

胃者其人澼然微汗出也、熱蒸故汗出、實者其人澼然微汗出也、津少故汗微、

傷寒發熱無汗、

本屬太陽、今一變而為

嘔不能食、而反汗出澼澼然者、

傷寒法眼卷下

三

熱移於胃、胃熱升於裡而嘔、不能食、蒸於外而汗澼澼然、是轉屬陽明也、上條是已成陽明之病、形此條是初成陽明之病、機也、

太陽病寸緩關浮尺弱、

脾陽虛之脈也、

其人

本

發熱汗出、

汗出表解、不應惡寒、

今復惡寒、

是其惡寒不因表邪、而因裡虛、何以見之、

不嘔

是胃氣不升、

但心下痞者、

是脾

陽不此醫下之

致其脾也、

如下之

不下者、

不成脾、胃兩虛而轉成脾虛胃實、

病人不惡寒

無表邪也、

而渴者、

有胃熱也、

此轉屬陽明也、

蓋陽氣隨下藥而退入胃中、

胃中津液受傷、胃燥反不得下、然燥在胃而虛在脾、脾虛不能遊溢、水精而輸於上、水必直趨下焦、而小便數、

數者大便必鞭、凡大便鞭屬脾虛者必苦滿痛、

不大便十日、

不滿

無所苦也、

是胃燥、

渴欲飲水、

胃燥

少少與之、

以滋其胃、

但以法救之、

宜五苓散

五苓散提舉脾陽、即救胃燥、一舉而兩得矣、

還滋胃燥、

救脾虛、

即救胃燥、

一舉而兩得矣、

救之、

以滋其胃、

但以法

救之、

以滋其胃、



傷寒脈浮緩手足

不熱而

自溫者繫在太陰

盛濕

太陰

盛濕

者身當

發黃若小便利

濕有所去

不能發黃至七八日大便鞭者

濕從燥化

為

陽明

胃實

病也

問曰病有陽結陰結何以別之答曰其脈浮而數能食不大

便者

胃中熱也

此為胃實名曰

胃

陽結

熱也

也期十七日當劇其脈

沉遲不能食身重

脾中熱伏

大便反鞭名曰

脾

陰結

熱也

也期十四

日常劇

胃結宜和以小承氣脾結可攻以大承氣

陽明

胃實

病脈遲汗出多微惡寒者表未解也

胃雖實

可發汗宜

桂枝湯

汗出多者衛中汗可發汗者營中汗也

陽明

胃實

病脈浮無汗而喘者

毛孔不開肺氣不利

發汗則愈

發衛中汗也

宜

傷寒法眼卷下

四

麻黃湯

脈浮而遲面熱赤而戰惕者六七日當汗出而解脈遲為無

陽不能作汗其身必痒

此條是邪中於面者素問所謂中於面則下陽明者也脈

遲者其人胃氣素虛故邪得以中其面面屬陽明也浮為

有風面有風風與火搏故面熱而赤陽虛而怯故戰惕且

難作汗至六七日汗始出然當未出之時汗走於皮膚間

必作痒也

陽明病法多汗

陽明津液多也

反無汗其身如虫行皮膚中此久虛

汗欲出不得出而

故也

走動於皮膚中



陽明膺病反無汗身不受邪也而小便利腹不受邪也二三日嘔膺

化水停而咳水射肺也手足厥逆者必苦頭痛胃氣本出頭面諸

足冷、水壓胃氣不能於胃也若不咳不嘔手足不厥者胃口有水故手

頭亦不痛

陽明面中風病但頭眩身不受邪不惡寒頭為諸陽之故能

食邪不在胃府也而咳其人必咽痛風火搏於咽喉也如不咳風火咽亦不

痛

陽明病口燥但欲漱水不欲嚥者此陽明面上必衄血

脈浮發熱口乾鼻燥熱在絡能食者熱在胃則衄

傷寒四五日脈沉而喘滿喘滿脈浮氣沉為在膈下裡而反

傷寒法眼卷下

五

發其表汗津液越出裡熱必結大便為難表虛裡實久則詰語內

也燥屎

發汗多若重發汗者亡其陽營汗多則亡陰詰語出於少陰脈短

者陽無根也死脈白和者陽不離根不死

詰語直視喘滿者陽上脫也死下利者陽下脫也亦死

夫邪實則詰語正虛則鄭聲鄭聲重語也一語而再三言之耳非妄言乃神不

守也

陽明病下血詰語者為熱入血室血熱妄行故下血血屬刺

期門足太陰厥陰隨其實而瀉之微貌汗出則愈營中熱洩

也



蓄血症何以但頭上有汗蓄血者陰脈不通頭上無陰脈無陰脈之處自通也

婦人中風發熱惡寒

邪本在表

經水適來七八日

血道空虛

熱除而脈

遲身涼

熱去脈外而人脈中也

胸脇下滿如結胸狀

脈絡不通而脹也

訖語者

此爲熱入血室也刺期門

陰脈會穴

隨其實而洩之

婦人傷寒發熱經水適來晝則了了暮則訖語如見鬼狀

日暮

陽氣人陰陰中有陽兩陽併爭陰不得靜也

此爲熱入血室無犯胃氣及上下二

焦必自愈

邪乘虛人於營道必血足而後邪去惟食能生血胃氣存乃能食從上焦發汗從下焦攻下皆傷胃

氣故皆當禁



陽明脈證下

陽明府胃中風口苦咽乾腹滿口為胃竅咽為胃門腹為胃室乾苦者風燥之滿者風鼓之也

微喘發熱惡寒胃陽不通也脈浮風也而緊欲傳脾也若下之則入腹滿

脾得風而脹不能行津液而小便難也

陽明府胃中風脈浮大弦胃風入脾也而短腹部滿脇下及心痛久

按之氣不得通脾被風脹不得動也鼻乾脾不得行津液而輸於肺也不得汗風不出也

嗜臥一身及面目皆黃水困於脾也小便難脾不行水水不下流也有潮熱

時時噦三焦水鬱火也耳前後腫少陽氣壅也刺之小差此句緊頂上句經氣得刺暫通

此外各症不解病過十日脈弦浮者風出少陽也與小柴胡湯脈但

浮無別餘症者風出太陽也與麻黃湯若過十日不尿腹加滿加

傷寒法眼卷下

七

噦是脾全無動機水勢日盛也不治

陽明府胃中風病若能食是傷衛名中風不能食是傷營名中寒風寒

同氣因淺深而別其名

陽明府胃病若中寒不能食胃寒傳脾脾陽傷不轉穀故也小便不利脾不行水也

手足澀然汗出脾主四肢陽氣不週而汗出也此欲作固瘕必大便鞭物不化也

後溏水不以胃中冷水穀不別故也穀不別故先鞭水不別故後溏甚則固瘕也

陽明府胃病不能食胃中以有營氣故能消化穀食營氣被寒所鬱故不能食而似有熱攻其熱

助其邪氣之寒愈激其營氣之熱必噦以其人本胃陽受傷虛是火被水鬱故攻

其熱必噦若胃中虛冷不能食者飲水必噦

陽明府胃病脈遲腹滿是脾虛食難用飽脾不轉穀也飽則微煩頭眩



穀氣薰必小便難脾不行水也此欲作穀疸雖下之腹滿如故所

以然者脈遲是脾虛非胃實故也

傷寒脈遲六七日而反與黃芩湯徹其熱脈遲為寒脾陽不藏移於

胃似胃熱而實脾寒今與黃芩湯復除其熱腹中應冷當不能食今反

能食此脾陽越出於胃名除中中焦陽除也必死

陽明胃府傷於冷飲病初水始入胃穀氣未傷欲食水多應小便反不利

大便又不澹而仍自調知穀氣強其人骨節疼翕然如有熱狀是穀氣與寒氣

交爭於胃陽明主束筋骨筋骨應之而疼也奄然發狂汗出而解者此水不勝穀

氣水氣因與穀氣汗而出翕然熱奄然狂者穀氣之熱發動也汗出則散矣脈緊是其候也陽搏

其陰故緊則愈若脈遲是陽氣不足初雖欲食至六七日不欲食穀氣不勝

傷寒法眼卷下 八

水氣也此為晚發水停故也或為固瘕或為穀疸所發不定要之水在為未解食自

可者穀氣不敗為欲解

傷寒大吐大下之極虛極復汗中氣不反覺外氣拂鬱以其復與

之水以發其汗因噦所以然者胃中虛冷氣不能聚於內故也

陽明病欲解時從申至戌上



梔子豉湯證

陽明胃口病脈浮風在膈上也而緊胃氣與風搏也咽燥口苦胃風扇動心火也

腹滿胃氣為風遏抑不通也而喘胃氣欲達不得達也發熱汗出不惡寒反惡熱

胃熱也身重陽明主束筋骨而利機關胃氣不行故機關不利也少陰亦身重但少陰病在督脈必腰無力陽明

病在四肢腰有力以此為辨若發汗傷心液則燥心憤憤而詰語此詰語出於心當喜

樂而非怒詈若加燒鍼引動心火心忪惕心陽散失也煩躁不得眠心腎不交也

若作燥矢而誤下之胃中空虛不能拒在上之客邪客氣本在賁門之上未過膈誤下之而空

其胃遂乘虛而下動膈凡以上諸症但見心中懊懣舌上胎者梔子豉湯

主之

若渴欲飲水口乾舌燥者是賁門上之熱移於胃中胃津乾涸胃陰不降也白虎加

傷寒法眼卷下

九

人參湯主之

若脈浮發熱渴欲飲水是胃口移熱於心也小便不利心又移熱於小腸也猪苓

湯主之此與上二條是梔子豉湯變法上條是賁門之熱下移於胃此條是賁門之熱上移於心

發汗吐下後胃虛煩木火乘之也不得眠胃不和也若劇者必反覆顛

倒心中懊懣相火與君火相爭不得安也梔子豉湯主之若少氣者煩極必傷

氣也梔子甘草豉湯主之若嘔胃虛熱入虛熱相搏為嘔也梔子生薑湯主

之

發汗熱在表若下之反攻其裡而發煩熱胸中窒者熱氣乘虛入於胃也梔子

豉湯主之

下後更煩按之心下濡者無物可知為空虛無有形之物多煩無形之火而發



也宜梔子豉湯。

陽明

胃病本應口吐而

下之。

上焦之熱下不能去故熱仍在

其外有熱手足溫。

是胸中之

熱未散也當作結胃今

不結胸心中懊憹。

胃口之熱上加於心火不安也

饑胃中無物

也不能食。

胃口有邪邪熱不消穀也

但頭汗出。

熱氣上蒸於頭也

梔子豉湯主之。

傷寒五六日

胃上下皆熱

大下後。

賁門下之熱已去賁門上之熱不爲下解

身熱不去

心中結痛者。

賁門上之

熱未解也。梔子豉湯主之。

梔子豉湯

梔子

十四枚

香豉

四合棉裹

右二味以水四升先煮梔子約二升半內豉煮取升半去

渣分二服溫進一服得吐止後服。

傷寒法眼卷下

十

梔子甘草豉湯

本方加甘草二兩餘同前法。

梔子生薑豉湯

本方加生薑五兩餘同前法。

此上焦湧泄之劑也。病不在身軀不當汗不在胃府不當

下。梔子苦能洩熱寒能勝熱豆豉香浮上行一吐而病解

矣。

傷寒

胃實

醫以丸藥大下之。

中焦裡熱去而反寒上焦表熱在而仍熱

身熱不去微

煩者。梔子乾薑湯主之。

傷寒下後心煩腹滿起臥不安者。梔子厚朴湯主之。



梔子乾薑湯

梔子十四枚 乾薑二兩

右二味以水二升煮取一升半去滓分二服溫進一服

梔子厚朴湯

梔子十四枚 厚朴四面 枳實 餘同前法

按梔子屈曲下行下不是吐藥惟豆豉腐氣上薰心肺能令人吐此二方一去豉用薑取其橫散一去豉用枳朴取其下洩皆梔豉湯變法下又有梔子檨皮湯并非吐法

傷寒發黃者胃熱移於心也梔子柏皮湯主之

梔子檨皮湯

傷寒法眼卷下

土

梔子十五枚 甘草二兩 黃檨

右三味以水四升煮取一升半去滓分溫再服

陽明病無汗熱不得洩也小便不利心中懊憹熱移於心也身必發黃

上條言傷寒發黃未言陽明亦未言其故此補言之

陽明胃熱病被火劫其心液額上微汗出額爲心部也而小便不利者心氣

不降也必發黃

陽明表熱病面合赤色不可下之下之熱汗不出閉於肌膚中必發黃小便

不利也

太陽發黃有二法但頭汗出小便不利爲熱鬱元府麻黃連翹湯汗之小腹硬小便自利爲淤蓄膀胱抵當湯下之



陽明發黃有二法，但頭汗出，小便不利，腹滿爲胃熱移脾，茵陳大黃湯下之。身熱懊憹，小便不利，爲胃熱移心，梔子柏皮湯清之。

凡用梔子湯，病人舊微溏者，不可與服之。梔子爲上焦熱用，脾虛者忌之。



瓜蒂散證

病如桂枝證如其發熱也而頭不痛項不强邪不在身形而在胷中也寸脈微浮

胃陽與胷中邪爭也胸中痞滿胃陽欲升不得升也氣上冲咽喉不得息者此為

邪中於膈胸中有寒胃陽不達也當吐之升胃陽以散上寒宜瓜蒂散

病人手足厥冷胃陽不外達也脈乍緊者胃陽與寒邪相搏也邪結在胸中心

下滿而煩胃陽鬱積欲出不得出也飢多火也胃中反不能食者胃上有寒胃不和也病

在胸中當吐之宜瓜蒂散太陽結胸硬滿痛為有形宜下陽明結胃痞滿不痛為無形宜吐

少陰症心腎相通之管有客氣飲食入口客氣內動則吐心中溫溫氣有餘便為熱

也欲吐復不能吐有氣無物故也始得之手足寒脈弦遲者君火為外寒所

伏此胸中心腎相通之管無形之氣鬱而實非胃中有形之物實不可下也當吐之若

傷寒法眼卷下

圭

膈上有寒飲乾嘔者不可吐也心溫是有火不得宣膈寒是無火不能振也當溫

之宜四逆湯

此少陰非腎乃心腎相通之管吸氣之道路非食物之道

路心為手少陰腎為足少陰此管上通心下通腎故得以

少陰名之此管氣擁則呼吸不通吐之所以通其呼吸也

瓜蒂散

赤小豆 瓜蒂熬黃各等分

二味別搗篩為散合治之取一錢七以香豉一合用熱湯

七合煮作稀粥糜去滓取汁和散溫頓服不吐少少加得

快吐乃止諸亡血及虛家不可與之



瓜蒂得春升之機赤小豆爲心家之穀香豉性本沉重糜熟而使輕浮引陽氣上升作爲稀糜調散心管中擁氣一吐而解矣梔鼓湯吐胃口此方吐心管同一吐法而微有別

太陽

毛皮病當惡寒發熱今

元府已通

汗自出

外邪已去

不惡寒發熱

當脈

和緩

關上脈細數者

細爲液少數爲氣熱

以醫吐之過也

太陽病汗爲正法下之大

逆今吐之太陽之病去陽明之病反至

此爲小逆

若病在

一二日吐之者

病本未至陽明

胃津未傷雖吐而胃熱尙輕但

腹中飢

胃中空也

口不能食

胃氣弱也病若已經到

三四日

吐之者

病本陽明胃津已傷更吐而傷之胃熱必熾

不喜糜粥飲食冷食

然胃火雖盛極

而邪熱

朝食暮吐此

胃病或輕或甚

皆醫吐之所致也

傷寒法眼卷下

古

太陽

表病吐之但太陽病當惡寒今反不惡寒

而惡熱

不欲近

衣此爲吐之

傷其心津心虛有火而

內煩也

此二條是太陽證誤吐者上條吐傷食管此條吐傷氣管蓋邪在食管可吐邪在氣管亦可吐無管所屬而但在膈上空虛之位者汗法非吐法也吐之反傷二管蓋吐者不動食管卽動氣管非病所在而妄動之反傷其津液矣



白虎湯證

傷寒脈浮發熱無汗其太陽表不解者不可與白虎湯渴欲飲

水熱已入胃也無表症者白虎加人參湯主之

服桂枝湯大汗出後已去表邪口燥渴心煩胃津傷胃熱盛背微惡寒者

惡寒止在背而不甚而微是大汗後陽虛所致非表邪也白虎加人參湯主之

服桂枝湯大汗出後大煩渴不解脈洪大者白虎加人參湯

主之此條全註已見桂枝篇

傷寒當汗不汗若吐津亡於上若下津亡於下得七八日無津不能作汗表仍不解熱

結在胃裡表裡俱熱雖表未解尚時時惡風而大渴舌上乾燥而

煩欲飲水數升者胃熱已極白虎加人參湯主之熱得津而化為氣氣透出表表

傷寒法眼卷下

五

亦可解

表邪已解乃可用白虎是常法表邪未解亦可用白虎是

變法此中圓通妙諦在深明陰陽氣液相因為用之理耳

陽明胃府病若渴欲飲水口乾舌燥者白虎加人參湯主之專救

胃津是白虎湯正法

三陽胃三焦合病三府皆熱氣盛於內腹滿腹中氣盛四肢舉動不便身重難以轉

側少陰身重督脈不通不能作強口不仁胃熱不知味也而面垢火

於面面油遺尿膀胱熱迫尿急難忍也發汗則陰亡訥語下之則陽氣

持滿而發一洩難留反脫於下頭上汗出手足冷若不以藥汗下之而其人自汗出者

白虎湯主之



三陽合病脈浮大在關上脈大爲陽關上亦爲陽三陽合病故有此脈也但欲眠睡

熱盛神昏也合目則汗合目氣行陰道氣熱陰液被蒸而洩出也

上條畧言脈此條詳言脈脈症合參始的蓋身重遺尿欲睡皆與少陰相似而脈大浮在關上與少陰微遲相反

傷寒脈浮滑此表有熱裡有邪邪亦熱也白虎湯主之

此條言脈不言症以上數條已詳其症此補言其脈非但據脈而不辨症也

傷寒脈滑而厥者陽無陰不化熱閉於內而厥脈不微而滑是胃裡有熱也白虎湯

主之

寒厥脈微熱厥脈滑此常法也但熱厥亦有并脈皆伏者

傷寒法眼卷下

七

然必有煩渴引飲大便結諸證可據此與上條皆不言證而傷寒二字在陽明篇便是陽明傷寒不言煩躁便結等證者省文耳非但據脈投劑也

白虎加人參湯

石膏一斤知母六兩甘草二兩粳米六合

碎綿裹

人參三兩

水一斗煮米熟湯成溫服一升日三服



茵陳湯證

陽明胃熱病發熱汗出此為熱越津液不能發黃也若津液停

出得但頭汗出身無汗到頸而還津液停於胃中而腹滿津液不行而小便

不利津液不行而渴飲水漿此為淤積熱在裡熱蒸身必發黃茵

陳湯主之

傷寒七八日陽氣內鬱蒸其津身黃如橘子色小便不利腹

微滿者竅不通達茵陳蒿湯主之

茵陳蒿湯

茵陳蒿 六兩 梔子 十四枚 大黃 一兩

以水一斗先煮茵陳減六升內二味煮取三升去滓分溫

傷寒法眼卷下

七

三服小便當利尿如皂角汁狀色正赤一宿腹減黃從小便去

茵陳經冬不凋能除熱邪留結梔子下行通三焦水道大

黃通胃實下行令胃中熱稠之水悉從小便出此茵陳湯

為陽明利水之妙劑也

傷寒發汗已身目為黃所以然者汗不如法寒溫在裡不解

故也不可下於寒濕中求之當溫中燥濕

凡黃皆津液停滯熱則膠粘而滯寒則凝濇而滯滯則皆

變而為黃