

★★★★★ 全国初级护士护师职称晋升考试专用、全国卫生技术资格统一考试推荐用书

李凡成 何清湖◎总主编

以全国统编教材章节为蓝本编写，紧扣教学大纲，揭示各门课程重点。

护理学专业 护师 技术资格 考试习题集

HULIXUE ZHUANYE HUSHI JISHU ZIGE

KAOSHI XITIJI

【护师分册】

主编 李凡成 何清湖

特别提示读者


该系列丛书出版5年，读者调查满意度为98%；

全新改版，只要认真答题，考试合格率达85%；

命题准确，经典试题，知识集中，重点突出，从茫茫书海中

选择本书是您最明智和聪明的选择！

2011年最新版本



山西出版集团
山西科学技术出版社

护理学专业护师技术资格考试习题集

总主编:李凡成 何清湖

主 编:陈燕

副主编:晋溶辰 袁 群 黄辉斌 彭丽丽 商临萍

编 者:(按姓氏笔画顺序)

马丽珍	马改红	王彦云	史红健	朱建华	朱诗林
向 宇	许永红	吴丽娟	苏银利	李彩霞	李东雅
李芳丽	李晨辉	杨 靖	陈 燕	陈偶英	宋柳燕
张银华	张晶晶	林巧梅	赵 茜	胡晓瑾	钟小平
袁卫红	袁 群	晋溶辰	郭 璇	商临萍	黄辉斌
鼓丽丽	蒋小剑	蒋谷芬	傅 伟	葛秀春	廖若夷
熊卫华	潘晓彦	霍 依			

秘 书:赵彦琴 刘 峰

图书在版编目(CIP)数据

护理学专业护师技术资格考试习题集 / 李凡成,

何清湖主编. —太原: 山西科学技术出版社, 2011.1

ISBN 978-7-5377-3787-6

I. ①护… II. ①李… ②何… III. ①护理学 - 资格
考核 - 习题 IV. ①R47-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 207632 号

护理学专业护师技术资格考试习题集

主 编: 陈燕

出版发行: 山西科学技术出版社

社 址: 太原市建设南路 15 号

编辑部电话: 0351-4922073

发行部电话: 0351-4922121

电子信箱: cbszzc 2643@sina.com

印 刷: 山西德胜华印业有限公司

开 本: 787 × 1092 1/16

字 数: 640 千字

印 张: 19.5

版 次: 2011 年 1 月第 1 版

印 次: 2011 年 1 月第 1 次修订再版印刷

书 号: ISBN 978-7-5377-3787-6

定 价: 55.00 元

如发现印、装质量问题,影响阅读,请与发行部联系调换。

编写说明

护理学专业技术资格考试为广大护理专业技术人员所关心。本套《护理学专业技术资格考试复习题集》包括护士资格考试、护师资格考试、主管护师资格考试、高级护师资格考试四个分册，每个分册的复习提纲均以 2011 年度全国卫生专业技术资格考试护理学考试大纲为主调，以医学院校护理学本科专业教材及职业技术学院护理学专业教材为蓝本，结合护理学专业临床实际，由教学与临床经验丰富的医学高校及附属医院护理学专业技术人员精心编写而成。旨在为广大护理专业技术人员提供良好的考前自学、复习的良师益友，通过相关分册的自学复习，更好的巩固已学得的知识，提高学习效果和应试能力。

各分册的复习题型，均与考试题型一致，其中护士、护师、主管护师资格考试的复习题型只有单选题，高级护师资格考试复习题型除单选题外，还有名词解释与简答题。

由于时间紧迫，在编写中可能存在某些缺陷甚至错误，恳请广大护理技术人员批评指正。

李凡成 何清湖

目 录

一、内科护理学	1
二、外科护理学	92
三、妇产科护理学	171
四、儿科护理学	204
五、护理学基础	242
六、相关专业知识	280

内科护理学

一、试题

1. 皮肤异常干燥见于
- A. 脱水
 - B. 虚脱
 - C. 休克
 - D. 风湿热
 - E. 甲亢
2. 客观发现病人存在的病态现象称
- A. 主诉
 - B. 症状
 - C. 体征
 - D. 综合征
 - E. 阳性反应
3. 病人客观资料获得的主要方法是
- A. 细心交谈
 - B. 仔细观察
 - C. 询问其他保健人员
 - D. 阅读病情记录
 - E. 阅读各种检查报告
4. 有关胃肠钡餐检查前准备, 下列哪项不正确
- A. 忌服含铋、镁、钙等重金属药物 3 天
 - B. 停用一切影响胃肠蠕动药物 3 天
 - C. 检查前一天作碘过敏试验
 - D. 检查前晚上 10 时后禁食至检查毕
 - E. 有幽门梗阻者于检查前先抽尽胃内潴留液
5. 留取 24h 尿液测蛋白总量, 其标本瓶内应加少量
- A. 甲苯
 - B. 甲醛
 - C. 浓盐酸
 - D. 石炭酸
 - E. 福尔马林
6. 柏油样大便见于
- A. 十二指肠溃疡出血
 - B. 溃疡性结肠炎
 - C. 痢疾
 - D. 结肠癌
 - E. 胃穿孔
7. 正确的主诉记录是
- A. 上腹部节律性疼痛
 - B. 右上腹疼痛伴畏寒发热
 - C. 3 天前开始咳嗽, 当日发热
 - D. 活动后心悸、气短 2 年, 全身水肿 3 天
 - E. 巩膜黄染 2 周, 血清转氨酶升高 1 个月
8. 中性粒细胞增多, 多见于
- A. 过敏性疾病
 - B. 抗肿瘤药物用药后
 - C. 急性感染
 - D. 寄生虫病
 - E. 脾功能亢进
9. 下列标本采集法错误的是
- A. 尿蛋白定量测定留取 24h 尿液
 - B. 尿酮体检查随时留尿
 - C. 内生肌酐清除率测定前摄低蛋白饮食 3 天
 - D. 血尿素氮测定以静脉血置抗凝管内
 - E. 血钾测定取静脉血置抗凝管内
10. 中性粒细胞减少, 多见于
- A. 过敏性疾病
 - B. 寄生虫病
 - C. 急性感染
 - D. 中毒



E. 脾功能亢进

11. 过敏性疾病多见

- A. 嗜碱性粒细胞增高
- B. 嗜酸性粒细胞增高
- C. 中性粒细胞增高
- D. 单核细胞增高
- E. 淋巴细胞增高

12. 触诊可以补充

- A. 视诊检查所不能确定的体征
- B. 扣诊检查所不能确定的体征
- C. 听诊检查所不能确定的体征
- D. 嗅诊检查所不能确定的体征
- E. 问诊所不能确定的体征

13. 出现脉搏短绌的疾病是

- A. 阵发性心动过速
- B. 窦性心动过缓
- C. 房室传导阻滞
- D. 窦性心律不齐
- E. 心房颤动

14. 心脏的叩诊音为

- A. 清音
- B. 浊音
- C. 过清音
- D. 鼓音
- E. 实音

15. 中性粒细胞核左移常见于下列疾病中, 除了

- A. 急性中毒
- B. 急性溶血反应
- C. 急性化脓性感染
- D. 急性失血
- E. 巨幼细胞性贫血

16. 毛细血管搏动征见于

- A. 主动脉瓣狭窄
- B. 主动脉瓣关闭不全
- C. 二尖瓣关闭不全
- D. 二尖瓣狭窄
- E. 急性胃扩张

17. 护理体检是为了

- A. 全面采集病人资料
- B. 解决病人健康问题
- C. 发现病人身上的病理形态改变
- D. 给护理病人提供依据
- E. 为护理诊断提供依据

18. 少尿指成人 24h 尿量少于

- A. 400mL
- B. 300mL
- C. 200mL
- D. 100mL
- E. 50mL

19. 酚红排泄试验, 对静脉注射酚红溶液 1mL 后, 收集四次标本的间隔时间是

- A. 15min、30min、45min、60min
- B. 15min、30min、60min、90min
- C. 15min、30min、90min、120min
- D. 15min、30min、60min、120min
- E. 15min、45min、90min、120min

20. 护理体检应把重点放在

- A. 视诊
- B. 触诊
- C. 叩诊
- D. 听诊
- E. 嗅诊

21. 慌张步态常见于

- A. 佝偻病
- B. 酒精中毒
- C. 震颤性麻痹
- D. 脑性瘫痪
- E. 小脑疾患

22. 某病人皮肤黏膜均有散在性小红点, 不高出皮肤表面, 直径约 1~2mm, 加压时不褪色, 称之为

- A. 皮疹
- B. 出血点
- C. 瘀斑
- D. 蜘蛛痣
- E. 小红痣

23. 反映造血功能的检查是

- A. 红细胞沉降率

- B. 血小板计数
C. 网织红细胞计数
D. 红细胞计数
E. 血红蛋白测定
24. 误输异型血可使尿液呈
- A. 淡黄色
B. 深黄色
C. 淡红色
D. 鲜红色
E. 酱油色
25. 体温降低见于
- A. 无菌性炎症
B. 大量失血
C. 组织破坏
D. 恶性肿瘤
E. 免疫反应
26. 对慢性病期病人心理护理不正确的是
- A. 告知发病规律
B. 听其倾诉苦衷
C. 帮其疏泄郁闷
D. 劝其适当锻炼
E. 让其依赖护理
27. 阿米巴肠病排出
- A. 柏油样便
B. 陶土样便
C. 果酱样便
D. 米泔水样便
E. 脓血便
28. 细菌性痢疾排出
- A. 柏油样便
B. 陶土样便
C. 果酱样便
D. 米泔水样便
E. 脓血便
29. 消瘦是指体重低于标准体重的
- A. 5%以上
B. 10%以上
C. 15%以上
D. 20%以上
E. 25%以上
30. 作大便隐血试验前 3 天内可摄取
- A. 牛奶
B. 瘦肉
C. 大量绿叶蔬菜
D. 动物血
E. 动物内脏
31. 尿液一般检查应留取
- A. 2h 尿
B. 4h 尿
C. 上午的尿液
D. 晨尿
E. 任何时间内的尿液
32. 做尿常规检查应留取
- A. 12h 尿液
B. 24h 尿液, 加入 5mL 甲苯防腐
C. 新鲜尿液
D. 24h 尿液, 加入 5mL 浓盐酸防腐
E. 24h 尿液, 检查前低蛋白饮食 3 天
33. 尿呈苹果味的疾病是
- A. 膀胱直肠癌
B. 肝硬化
C. 膀胱炎
D. 糖尿病酮症
E. 肝性脑病
34. 内生肌酐清除率需收集
- A. 2h 尿
B. 4h 尿
C. 12h 尿
D. 24h 尿
E. 72h 尿
35. 血清总胆红素在 $17 \sim 34$ ($\mu\text{mol/L}$) 时为
- A. 正常
B. 隐性黄疸
C. 轻度黄疸
D. 中度黄疸
E. 重度黄疸
36. 网织红细胞的正常值为

- A. 成人 5% ~ 15%
- B. 成人 3% ~ 6%
- C. 成人 0.5% ~ 1.5%
- D. 成人 6% ~ 8%
- E. 成人 3% ~ 4%

37. 皮肤或黏膜下出血直径在 4mm 称为

- A. 斑疹
- B. 红痣
- C. 淤点
- D. 紫癜
- E. 淤斑

38. 颈动脉明显搏动主要见于

- A. 主动脉瓣关闭不全
- B. 二尖瓣关闭不全
- C. 三尖瓣关闭不全
- D. 主动脉瓣狭窄
- E. 风湿性心脏病

39. 下述哪个体征为深反射

- A. 巴宾斯基征
- B. 奥本海姆征
- C. 戈登征
- D. 膝腱反射
- E. 布鲁津斯基征

40. 血中白蛋白 / 球蛋白正常比例为

- A. 1 ~ 2 : 1
- B. 1.5 ~ 2 : 1
- C. 1.5 ~ 3 : 1
- D. 1.5 ~ 2.5 : 1
- E. 1.5 ~ 3.5 : 1

41. 从事 x 线工作的医务人员, 应采取防护措施是因为 x 线具有

- A. 穿透作用
- B. 荧光作用
- C. 摄影作用
- D. 电离作用
- E. 辐射作用

42. 面容惊愕、眼裂增宽、眼球突出、目光闪烁、表情兴奋易变, 称为

- A. 急性病容

- B. 慢性病容
- C. 二尖瓣面容
- D. 甲亢面容
- E. 肢端肥大症面容

43. 下列哪种呼吸提示病情危重

- A. 呼吸浅速
- B. 呼吸深快
- C. 呼吸与呼吸暂停相交替
- D. 每分钟呼吸超过 24 次
- E. 每分钟呼吸少于 10 次

44. 某咯血病人突然出现表情恐怖、张口瞪目、两手乱抓等窒息现象, 首先应该

- A. 准备抢救用品
- B. 行人工呼吸
- C. 使用呼吸中枢兴奋剂
- D. 使用镇咳药
- E. 立即置病人头低脚高位

45. 下列咳嗽咳痰护理措施中, 错误的是

- A. 保持室内空气新鲜、清洁
- B. 咳脓痰者注意口腔护理
- C. 痰稠不易咳出时应多饮水
- D. 协助痰多的卧床病人翻身
- E. 痰多体弱无力咳嗽者施行体位引流

46. 观察中毒性肺炎的病情变化, 最重要的是

- A. 意识状态
- B. 体温、热型
- C. 脉搏、血压
- D. 呼吸频率及深度
- E. 痰的性状

47. 肺结核病人痰液最简易的消毒办法是

- A. 消毒灵浸泡
- B. 紫外线消毒
- C. 用火焚烧
- D. 来苏水消毒
- E. 酒精消毒

48. 肺炎球菌病人使用抗生素后热退, 但又复升, 应首先考虑

- A. 机体免疫力低下
- B. 机体营养状况不佳

- C. 出现并发症
- D. 细菌产生耐药
- E. 抗生素剂量不足

49. 慢性呼吸衰竭病人处于熟睡状态，但可唤醒，并可做简单而正确的交谈，但停止谈话立即入睡，称为

- A. 嗜睡
- B. 意识模糊
- C. 谵妄
- D. 昏睡
- E. 浅昏迷

50. 肺炎球菌肺炎患者的热型常呈

- A. 弛张热
- B. 间歇热
- C. 波状热
- D. 稽留热
- E. 不规则热

51. 急性哮喘发作出现呼吸困难属于

- A. 劳力性呼吸困难
- B. 吸气性呼吸困难
- C. 呼气性呼吸困难
- D. 混合性呼吸困难
- E. 端坐呼吸

52. 肺炎球菌肺炎病人出现哪种表现提示有并发症

- A. 咳铁锈色痰
- B. 胸痛
- C. 寒战、高热
- D. 体温退后复升
- E. 口唇疱疹

53. 支气管扩张的典型临床表现为

- A. 慢性咳嗽，黏液或泡沫状痰，气急，低热，两肺底啰音
- B. 慢性咳嗽，大量脓痰，反复咯血，常有肺部感染，局限性肺下部湿啰音
- C. 发热，刺激性咳嗽，黏液脓性痰；两肺呼吸音增粗，散布干湿性啰音
- D. 高热，咳嗽，黏液血性痰，一侧胸痛和呼吸音减低
- E. 以上都不是

54. 慢性呼吸衰竭最早出现的表现为

- A. 呼吸困难
- B. 发绀
- C. 精神神经症状
- D. 心血管系统症状
- E. 发热

55. 桶状胸常见于下列哪种疾病

- A. 肺结核
- B. 佝偻病
- C. 一侧大量胸腔积液
- D. 肺不张
- E. 肺气肿

56. 肺炎球菌肺炎在炎症消散后常见有

- A. 肺部遗留纤维化
- B. 肺泡受损产生肺气肿
- C. 造成胸膜粘连、增厚
- D. 肺组织完全恢复正常
- E. 以上都不是

57. 根据病情，慢性支气管炎可分为

- A. 急性发作期、慢性迁延期、临床缓解期
- B. 急性发作期、慢性迁延期
- C. 急性发作期、临床缓解期
- D. 潜伏期、急性发作期、临床缓解期
- E. 潜伏期、急性发作期、慢性迁延期

58. 有关体位引流不正确的是

- A. 引流宜在饭后 2 小时
- B. 引流期间鼓励病人适当咳嗽
- C. 每次引流时间 5 ~ 10min
- D. 依病变部位采取适当体位
- E. 引流完毕给予漱口

59. 咯出大量脓臭痰后体温下降，全身毒性症状随之减轻，主要见于哪种疾病

- A. 支气管肺癌
- B. 上呼吸道感染
- C. 肺脓肿
- D. 肺炎
- E. 肺结核

60. 某青年女性，患支气管扩张多年，常反复咯血。

本次因大咯血而急诊住院，经救治后咯血稍减轻。

下列护理措施不当的是

- A. 给予温或凉的流质饮食
- B. 可随便走动，以利恢复
- C. 保持大便通畅
- D. 及时治疗原发疾病
- E. 仍需加强观察，防止病情复发

61. 引起呼吸系统疾病最常见的病因是

- A. 肿瘤
- B. 感染
- C. 吸烟
- D. 变态反应
- E. 理化因素

62. 某呼吸衰竭病人，应用辅助呼吸和呼吸兴奋剂过程中，出现恶心、呕吐、烦躁、面颊潮红、肌肉颤动等现象应考虑

- A. 肺性脑病先兆
- B. 通气量不足
- C. 呼吸兴奋剂过量
- D. 呼吸性碱中毒
- E. 痰液阻塞

63. 呼吸加深而次数稍快，主要见于

- A. 呼吸性酸中毒
- B. 肺气肿
- C. 代谢性酸中毒
- D. 肺炎
- E. 呼吸性碱中毒

64. 桶状胸多见于

- A. 正常成人
- B. 儿童
- C. 肺气肿病人
- D. 肺结核病人
- E. 风心病病人

65. 最常见的肺炎类型是

- A. 细菌性肺炎
- B. 病毒性肺炎
- C. 支原体肺炎
- D. 真菌性肺炎
- E. 过敏性肺炎

66. 慢性支气管炎并发阻塞性肺气肿患者的临床表现主要是在原有症状的基础上又出现

- A. 经常发热
- B. 逐渐加重的呼吸困难
- C. 剧烈咳嗽
- D. 咳大量脓痰
- E. 反复发绀

67. 慢性阻塞性肺气肿突发胸痛考虑的并发症是

- A. 慢性肺源性心脏病
- B. 肺结核
- C. 自发性气胸
- D. 肺部感染
- E. 呼吸衰竭

68. 缓解气胸患者呼吸困难首选措施为

- A. 胸腔引流
- B. 吸氧
- C. 镇静剂
- D. 抗生素
- E. 呼吸兴奋剂

69. 肺炎球菌性肺炎的抗菌素治疗一般应用至

- A. 发热消退
- B. 退热后三天
- C. 退热后一周
- D. 肺部炎症完全吸收
- E. 血中白细胞计数正常

70. 肺炎球菌性肺炎最重要的胸部体征是

- A. 桶状胸
- B. 扁平胸
- C. 胸部疱疹
- D. 胸部肺实变体征
- E. 胸膜摩擦音

71. 呼吸和呼吸暂停现象交替出现，称为

- A. 库斯莫氏呼吸
- B. 毕奥氏呼吸
- C. 陈-施呼吸
- D. 鼾声呼吸
- E. 浮浅性呼吸

72. 下列哪一项不是吸烟对慢性支气管炎发生的影响

- A. 副交感神经兴奋增加, 使支气管收缩痉挛
- B. 呼吸道黏膜上皮细胞纤毛运动受抑制
- C. 通过反射引起支气管平滑肌收缩, 黏膜血液循环障碍和分泌物排出困难
- D. 支气管杯状细胞增生, 粘膜分泌增多使气道净化能力减弱
- E. 支气管黏膜充血、水肿、黏液积聚, 肺泡中的吞噬细胞功能减弱, 均易引起感染

73. 下列各项中, 哪一项不是肺动脉高压征的 X 线表现

- A. 右下肺动脉干扩张, 其横径 $\geq 15\text{mm}$
- B. 横径与气管横径之比值 ≥ 1.07
- C. 肺纹理稀疏
- D. 右心室增大征
- E. 肺动脉段明显突出或其高度大于 7mm

74. 下列各项中, 哪一项不是内源性哮喘的临床表现

- A. IgE 正常或偏低
- B. 家族过敏史少见
- C. 嗜酸粒细胞正常或稍增
- D. 多在成年人发病
- E. 有已知的过敏原

75. 下列关于治疗哮喘药物的作用机制的叙述, 错误的是

- A. 拟肾上腺素药物的作用机制是通过兴奋 β 受体, 激发腺苷酸环化酶, 增加 cAMP 的合成, 提高细胞内 cAMP 的浓度, 舒张支气管平滑肌, 稳定肥大细胞膜
- B. 茶碱类药物是通过抑制磷酸二酯酶, 减少 cAMP 的水解而起作用
- C. 抗胆碱能类药物的作用机制是增加 cGMP 的浓度, 使生物活性物质释放减少, 利于平滑肌松弛
- D. 钙拮抗剂的作用机制是阻止钙进入肥大细胞, 缓解支气管收缩
- E. 色甘酸二钠的作用机制是稳定肥大细胞膜, 阻止其脱颗粒和释放介质, 降低气道高反应性

76. 休克型肺炎最突出的表现是

- A. 血压降低
- B. 高热
- C. 意识障碍
- D. 少尿

E. 四肢厥冷

77. 肺结核化学治疗原则是

- A. 早期、联合、适量、规律、全程
- B. 仅早期使用抗结核药
- C. 间断使用抗结核药
- D. 仅用一种杀菌剂
- E. 药物剂量应偏大

78. 三凹征常出现在

- A. 严重的呼气性呼吸困难
- B. 严重的吸气性呼吸困难
- C. 混合性呼吸困难
- D. 劳力性呼吸困难
- E. 三尖瓣关闭不全

79. 下列哪种情况可触觉语颤增强

- A. 肺泡内含气过多, 如肺气肿
- B. 支气管阻塞, 如阻塞性肺不张
- C. 大叶性肺炎实变期
- D. 胸膜高度增厚粘连
- E. 胸壁皮下水肿

80. 吸气性呼吸困难见于

- A. 肺不张
- B. 胸膜粘连
- C. 支气管扩张
- D. 支气管异物
- E. 支气管哮喘

81. 缓解肺气肿患者呼吸困难的首选措施是

- A. 胸腔引流
- B. 通畅呼吸道, 持续低流量吸氧
- C. 镇静剂
- D. 强心剂
- E. 呼吸兴奋剂

82. 如发现大咯血患者有窒息先兆, 应立即采取的抢救措施是

- A. 用导管吸除血块, 保持呼吸道通畅
- B. 作气管插管
- C. 进行气管切开
- D. 加压吸氧
- E. 应用呼吸兴奋剂



83. 肺脓肿的关键性治疗方法是

- A. 抗菌和痰液引流
- B. 支持疗法
- C. 手术治疗
- D. 处理原发灶
- E. 对症治疗

84. 支气管呼吸音见于

- A. 肺炎
- B. 肺气肿
- C. 胸腔积液
- D. 自发性气胸
- E. 支气管哮喘

85. 某病人右侧胸痛，体检时发现胸部不对称，右侧呼吸运动减弱。触诊：气管居中，右下语颤增强。叩诊：呈浊音。听诊：右下有支气管呼吸音及湿啰音。可诊断为

- A. 右下肺炎
- B. 右侧胸腔积液
- C. 右侧气胸
- D. 右侧肺气肿
- E. 右支气管扩张

86. 引起肺炎的病原体主要是

- A. 细菌
- B. 病毒
- C. 支原体
- D. 真菌
- E. 立克次体

87. 院外感染所致肺炎中，主要病原体是

- A. 肺炎克雷白杆菌
- B. 流感嗜血杆菌
- C. 金黄色葡萄球菌
- D. 肺炎球菌
- E. 支原体

88. 下列哪种肺炎可呈爆发性流行

- A. 肺炎球菌肺炎
- B. 肺炎支原体肺炎
- C. 肺炎克雷白杆菌肺炎
- D. 军团菌肺炎
- E. 金葡菌肺炎

89. 军团菌肺炎首选抗菌药物是

- A. 红霉素
- B. 青霉素
- C. 丁胺卡那霉素
- D. 四环素
- E. 头孢菌素

90. 肺炎球菌肺炎的临床表现中具有特征性的是

- A. 突然发冷发热
- B. 咳铁锈色痰
- C. 咳嗽频繁
- D. 胸痛
- E. 支气管呼吸音及湿性啰音

91. 肺炎球菌的主要致病作用在于

- A. 产生毒素
- B. 产生溶血素
- C. 产生杀白细胞素
- D. 产生组织坏死物质
- E. 荚膜对组织的侵袭力

92. 肺炎球菌肺炎出现机化性肺炎是由于

- A. 合并混合感染
- B. 合并肺外感染
- C. 没有应用抗生素雾化吸入
- D. 肺泡内纤维蛋白没有完全吸收
- E. 细菌毒力大

93. 治疗肺炎球菌肺炎最常用的抗生素是

- A. 红霉素
- B. 头孢唑啉
- C. 青霉素
- D. 克林霉素
- E. 磺胺类药物

94. 关于支原体肺炎，以下哪项是错误的

- A. 秋季发病多
- B. 儿童青少年多
- C. 可引起肺炎性浸润和空洞形成
- D. 有咽炎，支气管炎表现
- E. 半数病例无症状

95. 关于肺炎克雷白杆菌肺炎，下列哪项是错误的

- A. 该细菌常存在于人体上呼吸道和肠道

- B. 病变以上叶较多见
- C. 病死率高
- D. 治疗首选头孢类药
- E. 慢性病例有时需做肺叶切除

96. 女性, 30岁, 5天前淋雨后发冷发热胸痛, 咳嗽, 气短, 既往有结核病史。查体: 左肺下部叩浊, 可闻水泡音, 痰结核菌集菌阴性, 白细胞 $32 \times 10^9 / L$, 胸片左肺下叶大片状致密阴影, 考虑诊断为

- A. 浸润型肺结核
- B. 阻塞性肺炎
- C. 肺脓肿
- D. 肺炎球菌肺炎
- E. 病毒性肺炎

97. 女性, 32岁, 一周前足部有过疖肿, 前天开始发热, 头痛伴有高热, 寒战, 咳脓痰, 痰中带血丝, 胸痛, 听诊两肺呼吸音增强, 偶有少量湿啰音, 白细胞升为 $21 \times 10^9 / L$, 中性粒细胞 90%, 胸片两肺散在密度较淡的圆形病变, 其中部分病灶有空洞伴液平面, 应考虑为

- A. 支气管扩张继发感染
- B. 多发性肺囊肿伴感染
- C. 肺炎球菌性肺炎
- D. 金黄色葡萄球菌肺炎
- E. 肺转移瘤

98. 女性, 55岁, 既往健康, 3周前急性起病, 发冷发热, 较多量脓血痰, 呼吸困难, 发绀, 体征: 右肺叩呈浊音, 听诊有水泡音, 白细胞计数 $25 \times 10^9 / L$, 中性粒细胞 92%, 胸片右下肺大片阴影, 边不清楚, 其中有数个空洞和液平面, 伴有局限性液气胸, 诊断最可能是

- A. 支原体肺炎
- B. 过敏性肺炎
- C. 病毒性肺炎
- D. 肺结核继发感染
- E. 金黄色葡萄球菌肺炎

99. 肺炎合并休克患者, 治疗后血压 $96 / 66 \text{ mmHg}$, 脉搏 96 次 / 分, 中心静脉压 $14 \text{ cmH}_2\text{O}$, 尿比重 1.014, 尿量 $15 \text{ mL} / \text{小时}$, 尿钠 $40 \text{ mmol} / L$, 肺毛细血管楔压 12 mmHg , 可能为

- A. 电解质紊乱

- B. 心衰
- C. 血容量不足
- D. 急性肾功衰竭
- E. 休克基本纠正, 无并发症

100. 男性, 65岁, 诊断肺炎球菌肺炎, 出现呼吸困难, 发绀、心悸, 心率 150 次 / 分, 第一心音低钝, 肝右肋下 3cm, 质软, 压痛 (+), 可能为

- A. 自发性气胸
- B. 呼吸衰竭
- C. 肺不张
- D. 心衰
- E. 休克

101. 男性, 20岁, 高热 4 天, 咳铁锈色痰, 查体左肺上部叩诊实音, 呼吸音弱, 其胸片表现最大可能是

- A. 左上肺纹理增粗
- B. 双肺散在片絮状影
- C. 左上肺大片状模糊影
- D. 左上肺大片状均匀致密影
- E. 左上肺浓淡不均影, 可见少许透亮区

102. 女性, 17岁, 高热, 咳铁锈色痰, 右下肺部呼吸音弱, 以下哪项不正确

- A. 卧床休息支持治疗
- B. 首选青霉素
- C. 青霉素过敏的选用红霉素
- D. 用药后复查胸片, 阴影消散后停抗生素
- E. 抗生素疗程 5~7 天

103. 女性, 20岁, 劳累后畏寒高热, 右胸痛, 查体: 急性病容, 口周疱疹, 右肺中下部闻及管性呼吸音, 临床诊断右肺炎, 最可能的病原体是

- A. 肺炎支原体
- B. 肺炎克雷白杆菌
- C. 肺炎链球菌
- D. 肺炎衣原体
- E. 金黄色葡萄球菌

104. 男性, 16岁, 半年前发热, 咳嗽, 胸片右上肺片状影, 抗炎治愈。一月前又发病一次。2 天前再次发热咳嗽。胸片又见上述影像, 血白细胞计数 $1.5 \times 10^9 / L$, 诊断可能是

- A. 肺炎支原体肺炎
- B. 病毒性肺炎

- C. 干酪性肺炎
- D. 阻塞性肺炎
- E. 克雷白杆菌肺炎

105. 男性 15 岁, 嗓子痛, 咳嗽乏力 2 周, 食欲下降, 胸片左下肺多形态性浸润影, 呈节段性分布, 选择用药是

- A. 青霉素
- B. 红霉素
- C. 氟哌酸
- D. 庆大霉素
- E. 头孢菌素

106. 肺炎球菌肺炎痊愈后, 一般肺部常遗留什么样的病变

- A. 轻微肺纤维化
- B. 局限性肺气肿
- C. 局部机化性肺炎
- D. 小囊肿
- E. 完全吸收不留痕迹

107. 下列哪项对肺炎球菌肺炎的诊断最有价值

- A. 高热、咳铁锈色痰
- B. 白细胞升高, 核左移, 胞浆有中毒颗粒
- C. 胸片大片均匀致密影呈肺叶或肺段分布
- D. 肺部湿性啰音
- E. 痰培养肺炎球菌阳性

108. 哪种肺炎容易并发脓气胸

- A. 肺炎球菌肺炎
- B. 支原体肺炎
- C. 病毒性肺炎
- D. 克雷白杆菌肺炎
- E. 葡萄球菌肺炎

109. 关于葡萄球菌肺炎, 以下哪项不正确

- A. 重患早期可发生休克
- B. 血浆凝固酶阳性的细菌致病力强
- C. 可并发心、脑、肾脓肿
- D. 大剂量青霉素静脉输液后, 原发病灶一般不需处理
- E. 病情较重, 病死率较高

110. 不易引起肺部化脓性病变的病原体是

- A. 金黄色葡萄球菌

- B. 肺炎杆菌
- C. 肺炎球菌
- D. 嗜肺性军团杆菌
- E. 厌氧菌

111. 判断结核菌素试验结果的最重要指标是

- A. 红斑直径
- B. 红斑消退时间
- C. 硬结直径
- D. 发疹时间
- E. 有无水泡

112. 肺炎球菌肺炎出现呼吸困难的主要原因

- A. 气道阻塞
- B. PaCO_2 升高
- C. 限制性通气障碍
- D. 高热
- E. V/Q 比例失调

113. 肺炎球菌肺炎应用足量青霉素治疗效果不满意应想到

- A. 选药不当
- B. 用药方法不当, 立即将肌注改为静脉输液
- C. 没有联合用药
- D. 诊断是否正确
- E. 是否出现并发症

114. 引起肺炎球菌肺炎低氧血症的原因是

- A. 痰液阻塞气道
- B. 支气管痉挛
- C. 高热
- D. $V/Q < 0.8$
- E. $V/Q > 0.8$

115. 诊断肺结核最可靠的依据是

- A. 结核中毒症状及明显的呼吸道局部症状
- B. 胸片: 锁骨上下浸润性病灶及空洞形成
- C. 结核菌素试验强阳性
- D. 痰中找到结核菌
- E. 血沉明显增快

116. 下列哪一项为外源性哮喘的临床表现

- A. 过敏原皮试阳性
- B. IgE 正常
- C. 多发于老年

- D. 间歇性发作
- E. 嗜酸粒细胞正常

117. 成人呼吸窘迫综合征的常见死因是

- A. 多脏器功能衰竭
- B. DIC
- C. 肺水肿
- D. 自发性气胸
- E. 纵隔气肿

118. 肺结核的主要传染源是

- A. 原发型肺结核病人
- B. 肺内有空洞的肺结核病人
- C. 痰中排菌的肺结核病人
- D. 血行播散型肺结核病人
- E. 结核性胸膜炎病人

119. 人类结核病的主要病原菌是

- A. 牛型结核菌
- B. 鼠型结核菌
- C. 人型和鼠型结核菌
- D. 牛型和鼠型结核菌
- E. 人型和牛型结核菌

120. 发现早期肺结核的主要方法是

- A. 查痰抗酸杆菌
- B. 胸 X 线检查
- C. 胸 CT
- D. 血沉
- E. 血清特异性抗体的检查

121. 关于结核菌, 下列哪项是错误的

- A. 生长缓慢, 4~6 周繁殖成明显菌落
- B. 抗酸染色镜检为蓝色细长的杆菌
- C. 在阴湿处能生存 5 个月以上
- D. 煮沸一分钟能被杀灭
- E. 烈日暴晒 2h 可被杀灭

122. 关于结核病, 下列哪条是错误的

- A. 细菌分为人型、牛型和鼠型
- B. 结核菌体蛋白质可引起过敏反应
- C. 类脂质能引起结核结节
- D. 多糖类引起免疫反应
- E. 标准菌株为 R37Hv

123. 结核杆菌感染人体的主要途径是

- A. 皮肤接触
- B. 消化道
- C. 呼吸道
- D. 泌尿道
- E. 淋巴

124. 下列各项关于结核菌素试验阴性反应意义的叙述中, 不正确的是

- A. 没有结核菌感染
- B. 一定没有患结核病
- C. 结核菌感染后需 4~8 周才有变态反应充分建立, 在变态反应前期, 结核菌素试验可为阴性
- D. 应用糖皮质激素等免疫抑制剂者, 或营养不良及麻疹、百日咳等病人, 结核菌素反应也可暂时消失
- E. 严重结核病和各种危重病人对结核菌素可无反应

125. 关于卡介苗接种下述哪项是正确的

- A. 菌苗为无毒人型活结核菌
- B. 儿童每隔 5 年复种一次
- C. 卡介苗效果是绝对肯定的
- D. 接种前均需做结核菌素试验
- E. 使人产生免疫力同时也产生变态反应

126. 怎样判断肺结核患者有无传染性

- A. 做结核菌素试验
- B. 查痰结核菌
- C. 询问病人有无咯血
- D. 检查病人有无发热
- E. 拍胸片检查有无空洞

127. 切断肺结核传染链的最有效方法是

- A. 增强所有公民的免疫力
- B. 在全民范围内进行科普宣传
- C. 发现并治愈患者
- D. 经常进行集体肺部 X 线检查
- E. 给所有应种卡介苗者进行预防接种

128. 化学药物预防肺结核的适应证, 下列哪项是错误的

- A. 开放性肺结核患者家庭中结核菌素试验阳性且与患者密切接触的成员



B. 结核病房护士, 结核菌素试验 (+), 咳嗽, 发热一周

C. 结核菌素试验新近转为阳性的儿童

D. 非活动性结核病, 正在接受大剂量皮质激素治疗者

E. 右上肺结核稳定一年后, 接受免疫抑制治疗的红斑狼疮患者

129. 下列哪项中的病人, 不需要进行抗结核化疗

A. 发热咳嗽一周, 胸片正常, 结核菌素试验强阳性

B. 胸片示结核病灶正在好转

C. 慢纤洞型患者三年中复查 5 次胸片无变化, 近一月午后发热, 乏力

D. 左结核性胸膜炎系统化疗十个月后, 胸膜肥厚粘连

E. 女性 28 岁, 咯血 20 天, 胸片正常, 痰结核菌涂片 (+)

130. 浸润型肺结核自然演变过程中, 下列哪种情况最常见

A. 亚急性血行播散

B. 急性血行播散

C. 干酪性坏死

D. 空洞形成

E. 引起慢性纤维空洞型肺结核

131. 肺结核的基本病变是

A. 渗出、变质、增生

B. 纤维化、钙化、结核球

C. 浸润性病体, 干酪性病变

D. 干酪样坏死, 支气管播散

E. 结核结节, 血行播散性病变

132. 考核抗结核治疗效果的主要指标是

A. 痰菌检查

B. 胸部 X 线

C. 结核中毒症状的消失

D. 咳嗽减轻, 痰量减少

E. 体力明显恢复

133. 关于肺结核治疗效果的评价, 以下哪条不正确

A. 结核菌素试验可协助判断病情

B. 临床治愈时, 空洞仍可存在

C. 临床治愈时, 病灶内仍可残留结核菌

D. 痰菌阴转为考核疗效的主要指标

E. 临床治愈则不再有咯血

134. 肺结核大咯血抢救时需特别注意的是

A. 血压监测

B. 预防 DIC

C. 慎用镇咳、镇静剂

D. 保持呼吸道通畅

E. 患侧卧位

135. 成人肺结核中最常见的类型为

A. 原发型肺结核

B. 血行播散型肺结核

C. 浸润型肺结核

D. 慢性纤维空洞型肺结核

E. 结核性胸膜炎

136. 以下哪种抗结核药物应用于儿童和青少年时, 应特别注意严密观察其副作用

A. 雷米封

B. 利福平

C. 乙胺丁醇

D. 吡嗪酰胺

E. 链霉素

137. 肺结核患者大咯血时应采取哪种体位

A. 患侧卧位

B. 健侧卧位

C. 坐位

D. 俯卧位

E. 仰卧位

138. 关于抗结核药物副作用下列哪条是错误的

A. 异烟肼: 肝功损害

B. 利福平: 肝功损害

C. 吡嗪酰胺: 肝功损害、肾功损害

D. 链霉素: 耳鸣耳聋

E. 乙胺丁醇: 视神经炎

139. 重症肺结核病人进行标准化疗时间为

A. 3 个月 ~5 个月

B. 6 个月 ~11 个月

C. 12 个月 ~18 个月

D. 19 个月 ~24 个月

E. 25 个月 ~36 个月