

御纂醫宗金鑑卷七

編輯外科心法要訣目錄

腹部

幽癰

中脘疽

嚇癰

衝疽

臍癰

附臍中出水

少腹疽

腹皮癰

緩疽

腋部

腋癰

腋疽

黯疔

肋部

肋疽

淵疽

內發丹毒

脇癰
附疽

內癰部

肺癰

大小腸癰

胃癰

脾癰

肝癰

心癰

腎癰

三焦癰

內癰總論

驗內癰法

御纂醫宗金鑑卷七

編輯外科心法要訣

幽

癰

圖

幽癰在臍上七寸



御纂醫宗金鑑卷七
編輯外科心法要訣
一

腹部

幽癰

幽癰臍上七寸生初小漸大腫硬疼甚思厚味火毒發咬牙寒戰毒陷攻

註

此證生臍上七寸初起如粟漸增漫腫疼痛形如鷲卵甚則堅硬痛牽胸肋由過食膏粱厚味憂思氣結腸胃不通火鬱成毒自內而外發也初起腫痛皮色未紅時若心煩嘔噦衄沉實者當疎火毒以絕其源宜內疎黃連湯服之炊腫痛甚邪氣實也宜服托裏散外用艾壯膈蒜片灸之衄見沉遲其膿未成用補中益氣湯托之衄見洪數其膿

已成用托裏透膿湯膿熱脹痛不潰係氣血虛也急用十全大補湯溫補之外兼用卧鍼開卧鍼者斜入斜出防傷內膜也或誤行汗下或誤敷寒涼以致腫而不潰潰而不斂者急用十全大補湯加乾薑附子以救之已潰朝寒暮熱者氣血虛也食少作瀉脾胃虛也胸痞痰涌脾肺虛也俱服六君子湯服後諸證悉退換十全大補湯調理卽愈外治之法按癰疽腫瘍潰瘍門無論已潰未潰忽咬牙寒戰係氣虛不能勝毒毒陷攻裏之兆或潰後膿水忽多忽少瘡口如蠅吐沫者係內膜已透俱爲逆證

托裏散

皂刺

金銀花

黃芩

牡蠣

煨

當歸

赤芍

朴消

大黃

花粉

連翹

各等分
去心

共研粗末每用五錢酒水各一鍾煎八分去渣服

方歌

托裏散醫諸瘡毒腫甚熈疼煎服消皂刺銀花芩牡蠣歸

芍消黃花粉翹

內疎黃連湯

見腫瘍門

隔蒜灸法

見首部灸法

托裏透膿湯


見頭部
侵腦疽

補中益氣湯

十全大補湯

六君子湯

即香砂六君子湯減去
藿香砂仁俱見潰瘍門



中脘疽

圖



中脘疽在臍上四寸

十全大補湯

補腎香湯
六錢
子
無
補
湯

中脘疽

中脘疽由胃火生臍上四寸隱隱疼堅硬漫腫無紅熱不食嘔
噦毒內攻

註

此證一名胃疽發於心胸之下臍上四寸在肭經中脘穴

隱痛日久向外生疽堅硬漫腫皮色無紅無熱由過食炙
煇以致胃腑火毒而成人迎脈盛是毒氣攻裏作嘔不食
咳嗽膿痰者逆初宜服仙方活命飲色紫堅硬宜服山甲
丙消散膿勢將成內外治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門若起
長膿遲或瘡不嫩痛者急用艾壯隔獨頭蒜片置患上灸

之回陽

山甲內消散

穿山甲 三大片 炒

當歸尾

大黃

甘草節 各三錢

土木鱉 三個

黑牽牛

殭蠶 各一錢 炒

酒水各一鍾煎八分空心服渣再煎服大便秘行三四次方

食稀粥淡味調理

方山甲內消火毒積色紫堅疼中脫疽歸尾大黃殭草節木

鱉牽牛加酒宜

仙方活命飲 見腫瘍門

嚇

癰

圖



嚇癰生在臍上三寸

卷七
嚇癰

嚇癰七情鬱火成臍上三寸粟微紅暴腫焮痛二七潰頂陷色黑潰遲凶

註

此證由七情鬱火凝結而成生臍上三寸屬任脈經建里穴初如粟米癢痛相兼其腫迅速寒熱往來甚則嘔噦牽引臍痛初腫微紅頂尖根束漸透赤色時痛時止十四日潰膿者順若頂陷紫黑根脚漫腫面赤大渴脈見浮數而散大者逆內治與幽癰叅考外治法按癰疽腫瘍潰瘍門

衝

疽

圖



衝疽在臍上三寸

衝疽

衝疽臍上二寸生心火毒熾人腎紅高腫炊痛速潰吉若見七

惡定然凶

註

此證生於任脈臍上二寸下脘穴一名中發疽又名壅腎

瘡由心火熾盛流入腎經而成色赤高腫應在二十一日

潰破膿稠受補者順初宜瘡科流氣飲或仙方活命飲消

之膿將成時內外治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門其證若平

塌紫黑膿水清稀七惡證見者逆

瘡科流氣飲

見背部
痰注發

仙方活命飲

見腫瘍門

臍癰圖

臍癰生在肚臍



臍癰

附臍中出水

臍癰毒發在臍中腫大如瓜突若鈴無紅無熱宜蒜灸稠膿爲
吉汚水凶

註

此證由心經火毒流入大腸小腸所致生於臍中屬任脈
經神闕穴此穴禁鍼腫大如瓜高突若鈴無紅無熱最宜
隔蒜灸之初宜服仙方活命飲加升麻消之便結實者內
疎黃連湯通利之將欲成膿內外治法俱按癰疽腫瘍潰
瘍門潰後得稠膿者順時出汚水臭穢者逆亦有臍中不
痛不腫甚癢時津黃水此屬腸胃濕熱積久宜服黃連平
胃散外用三妙散乾撒滲濕卽愈當忌酒麪生冷果菜不