

医钞类编(四)

国家中医药管理局
中医药古籍保护与利用能力建设项目

崔清·翁藻编撰
陈曦为
何珮珩
李妹琛
马宜敏萍苏
刘迎辉颖
刘婧瑶
朱柱泉史双文
陈稳根
校注

中国古医籍整理丛书

医钞类编

(四)

清·翁藻 编撰

崔 为 王殊琛 苏 颖 史双文

陈 曦 李 萍 刘迎辉 陈稳根 校注

何珮珩 马宜敏 刘婧瑶 朱柱泉

中国中医药出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

医钞类编：全 4 册 / (清) 翁藻编撰；崔为等校注 . —北京：
中国中医药出版社，2015. 12
(中国古医籍整理丛书)

ISBN 978 - 7 - 5132 - 2967 - 8

I. ①医… II. ①翁… ②崔… III. ①中国医药学—古籍—
汇编—中国—清代 IV. ①R2 - 52

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 289899 号

中国中医药出版社出版

北京市朝阳区北三环东路 28 号易亨大厦 16 层

邮政编码 100013

传真 010 64405750

保定市中画美凯印刷有限公司印刷

各地新华书店经销

*

开本 710 × 1000 1/16 印张 159.5 字数 1405 千字

2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 5132 - 2967 - 8

*

定价 398.00 元

网址 www.cptcm.com

如有印装质量问题请与本社出版部调换

版权专有 侵权必究

社长热线 010 64405720

购书热线 010 64065415 010 64065413

微信服务号 zgzyycbs

书店网址 csln.net/qksd/

官方微博 <http://e.weibo.com/cptcm>

淘宝天猫网址 <http://zgzyycbs.tmall.com>

卷二十一 外科上

目 录

痈疽门	二〇三一	疮伤慎下宜和气血	
总论	二〇三一	之法	二〇三九
痈疽辨证	二〇三一	痈疽溃后宜补气血	
痈疽顺证	二〇三一	之法	二〇四〇
痈疽逆证	二〇三一	止痛之法	二〇四〇
痈疽辨肿	二〇三一	肿毒治法	二〇四〇
痈疽辨痛	二〇三二	附子饼灸法	二〇四一
痈疽辨脓	二〇三二	豆豉饼灸法	二〇四一
痈疽辨痒	二〇三三	蛴螬灸法	二〇四一
痈疽辨晕	二〇三三	桑柴火烘法	二〇四二
痈疽治法	二〇三三	牛胶蒸法	二〇四二
内消治法	二〇三四	药筒拔法	二〇四二
内托治法	二〇三四	升打灵药固罐法	二〇四二
虚实治法	二〇三四		二〇四二
内消法	二〇三五	升打灵药封罐口法	二〇四三
艾灸法	二〇三五		二〇四三
神火照法	二〇三六	炼金顶砒法	二〇四三
刀针砭石法	二〇三六	痈疽主治方	二〇四三
围药法	二〇三七	仙方活命饮	二〇四三
开口除脓法	二〇三七		二〇四三
收口法	二〇三七	金银花酒	二〇四四
服药法	二〇三八	回毒金银花汤	二〇四四
五善七恶救援法		银花甘草汤	二〇四四
	二〇三八		二〇四四
将息法	二〇三九		

芎芷香苏灵散	二〇四四	飞龙夺命丹	二〇四八
复元通气散	二〇四四	蜡矾丸	二〇四八
卫生汤	二〇四五	琥珀蜡矾丸	二〇四九
神授卫生汤	二〇四五	护心散	二〇四九
内消散	二〇四五	麦冬梗米饮	二〇四九
连翘败毒散	二〇四五	荣胃返魂汤	二〇四九
硝黄败毒散	二〇四五	止痛当归汤	二〇五〇
内疏黄连汤	二〇四五	独参汤	二〇五〇
双解黄金丸	二〇四六	托里黄芪汤	二〇五〇
透脓散	二〇四六	参芪内托散	二〇五〇
托里透脓汤	二〇四六	加味地黄丸	二〇五〇
托里排脓汤	二〇四六	太乙紫金锭	二〇五一
托里消毒散	二〇四六	保安万灵丹	二〇五二
千金内托散	二〇四七	痈疽外治方	二〇五三
加味十奇散	二〇四七	火照散	二〇五三
托里温中汤	二〇四七	煮竹筒方	二〇五三
独胜散	二〇四七	陈艾丸	二〇五四
回阳三建汤	二〇四八	蟾蜍饼	二〇五四
		海浮散	二〇五四
		二味拔毒散	二〇五四

如意金黄散	二〇五四	生肌玉红膏	二〇五九
真君妙贴散	二〇五五	万应膏	二〇六〇
蝌蚪拔毒散	二〇五五	普救万全膏	二〇六〇
四虎散	二〇五五	加味太乙膏	二〇六一
三黄散	二〇五五	五色灵药	二〇六二
艾草敷法	二〇五五	白降丹	二〇六二
芙蓉外敷法	二〇五六	红升丹	二〇六三
芙蓉膏	二〇五六	生肌散	二〇六三
化腐紫霞膏	二〇五六	生肌定痛散	二〇六三
远志膏	二〇五六	轻乳生肌散	二〇六四
冲和膏	二〇五六	腐尽生肌散	二〇六四
回阳玉龙膏	二〇五六	月白珍珠散	二〇六四
乌龙膏	二〇五七	姜矾散	二〇六四
葱归塌肿汤	二〇五七	整骨麻药	二〇六四
猪蹄汤	二〇五七	外敷麻药	二〇六四
防风汤	二〇五七	痈疽上部	二〇六五
乌金膏	二〇五八	百会疽	二〇六五
巴膏贴	二〇五八	佛顶疽	二〇六五
离宫锭子	二〇五八	额疽	二〇六五
坎宫锭子	二〇五八	鬓疽	二〇六六
白膏药	二〇五八	脑后发	二〇六六
陀僧膏	二〇五九	面发毒	二〇六六
琥珀膏	二〇五九	痄腮	二〇六六
绛朱膏	二〇五九	颊痈	二〇六六

发颐	二〇六七	乳中结核	二〇七二
时毒	二〇六七	乳劳	二〇七三
眉心疽	二〇六八	乳岩	二〇七三
虎蠅毒	二〇六八	肩风毒	二〇七四
脑疽	二〇六八	石榴疽	二〇七四
耳发	二〇六九	臂痈	二〇七四
耳根毒	二〇六九	腕痈	二〇七四
猛疽	二〇六九	穿骨疽	二〇七五
腮痈	二〇六九	手发背	二〇七五
痈疽上部方	二〇七〇	手丫发	二〇七五
黃连消毒饮		虎口疽	二〇七五
	二〇七〇	蛇头天蛇毒	二〇七五
柴胡清肝汤		上中下三发	二〇七六
	二〇七〇	上搭手	二〇七七
清涼消毒饮		中搭手	二〇七七
	二〇七〇	下搭手	二〇七七
柴胡葛根汤		酒毒发	二〇七七
	二〇七〇	痰注发	二〇七八
四順清涼饮		丹毒发	二〇七八
	二〇七〇	黄瓜痈	二〇七八
犀角升麻汤		肾俞发	二〇七八
	二〇七〇	胁痈	二〇七八
升阳散火汤		腹皮痈	二〇七九
	二〇七一	脐痈	二〇七九
多骨疽方	二〇七一	痈疽中部方	二〇七九
痈疽中部	二〇七一	护心散	二〇七九
中脘疽	二〇七一	山甲内消散	
膻中疽	二〇七一		二〇七九
内外吹乳	二〇七一	荆防牛蒡汤	
乳疽乳痈	二〇七二		二〇八〇
乳发乳漏	二〇七二	橘叶桔梗散	
			二〇八〇

桔楼牛蒡汤	二〇八〇	金凤化痰膏	二〇八三
清肝解郁汤	二〇八〇	夺命丹	二〇八三
萎贝散	二〇八〇	三妙散	二〇八四
神效桔楼散	二〇八〇	白玉霜	二〇八四
远志酒	二〇八〇	痈疽下部	二〇八四
木香饼	二〇八〇	悬痈	二〇八四
鲫鱼膏	二〇八一	便毒	二〇八四
冰螺捻	二〇八一	肾囊痈	二〇八五
蠲痛无忧散	二〇八一	鹤口疽	二〇八五
菊花清燥汤	二〇八一	坐马痈	二〇八六
白芷升麻汤	二〇八一	上马下马痈	二〇八六
羌活汤	二〇八一	臀痈	二〇八六
雄黄散	二〇八二	脏毒	二〇八六
雄黄牡蛎散	二〇八二	脏毒治案	二〇八七
天蛇头方	二〇八二	附骨疽	二〇八七
逍遥散	二〇八二	伏兔疽	二〇八八
六郁汤	二〇八二	膝痈	二〇八八
一粒金丹	二〇八二	委中毒	二〇八八
内托黄芪散	二〇八三	黄鳅痈	二〇八九
连翘消毒饮	二〇八三	接骨发	二〇八九
疮科流气饮	二〇八三	内踝疽	二〇八九
		湿毒流注	二〇八九
		足发背	二〇九〇
		脱疽	二〇九〇
		涌泉疽	二〇九〇
		痈疽下部方	二〇九〇
		九龙丹	二〇九〇
		滋阴八物汤	二〇九一
		清火九味汤	二〇九一

十四味大补汤	二〇九一	内托酒煎汤	二〇九四
加减六味丸	二〇九一	茯苓佐经汤	二〇九四
大防风汤	...	二〇九一	附子六物汤	二〇九五
国老散	二〇九二	麻黄佐经汤	二〇九五
九龙膏	二〇九二	雷火神针	...	二〇九五
胡桃散	二〇九二	五香流气饮	二〇九五
红花散瘀汤	二〇九二	活血散瘀汤	二〇九五
黄芪内托散	二〇九二	轻粉散	二〇九五
清肝渗湿汤	二〇九三	解毒济生汤	二〇九五
滋阴内托散	二〇九三	阴阳二气丹	二〇九五
滋阴除湿汤	二〇九三	雌雄霹雳火	二〇九六
和气养荣汤	二〇九三	产后痈疽流注	二〇九六
滋肾保元汤	二〇九三	产后痈疽	二〇九六
先天大造丸	二〇九三	疽痈	二〇九六
内托羌活汤	二〇九四	流注	二〇九七
一煎散	二〇九四	产后痈疽痘痈		
菩提露	二〇九四	流注俱方	二〇九七
五灰散	二〇九四	生化汤	二〇九七
内托黄芪汤	二〇九四	清魂散	二〇九八

散瘀葛根汤	二〇九八
附子八物汤	二〇九八
调中大成汤	二〇九九
内痈门	二〇九九
内痈总论	二〇九九
验内痈法	二〇九九
胃痈	二〇九九
脾痈	二一〇〇
肝痈	二一〇〇
心痈	二一〇一
肾痈	二一〇一
三焦痈	二一〇一
肠痈	二一〇一
肠痈治案	二一〇一
大小肠痈	二一〇二
内痈门方	二一〇二
清胃射干汤	二一〇二
射干汤	二一〇二
芍药汤	二一〇三
赤豆薏苡仁汤	二一〇三
芫花丸	二一〇三
凉血饮	二一〇三
升麻葛根汤	二一〇三
鹿茸丸	二一〇三
肠痈方	二一〇四
大黄牡丹汤	二一〇四
薏苡附子		
败酱散	...	二一〇四
薏苡仁汤	...	二一〇四
千金牡丹皮散		
牡丹汤	二一〇四
牡丹散	二一〇五
大黄汤	二一〇五
排脓散	二一〇五
梅仁汤	二一〇五
神效四圣散		
五香连翘汤		
瘰疬门	二一〇六
瘰疬总论	二一〇六
小儿瘰疬	二一〇七
结核	二一〇八
患瘰疬治案	二一〇八
瘰疬门方	二一〇九
防风羌活汤		
五伯散	二一〇九
海菜丸	二一〇九
升阳调经汤		
柴胡连翘汤		
鸡鸣散	二一一〇

连翘散坚汤	二一一〇	癰瘤门	二一一四
散肿溃坚汤	二一一〇	癰瘤总论	二一一四
舒肝溃坚汤	二一一〇	胎瘤	二一一五
香贝养荣汤	二一一〇	红丝瘤	二一一六
家藏治瘰疬方	二一一一	痘里夹癰	二一一六
法制灵鸡蛋	二一一一	血箭	二一一六
千金指迷丸	二一一一	癰瘤门方	二一一七
妙灵散	二一一一	清肝芦荟丸	二一一七
内消连翘丸	二一一一	芩连二母丸	二一一七
附子败毒汤	二一一二	加味归脾丸	二一一七
消核散	二一一二	通气散坚汤	二一一七
犀角丸	二一一二	海藻玉壶汤	二一一七
加味四物汤	二一一二	调元肾气丸	二一一七
治瘻核丸	二一一二	二消饮	二一一七
夏枯草膏	二一一二	黃芪卫元汤	二一一八
神功散	二一一三	冲和饮子	二一一八
三妙散	二一一三	血箭血癰方	二一一八
消瘰丸	二一一三	凉血地黃汤	二一一八
紫霞膏	二一一三	桃花散	二一一八
简便方	二一一三	花蕊石散	二一一八

痈疽门

总 论

朱丹溪曰：痈疽皆因阴阳相滞而生。盖气，阳也；血，阴也。血行脉中，气行脉外，相并周流。寒与湿搏之，则凝滞而行迟为不及；热与火搏之，则沸腾而行速为太过。气得邪而郁，津液稠黏，为痰为饮，积久渗入脉中，血为之浊，此阴滞于阳也。血得邪而郁，隧道阻滞，或溢或结，积久渗出脉外，气为之乱，此阳滞于阴也。百病皆由于此，不止痈疽而已也。

痈疽辨证

《集解》云：浅者为疖，实者为痈，深则为疽。发于外者为背疽、脑疽、眉须等疽，发于内者为肝痈、肺痈、肠腑等痈。外证易识，内证难明。太阳经虚，从背而出；少阳经虚，从鬓而出；阳明经虚，从髡而出；督脉经虚，从脑而出。

痈疽顺证

痈疽初起，从小而大，渐渐憎寒壮热，渐渐疼痛焮赤。气盛者，顶尖高肿而起；血盛者，则根脚收束而红，此顺证也。阳证十四日而脓即熟，阳性速也。阴证必待二十一日而脓始成，阴性迟也。

痈疽逆证

初起形如黍米，不知疼痛，漫肿不热，顶见平塌，未溃白头，按之坚硬，舌干烦躁，此等逆证，决不化脓。肉肿，疮不肿而陷，其色如猪肝之紫者，是毒邪已深也。若见遗尿直视，循衣撮空，唇青面黑，皮槁唇白，腹脉种种恶候，断无生理。已溃之后，肉坚皮烂。腐后心烦，脓水清稀，新肉不生，臭秽难近，头低项软，形容憔悴。阳病指甲青黑，阴病两颧红赤，以致眼眶迷漫等证。无论毒之肿溃，皆为凶证，难治。

痈疽辨肿

人之气血周流不息，稍有壅滞，即作肿矣。然肿有虚实、寒

湿、风痰郁结伤肝作肿，有气肿，有跌扑瘀血作肿，有产后与闪挫瘀血作肿。诸肿形势各异。如虚者漫肿，实者高肿。火肿者色红皮光，焮热僵硬。寒肿者，其势木硬，色紫黯青。湿肿者，皮肉重坠，深则按之如烂棉，浅则起光亮水泡，破流黄水。风肿者，皮肤拘皱不红，其势宣浮，微热微疼。痰肿者，软如棉、硬如馒，不红不热。郁结伤肝作肿者，不红不热，坚硬如石，棱角状如岩凸。气肿者，以手按之，皮坚而内软，遇喜则消，遇怒则长，无红无热，皮色如常。跌扑瘀血作肿者，暴肿大热，胖胀不红。产后闪挫瘀血作肿者，瘀血久滞于经络，忽发则木硬，不热微红，若脓已成而将溃者，其色必紫。诸肿形状如此，不可一概而论也。

痈疽辨痛

痛由不通，然亦种种不一，有轻重、虚实、寒热、风气、脓血之别。轻痛者，肌肉皮肤作痛，属浅；重痛者，痛彻筋骨，属深。虚痛者，腹饥则甚，不胀不闭，喜人揉按，暂时可安；实痛者，食饱则甚，又胀又闭，畏人挨按，痛不可言。寒痛者，痛处定而不移，皮色不变，遇暖则喜；热痛者，皮色焮赤，遇冷则欢。脓痛者，憎寒壮热，形势鼓胀，按而复起。瘀血凝结作痛者，初起隐隐作痛，微热微胀，将溃则色紫微痛，既溃则不疼。风痛者，走注甚速。气痛者，流走无定，刺痛难忍。诸痛如此，不可不详辨也。

痈疽辨脓

凡看痈疽疮疡，形势未成者，即用内消之法；若形势已成，即用内托之法。当辨脓之有无浅深。以手按之坚硬者，无脓之象。按之不热者无脓，热者有脓。按之太软者，内脓已熟；半软半硬者，脓未全成。按之指起即复者，有脓；不复者，无脓。其气血必穷，而虚甚也。深按之而速起者，内是稀黄水；深按之而缓起者，内是坏污脓。按之实而痛甚者，内必是血；按之虚而不疼者，内必是气。轻按即疼者，其脓浅；重按方痛者，其脓深；薄皮剥起者，其脓必浅；皮色不变不高阜者，其脓必稠。大抵痈疽疮疡，

宜先出黄白稠脓，次宜出桃花脓，再次宜流淡红水。胖人宜脓多，瘦人宜脓少。若胖人脓少是肉不腐，瘦人脉多是肉败坏，皆非吉也。又凡气实者，多稠黄脓；气虚者，多稀白脓；半虚半实者，多稠白脓。又有脓出如粉浆，如污水者，谓之败浆，不治之证也，惟汗后脓移者可愈。若脓已出而身犹大热不休者，治亦无功。盖痈疽之得脓如伤寒之得汗，汗出而反大热者，坏伤寒也；脓出身犹大热者，坏痈疽也。

痈疽辨痒

痒虽属风，亦各有因。凡肿疡初起，皮肤作痒者，为风热相搏；溃后作痒者，轻由脓沤，甚由疮口冒风，故突起疙瘩，形如小米。抓破之后，津水者是脾湿，津血者是脾燥。若将敛作痒者，缘初肿时肌肉结滞，气血不周，及至将敛，气血渐充，助养新肉，故痒也。然必痒若虫行，方为吉兆。他如疥癬作痒，皆属风淫，勿视为一类也。

痈疽辨晕

俗以肿痕为晕，非真晕也。真晕生于疮口之旁，状若红筋，皆由脏腑蕴受锐毒而成，二三晕可治，五晕难医。

痈疽治法

痈疽疮疡初起如粟，若麻痒焮痛者，即毒甚也。七日以前，形势未成，不论阴阳，俱先当灸之。轻者使毒气随火而散，重者拔引郁毒，通彻内外，实良法也。灸完即用汤洗之法，法^①完用太乙膏贴于疮顶之上预防风袭，内服疏解宣利之剂如神授卫生汤、内疏黄连汤三方俱见后、蟾酥丸见疗疮之类，外围敷药如冲和膏、玉龙膏俱见后，四围束之。轻证以神火法照之，每用三枝详后。如形势已成，当因证施治。平塌者，宜投补剂以益其不足，使毒外出；高肿者，不可过于攻伐，以伤元气，致难溃敛；内热盛者，

① 法：据文义当作“洗”。

须佐消毒之剂以防毒炽；二便秘结者，急用通利之方，使脏腑宣通，方为佳兆。如十日之后，疮尚坚硬，必须用铍针当头点破。半月之后，脓尚少者，急用药筒拔法见本门第三十三条拔之。脓血稠黏者为顺，紫血稀水者为逆。过二十一日，纵有稀脓，亦难治矣。若已溃之后，腐仍不脱，堵塞疮口者，用刀剪当头剪开寸余，使毒管流通，自然疮不闭塞。拔脓剪腐已完，用方盘一个，疮下放定，将猪蹄汤见后以软棉淋洗疮上，并入孔内，轻手擦净内脓，庶败腐宿脓随汤而出，以净为度，再以软棉叠成七八重，勿令太干，带汤乘热覆于疮上，两手轻按片时，帛温再换，如此洗按四五次，血气疏通，患者自然爽快。每日如是洗之，谨避风寒，以黄灵药见后掺之，候腐内脱尽，已见红肉。洗后随用抿脚挑玉红膏见后于手心上搽化，涂疮口内，外用太乙膏见后盖之。不数日，新肉顿生，疮势将敛，以生肌散见后或珍珠散见后撒之，保养谨慎，不可怠缓。脓出后，切忌投以寒凉之药。患者冬宜温室防风寒也，夏宜明窗避暑热也。肌肉长平，疮口将敛，尤宜小心谨慎调理，偶一疏忽，恐致虚脱暴变，命必危矣。

内消治法

经云：发表不远热。又云：汗之则疮已，故宜内消表散。然惟脉证俱实者，方可用之。若脉证俱虚，便宜兼补。发渴便秘，急须流行，不可概施表散也。痈疽皆因气血凝结，火毒太盛所致，故以清热解毒、活气活血为主。更宜详看部位属何经络，即用引经之药以治之，则肿病自消，肌肉自平矣。

内托治法

凡疮肿已成，不能突起，亦难溃脓，或坚肿不赤，或痛或不痛，而脓少清稀，疮口不合，皆气血虚也。宜以大补气血，调和荣卫为君，祛毒为佐，加以辛香行其郁滞，加以温热御其风寒，候脓出肿消，腐肉尽去，气血充足，肌肉自生。

虚实治法

凡治痈疽不问阴阳表里，日数远近，但未见脓，俱宜灸之。

焮肿发热，脉浮者，宜用托里之药。若脉紧，发热恶寒，遍身拘急，无汗者，宜用表散之药。肿硬口干，二便秘结者，宜用下利之药以泄其热毒。焮痛势深，烦躁饮冷，口燥舌干，便和者，宜用清热之药。内脓不出，瘀肉堵塞疮口者，用刀割开之。软漫无脓，不腐溃者，阳虚也，助以温补以生其阳。溃后新肉生迟如冻色者，肉冷肌寒也，宜倍加温热。大汗不止者，亡阳也，宜用桂附。自汗肢厥者，宜投四逆。溃后肌肉消瘦，脓水清稀，面色黄白，脾虚也。不寐发热，虚火上炎也。疮口懈大者，气陷不固也。食小作渴，大便溏者，脾虚热也。俱宜清补助脾之药。以上本《金鉴》。

内消法

程钟龄曰：凡病痈疽、发背、对口、疔毒，其初起憎寒壮热，有似伤寒，而痛偏一处，饮食如常者，蓄积有脓也。当初起时，脓尚未形成，不过气血乖违逆于肉里耳。外敷以远志膏，或贴普救万全膏，内服银花甘草汤俱见后，即时消散。若气疔疮急，宜刺破或艾灸肿处，搽上蟾蜍饼，贴以万全膏，内服菊花甘草汤俱见后，随即平伏。其中亦有挟风寒而发者，宜先用芎芷香苏散见后以散之，随服菊花、银花等药，即可内消。须及早下手，不可迟滞。

艾灸法

隔蒜灸法，胜用刀针。凡治痈疽疔肿流注及一切无名肿毒，以大蒜切片安疮顶上，用陈艾炷安蒜上，香点灸之。其艾炷大小，看疮毒大小为取裁。若痈疽之大者，以蒜捣饼敷上灸之。若内已有脓，即将乌金膏见后涂灸处，外用万全膏贴之，烂开大口，卸却瘀脓已收功也。若口不收或腐肉不脱，洗用防风汤，敷以海浮散，外贴万全膏俱见后，腐去新自生，计日可愈，真神药也。凡用灸宜先服护心散，以防火气入内。〔批〕《金鉴》云：肾俞发，禁灸，恐消肾液。手背不宜灸，因皮肉浅薄也。

《集解》云：凡人初觉发背，欲结未结，赤肿焮痛，以湿纸覆其上，先干处即痛头也，取独头大蒜切片，安于痛顶上，用艾灸

之，三壮换一蒜片。痛者灸至不痛，不痛者灸至痛时方止，最要早觉早灸为上。若有十数头者，即用蒜研作饼铺头上，聚艾于饼上烧之。若初发赤肿一片，中间有黄粟米头子，便用独蒜片安于头上，着艾灸十四壮或四十九壮，使毒气外出，则易愈。

史源曰：有灸至八百壮者，约艾一筛，初坏肉不痛，直灸于好肉方痛。至夜火焫满背，高阜头孔百数，则毒外出，否则内逼五脏而危矣。

李迅曰：痈疽着灸，胜于用药，三壮一易，百壮为率。但头顶以上切不可用，恐引气上，更生大祸也。《纲目》曰：《精要》谓头上发毒不得灸，此言过矣。头为诸阳所聚，艾炷宜小，壮数宜少，小者如椒粒，少者三五壮而已。汪讱庵曰：按东垣灸元好问脑疽，以大艾炷如两核许者，灸至百壮，始觉痛而疮。由是推之，则头上发毒，灸之痛者，艾炷宜小，壮数宜少；若不痛者，艾炷大，壮数多，亦无妨也。

《金鉴》云：诸书云，头上发毒不可灸，然遇纯阴下陷之证，必当灸之。若半阴半阳之证，仍当禁灸也。〔批〕钟络又云：头面阴毒平填顽麻，非艾灸无功，但炷宜小如黍粒耳。

神火照法 余详火照散条下，见后外治方。

凡肿在头面以上者，不宜艾灸，恐引火气上攻，宜用火照法，神乎其神。法用火照散见后安纸捻中，以麻油浸点，每用火三枝，离毒半寸许，照之，自外而内，俾气透入。皮色紫滞者，立转红活。若疮势平塌者，立转高耸。仍须不时照之，则毒气顿解，转阴为阳，以收全功。

刀针砭石法

凡毒有胀痛紧急，脓已成熟，无暇待灼艾火照者，即宜用刀法开之。但刀法须在的确脓熟之时，又须要深浅合度。以左手按肿处，先看脓之成否。如按下软而不痛，肿随手起者，脓已成也。按下硬而痛，或陷下不起者，脓未成也。已成者，可刺；未成者，姑待之。若脾气虚弱不能作脓，宜托补之。又须看其脓之浅深，