

四科簡要方 乙集

潛齋醫學叢書十四種

卷之四

四科簡效方乙集目次

外科通治

瘰癧初起

焮赤腫痛為瘰癧陽證也

已成未成

已成不潰

膿淨不合

瘰生數處

偏體火瘡

偏體浸淫

身面熱瘡

身面疥瘡

偏身風癩

洋徽瘡

結毒

多年惡瘡

翻花瘡

瘰瘡努肉

諸瘡生蛆

諸瘡成管

瘡爛成孔

瘡久成漏

瘡痕不滅

漆瘡

疔生黃豆與病人嚼之不醒者是疔

魚臍疔

四面赤中央黑凹者是

疽

毒自臟發外不焮腫陰證也

已成未成

石疽

如石堅硬不作膿者

疔疽內陷

移毒法

隔皮取膿法

疽瘡骨出

白駝俗名爛花風  
又名蛇皮癬

瘙癢身而赤腫  
癢痛也

丹毒遊風赤  
疹也

諸癬

牛皮頑癬

赤白癩風

赤癩

白癩

上部諸證

頭瘡

禿瘡

肥瘡

天泡瘡

眉疽

偷鍼

耳後月蝕

玉枕瘡

鼻瘡膿臭

鼻蝕穿唇

唇瘡

口瘡

羊鬚瘡

對口

天柱瘡

疔腮

頸項結核

瘰癧馬刀

瘰癧已潰

瘰氣

贅疣

點痣

中部諸證

肩疽

腋癧

腋疣

瘰疽

臂疔

蛇頭

代指

俗名疔

發背

乳癧

脇瘡

腋疽見臟

脇腰丹毒

蛇纏

腸癧

小腹腫痛小便似淋或大便黏澀下膿脚不能伸者是

下部諸證

便癧

凡便毒微瘡皆發于外腎上橫骨乃督任二脈之病也

囊癧

囊瘡

莖瘡

下疳

懸癧

生于肛前囊後俗名倫囊老鼠

痔

痔漏

坐板瘡

腎瘻

附骨疽

膿瘡

骹肚瘡

毒熱足腫

足跟瘡

甲疽

肉刺

趾潰

跌打傷

通治

傷筋

傷骨

傷腦

傷眼

擦落耳鼻

穿斷舌心

腸出

囊破

破傷風全瘡傷同

閃挫腰痛

閃拗手足

杖傷

金刃傷

通治

出血不止

瘀血內漏

瘀血在腹

血出閃絕

發腫疼痛

指斷

腸出

莖斷

箭傷

箭簇不出

槍子入肉

鐵折入肉

湯火傷

通治

偏體傷者

未起泡者

已起泡者

泡破

爛見骨

滾油潑傷

爆竹炸傷

火藥傷

煤炭毒

烟熏悶絕

灸瘡

人物傷

人齧

馬齧

豬齧

犬齧

貓齧

鼠齧

虎齧

虎能狼爪傷

蛇齧

蛇纏不解

蛇入人竅

蛇骨刺人

辟蛇法

壁虎齧

蝎螫

蜈蚣齧

蜘蛛齧

壁鏡齧

蠶齧

蜂螫

蟻螫

戴發毒

一名楊辣  
一名瓦辣

蚯蚓呵

諸蟲齧

四科簡效方乙集

海甯王士雄孟英選

鄞縣 曹炳章赤電氏圈點

外科通治

瘰癧初起 煨赤腫痛為瘰癧證也。

生大黃研末篩細醋和塗之燥即易不過三次即消散

花粉 赤豆等分研末醋調圍之

木芙蓉 花葉根皆可用或采花 杵爛乾者研末圍之中間留頭乾則頻易初起者即消散已

成者即膿聚而潰已潰者易斂生肌或加赤豆末同圍其功更大除陰毒貼骨疽之外無不

神效。

已成未成

牛皮膠 一名黃明膠 一片水漬軟當頭開孔貼之未膿自消已膿潰出

已成不潰

取白雞兩翅下第一羽各一莖燒灰研末水調下雀屎取堅硬者酒塗之即破

蠶繭已出蛾者燒灰酒服用一枚出一頭二枚出一頭

膿淨不合



先以槐枝葱白煎湯洗。後用瓦松陰乾為末。傅或用經霜桑葉研傅。或秦艽研末。糝濃煎棗湯洗之。再以鼈甲煨存性研末。糝絲瓜杆汁頻塗。瘰癧生數處。

牛糞燒灰。研雞子清。或醋調塗。

徧體火瘡

初起似沸。漸如水泡。熱似火燒。瘡色紫赤。不治殺人。藿藎葉即油菜搗汁。調大黃。芒硝。生鐵鏽等分塗。

徧體浸淫

凡猝得毒氣攻身。瘡赤癢痛。上下周匝。煩悶欲死。此浸淫瘡也。起于心下者最險。不早治殺人以雞冠血塗之。日四五次。

新羊糞絞汁塗。

胡燕窠中土研末。水和敷。

身面熱瘡

榆白皮研末。油和塗。

苦參末。粟米飲丸。梧子大。每五十九。空心米飲下。

身面疥瘡

樺樹皮燒灰積殼去核各四兩 荆芥穗二兩 甘草五錢 杏仁水浸過去皮三兩 各研和勻再研母一錢食遠溫

酒下瘡甚者日二服。

葛蒲煎湯洗併研鋪席卧。

偏身風癩

濃煮浮萍湯頓浴。浴須半日。俾毒氣外泄。再以苦參五兩切片。好酒二斗。漬三十日。母飲一合。日三服。常服不絕。自瘥。

洋微瘡

土茯苓兩 生以仁 銀花 防風 木瓜 木通 白鮮皮各五錢 皂角子四錢 氣虛者加人參

水。血虛者加當歸。水一大椀。煎飲。日三。忌飲茶及牛羊雞鵝魚肉。燒酒法。麪房事。半月即愈。病深者月餘必愈。若誤服輕粉。以致筋骨攣痛。癱瘓不能動履者。服此亦效。

鮮生地 生以仁各五錢 銀花三錢 花粉 連翹 白鮮皮 威靈仙 角刺 蟬蛻各二錢 白芷

錢。生甘草半錢 生白果仁 紅棗肉各十枚 以鮮土茯苓四兩。水六椀。煎減半。取水煎藥。毒甚者

加大黃三錢。發在頭者加升麻五分。發在足者加川牛膝三錢。日服一劑。以愈為度。此病萬

不可服升丹。隱藥以圖速效。誠恐引毒入臟。後發莫救。惟此一方最穩最效。餘詳願體醫誌。

潛齋醫學叢書 四科簡效方 乙集 外科通治 二

結毒

紅棗<sup>五斤</sup>以杉木作柴煮之熟。去皮核。即取杉柴炭研細末。和棗肉杵勻。丸彈子大。每日任意食之。不可間斷。雖瘡毒滿身。或服過輕粉及丹石隱藥。以致穿頂穿鼻。腐爛不已。多年不愈者。服此大效。且極穩當。然愈後須再服一二月。以刈根株。忌醋辣椒<sup>即食茱萸一名辣茄</sup>及一切發物。多年惡瘡。

鉛粉 硃砂等分為末。蜜和塗。

諸藥不瘥者。馬齒莧搗爛傅之。

翻花瘡

柳枝葉三斤。水五升。煎汁二升。熬如飴。日三塗之。蒼耳葉搗汁塗。日一。

癩瘡努肉

烏梅肉燒存性。研傅惡肉上。一夜可消大半。再上一日而平。

凡瘡膿用力太過。以致努肉突出如梅如栗。久不縮入。乃損傷氣脈使然。若用降藥。雖腐去其小者。復又突出大者。屢蝕屢突。經年不愈。宜以大熟地炒枯<sup>一兩</sup>。大烏梅肉炒炭<sup>三錢</sup>。共研細

糝膏藥上貼之。不過數日即收。再用粉霜收口。併治陰虛脫肛。用防風升麻各一錢。煎湯調

搽即收。

諸瘡生蛆

綠礬研末。摻之即化為水。

生麻油渣貼之。

柏枝即燒漚。取油塗之。數次即愈。亦治牛馬疥。

諸瘡成管

大蒜梗燒灰。搽即脫。

瘡爛成孔

粳米甑上氣汗水。以瓷盤承滴頻搽。

瘡久成漏

金銀花浸酒常飲。

瘡痕不減

燕蓂草燒灰。鷹屎白等分。研人乳和塗。

鮮椒攪切斷。麝香少許。搽之無瘢。

漆瘡

嚼川椒塗口鼻則免患。

杉木 紫蘇 萹菜 白礬 乾荷葉 川椒 皆可煎湯洗

疔 以生黃豆與病人嚼之不腥者是疔。

金銀花或菊花連莖葉搗絞自然汁半椀煎八分服之。以滓敷患處。或嚼生黃豆塗之。或取烟桿中烟油厚敷四圍。留頭不敷。少刻疔破出水而痊。

青石末同荔枝肉杵爛。以雌雞屎調塗。其根自拔。水疔色黃。麻木不痛。暗疔瘡凸色紅。使人

昏狂。並以三稜鍼疔瘡忌鍼或金鍼銀鍼皆可用刺患處四畔。後用銀杏去殼浸油中。年久者杵爛卷之。此藥

甚簡易而功效甚大。須預浸以濟世。兼治鍼刺入肉。諸藥所不能出者。及勞苦遠行人。瓷鋒嵌入脚內皆效。

魚臍疔 四面赤中央黑凹者是

臘猪頭燒灰雞子清調敷日數易

葱白 蜂蜜杵塗四圍

疽 毒自臟發外不焮腫陰證也。

獨蒜杵爛麻油和厚敷之

初起未成者。先以艾炙為妙。其法用溼紙搗上。先乾處是頭。便用大獨蒜。切如錢厚。放毒頂上。以陳艾揉熟作炷炙之。三壯一易。蒜片不計壯數。以痛者灸至不痛。不痛者灸至極痛為率。此法一使瘡不開。二使內肉不壞。三使瘡口易合。功難盡述。惟頭項之毒不可灸。陽證

瘰癧不可灸耳。

已成未成

草烏 南星等分為末。少加肉桂和勻。生薑汁熱酒調塗。未成者內消。已成者即潰。久潰者能去腐爛。

石疽

如石堅硬不作膿者

醋五升。以粗黃石如鵝卵者。猛火燒赤。焯之取出。再燒再焯。至醋減半。將焯過之石搗細末。即以此醋和厚塗患處。以消為度。

黃耆

人參各一兩

為末。入冰片錢一生藕汁丸。綠豆大。每二十九丸。溫水下。

疔疽內陷

凡疔疽最慮毒不外達而反內攻。初起三日內。用真綠豆粉一兩乳香五錢燈心同研和勻。每一錢濃煎生甘草湯調。時時呷之。使常在膈間。若兼嘔逆。即毒氣內攻之漸。尤宜亟服。設鼻生瘡。因飲食不進。即危矣。四五日後。猶宜間服之。

移毒法

凡毒生要害。不便出膿之處。此藥能移之。或上或下。俾無後患。用白芨六錢紫化地丁八錢五倍子二錢好硃砂 明雄黃 輕粉各一錢牙皂八分烏雞骨一錢煨。共研末。以醋調敷毒之上。截即

能移至下截。敷下則移上。極效。

雄黃 飛麩 蚯蚓糞。共研細。醋調。漸漸塗而逼之。自能移過要害處也。

隔皮取膿法

凡疽毒深遠。膿難直取。或患人畏用刀鍼者。膿熟時。用此法甚妙。驢蹄皮即脚底別下者妙。收麥麩

各一兩。草烏四錢。

刮去皮。共研勻。加食鹽五錢水調和成薄餅。瓦上炙微黃。再研細。醋調攤白紙上。貼

患處。膿即從毛孔而出。蓋以草紙滲溼。即換膿淨紙。燥腫亦自消。如膿不從毛孔出。則塗藥之旁。自然潰出一孔。神妙無比。

疽瘡骨出

黃連 牡蠣等分研末。先以鹽酒洗過。敷之。

蜜陀僧研末。桐油調勻攤貼。

白駝俗名癩花風。又名蛇皮癬。

先以布擦透。後用醋磨石硫黃。附子塗之。或硫黃。白礬擦之。

先以皂角湯洗。再煎茵陳湯洗。後以醋調蛇蛻灰搽。若頭面先起。漸長如癬。急用穿山甲片

刮令燉痛。以炙熟猪脂頻擦。即愈。

瘡癢。身面赤腫癢痛也。

茵陳煎濃汁洗

鐵鏽磨水塗

荆芥穗 赤豆等分研雞子調塗

丹毒 遊風赤疹也。

無名異研末葱汁調塗

芭蕉搗爛塗

羚羊用燒灰雞子清和塗

諸癬

五倍子去蟲白礬燒過等分研末溼者糝之乾者油調

生白果仁或薑黃頻擦

韭根炒存性研猪油和塗

牛皮頑癬

藜蘆末生油和塗

烟膠 寒水石 各三錢 白礬 二錢 花椒 半錢 共研末猪油調塗

赤白癩風

醫方類聚

外科通治

五



貝母 南星等分為末。生薑帶汁擦之。

猪脬一具。酒浸一時。飯上蒸熟食。不過十具愈。

桑枝十益母草三水熬成膏。每卧時酒服一二兩。

赤癩

醋磨知母擦之。日三。

白癩

白蒺藜六兩。生研末。每服二錢。日二。半月白處見紅點。一月絕根。

生胡麻研末。每用酒服一兩。日三。至五斗瘡。忌生冷雞豬魚蒜等百日。

上部諸證

頭瘡

先用醋少許和水。淨洗去垢。再用溫水洗。裏乾。百草霜細研。入鉛粉少許。生油調搽。

五倍子白芷等分研末。青油調敷。上溼者糝之。

鴿屎研末。醋調搽。最妙。用生蘆葦杆爛。米醋泡透敷。

秃瘡

殺猪時。取其肚破去屎。乘熱反卷頭上。須臾蟲出。若肚若不盡。再作。至無蟲。以皂角湯執洗。