

御纂醫宗金鑑卷五十八

編輯痘疹心法要訣目錄

痘中雜證

發熱

升麻葛根湯

加減消毒飲

清毒活血湯

大連翹飲

驚搐

清解散

導赤散

寧神湯

木香大安丸

頭痛

大連翹飲

清解散

腰痛

加味歸宗湯

腹痛

芍藥防風湯

加味平胃散

桂枝大黃湯

煩躁

加減消毒飲

涼血解毒湯

加味保元湯

加減四物湯

譫妄

黃連解毒湯

渴

葛根解毒湯

涼血解毒湯

人參麥冬散

生赭六均湯

厥逆

加減陳氏木香散

附子理中湯

梔子金花湯

承氣湯

喘

杏蘇飲

涼膈白虎湯

人參白朮散

參歸鹿茸湯

痰

加味二陳湯

保元化毒湯

咳嗽

杏蘇飲

人參清膈散

加味二陳湯

乾噦

橘皮竹茹湯

丁香柿蒂湯

嘔吐

梔連二陳湯

加味鼠麴子湯

木香大安丸

參砂和胃湯

噤水

加味甘桔湯

加味解毒湯

口噴穢氣

歸宗湯

不食

涼血解毒湯

人參白朮散

加味甘桔湯

加味平胃散

汗

加味保元湯

當歸六黃湯

秘結

四順清涼飲

八正散

瀉泄

柴苓湯

陳氏木香散

胃苓湯

豆蔻丸

痢疾

加味四君子湯

加味四物湯

癰

加味升麻葛根湯

十全大補湯

避穢香

內托散

痛

升麻葛根湯

加味四物湯

失音

加味甘桔湯

衄血便血

犀角地黄湯

人參白朮散

髮灰散

加味四物湯

歸脾湯

寒戰咬牙

羌活湯

加味四物湯

參歸鹿茸湯

倦怠

補中益氣湯

加味保元湯

痘後浮腫

五皮湯

胃苓湯

胃苓湯

正史湯

血氣調和

此和胃湯

解中益氣湯

卷五十二



御纂醫宗金鑑卷五十八

編輯痘疹心法要訣

痘中雜證^上

發熱

表熱無汗升麻湯裏熱有汗消毒良行漿毒蒸清毒劑結後餘熱連翹方

^註痘之一證始終不可盡除其熱蓋熱非壯熱乃和緩之熱

也以寒卽收縮熱則宜發故初不熱則出不齊脹不熱則漿不行收不熱則痂不結自初出以至起脹時皮膚乾燥發熱無汗此熱在表也升麻葛根湯加荊芥穗防風主之

蒸熱有汗此熱在裏也加減消毒飲主之至行漿時熱不減者此爲毒熱薰蒸宜用清毒活血湯便秘者去人參黃耆加酒炒大黃至結痂後發熱壯盛胸腹手足俱熱二便秘澀者此爲餘毒過盛宜用大連翹飲治之

升麻葛根湯

方見發熱證治

加減消毒飲

升麻

牛蒡子

炒研

山豆根

紫草

連翹

去心

生地黄

赤芍

川黃連

甘草

生

引用燈心水煎服

方歌加減消毒飲如神升麻牛蒡山豆根紫草連翹生地芍黃

連甘草引燈心

清毒活血湯

方見灌漿證治

大連翹飲

方見收靨證治

驚搐

未見點搐清解方已見猶搐導赤耳靨後虛搐寧神劑食蒸發
搐大安康

註

驚痘者多緣痘毒之火觸動心神移熱於肝肝風與心火
相搏遂成是證治法須別始終如痘未出而先發搐者不
可純用寒涼壅閉其毒惟以清解散疎散表邪痘出而搐

自止矣若痘已見形仍抽搐不止者此毒火內伏心經也
宜用導赤散加黃連治之醫後發抽者是真氣虛弱火邪
內攻以寧神湯主之痘後食蒸發搐者此脾胃虛弱必面
黃潮熱大便秘臭宜木香大安丸治之

清解散 方見發熱證治

導赤散

木通

生地黃

淡竹葉

甘草梢

引用燈心水煎服

方歌痘已見形仍作驚導赤散治最有功木通生地黃
淡竹葉