

临床执业医师 模拟试卷

本书专家组 编

全真实战模拟
紧扣考试大纲
强化题型训练

三套精选试题
综合考查要点
增强应考能力

210-4

试卷标识码: ****

将此标识码填涂在答题卡指定位置

2011 年医师资格考试模拟试卷 (一)

(医学综合笔试部分)

报考类别: 临床执业医师 第四单元

考试日期: 2011 年 9 月 18 日

考试时间: 14 : 00 ~ 16 : 30

考生姓名: _____

准考证号: _____

考 场 号: _____

中国协和医科大学出版社

答 题 须 知

1. 考生答题前应先检查试卷封面标示的考试类别和每页页码所标出的考试类别是否与本人准考证上的报考类别一致。
2. 在开始答题前，请再次核对自己在答题卡上填写的姓名、准考证号、报考类别、考试单元是否完整无误。
3. 在开始答题前，请考生检查试卷有无缺损、重印、错印，发现上述情况应立即报告监考员。
4. 答题卡上的考生信息和答案的所有信息点，必须使用 2B 铅笔按答题卡上“注意事项”栏中的要求填涂，如需要作修改，应用橡皮将原涂黑的地方擦干净。
5. 答题卡上“考场记录”一栏由监考员负责填写，考生不得自行填写。
6. 答题卡将采用计算机阅卷，请注意保持答题卡平整、干净。
7. 开始考试后半小时内，考生不得交卷出场。
8. 考试结束时，请把试卷和答题卡分别翻放在桌上，不得带出考场。
9. 监考员验收试卷和答题卡后，经监考员允许，考生方可退场。
10. 考生如违反“考场指令”和本“答题须知”，其一切后果由考生本人承担。

A1 型题 (1 ~ 77 题)

答题说明

每一道考试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 骨折的复位标准是
 - A. 长骨干横行骨折对位至少达到 3/4
 - B. 成人下肢短缩移位 在 3cm 之内
 - C. 必须完全矫正旋转移位和成角移位
 - D. 儿童骨折必须解剖复位
 - E. 前臂双骨折要求对线、对位较好
2. 一侧乳腺具有的腺叶数大约为
 - A. 25 ~ 30 个
 - B. 35 ~ 40 个
 - C. 45 ~ 50 个
 - D. 5 ~ 10 个
 - E. 15 ~ 20 个
3. 符合骨折功能复位的是
 - A. 10 岁女孩干骺端骨折对位达 1/4
 - B. 6 岁儿童股骨骨折短缩 1.5cm
 - C. 20 岁女性肱骨干骨折分离移位 0.5cm
 - D. 45 岁女性股骨骨折短缩 2cm
 - E. 青年男性胫腓骨骨折侧方成角 20°
4. 阴道 B 型超声最早在宫腔内见到妊娠囊的时间是停经后
 - A. 8 ~ 9 周
 - B. 10 ~ 11 周
 - C. 2 ~ 3 周
 - D. 4 ~ 5 周
 - E. 6 ~ 7 周
5. 脊柱骨折搬运时禁用的方法是
 - A. 平托将伤员移至木板
 - B. 平托将伤员移至担架
 - C. 多人用手同时平托搬运
 - D. 一人抬头一人抬足搬运
 - E. 将病人躯干成一整体滚动
6. 手外伤正确的术后处理是
 - A. 患肢下垂，防止缺血
 - B. 用纱布将手指严密包扎
 - C. 用石膏托将手固定于功能位
 - D. 肌腱修复后固定 1 ~ 2 周
 - E. 神经修复后要固定 2 ~ 3 周
7. 2 ~ 12 岁小儿体重 (kg) 计算公式是
 - A. 年龄 $\times$ 2 + 9
 - B. 年龄 $\times$ 3 + 8
 - C. 年龄 $\times$ 1 + 8
 - D. 年龄 $\times$ 1 + 9
 - E. 年龄 $\times$ 2 + 8
8. 胸腰椎 Chance 骨折是指
 - A. 不稳定性爆破型骨折
 - B. 脊柱屈曲 - 牵拉型损伤
 - C. 椎体水平状撕裂性损伤
 - D. 单纯性楔形压缩性骨折

- E. 脊柱骨折脱位
9. 外伤胸壁软化（浮动胸）是由于
- A. 两根以上肋骨骨折
 - B. 多根多段肋骨骨折
 - C. 胸骨骨折
 - D. 反常呼吸
 - E. 二氧化碳潴留
10. 对于曾有输血相关非溶血性发热反应病史的慢性贫血患者，输血时应首选的血液制品为
- A. 浓缩红细胞
 - B. 悬浮红细胞
 - C. 辐照红细胞
 - D. 少白细胞的红细胞
 - E. 新鲜全血
11. 诊断上尿路结石的 X 线检查应首选
- A. CT
 - B. MRI
 - C. 腹部平片 + 静脉尿路造影
 - D. 逆行肾盂造影
 - E. 肾动脉造影
12. 需要做患侧肾输尿管全切除的疾病是
- A. 多发性肾结石
 - B. 肾母细胞瘤
 - C. 肾盂癌
 - D. 肾癌
 - E. 肾结核
13. 宫颈上皮内瘤变确诊的手段是
- A. 宫颈细胞涂片
 - B. 醋酸涂抹
 - C. 宫颈活组织检查
 - D. 阴道镜检查
 - E. 阴道分泌物检查
14. 孕激素治疗不适用于
- A. 不能手术治疗的子宫内膜癌
 - B. 晚期子宫内膜癌
 - C. 复发性子宫内膜癌
 - D. 早期、要求保留生育能力的子宫内膜癌
 - E. 早期子宫内膜癌
15. 侵蚀性葡萄胎与绒毛膜癌的鉴别要点是
- A. 有无葡萄胎史
 - B. 阴道流血时间
 - C. 有无转移表现
 - D. 镜下有无绒毛结构
 - E. 血 β -HCG 水平
16. 过期妊娠时，需立即终止妊娠的为
- A. OCT 阴性
 - B. NST 反应型
 - C. Ⅲ度羊水粪染
 - D. 12 小时内胎动 12 次
 - E. B 型超声显示羊水平面 6cm
17. 临产时可以灌肠的是
- A. 胎膜已破，宫口开大 2cm，头先露，S+1，胎心率正常
 - B. 宫口开大 2cm，头先露，S+1，胎心率正常，阴道流血，量较多
 - C. 产程顺利，估计 1 小时内胎儿可以娩出

- D. 胎膜未破, 臀先露, 胎心率正常
E. 胎膜未破, 宫口开大2cm, 头先露, S+1, 胎心率正常
18. 胎盘部位滋养细胞肿瘤免疫组化染色增强的标记物是
A. CA125
B. AFP
C. LDH
D. CEA
E. HPL
19. 发生协调性子宫收缩乏力时的一般处理不包括
A. 补充能量
B. 排空膀胱
C. 预防感染
D. 静脉注射地西泮
E. 纠正酸中毒
20. 慢性乙型肝炎最重要的治疗是
A. 免疫调节治疗
B. 保肝治疗
C. 抗病毒治疗
D. 中医中药治疗
E. 抗纤维化治疗
21. 妊娠早期心脏病患者是否继续妊娠, 主要根据
A. 患者年龄
B. 胎儿大小
C. 心脏病种类
D. 心功能分级
E. 病变发生部位
22. 先兆流产典型的临床症状为
A. 痛经、阴道流血
B. 腹痛、阴道流血、发热
C. 停经、腹痛、阴道流血
D. 腹痛、阴道流血、恶心
E. 腹痛、阴道流血、晕厥
23. 孕妇分娩出院后, 社区医院进行产后随访的次数至少应为
A. 1次
B. 2次
C. 3次
D. 4次
E. 5次
24. 小儿脊柱出现胸椎后凸(第二个生理弯曲)的时间是出生后
A. 9个月
B. 12个月
C. 1个月
D. 3个月
E. 6个月
25. 霍乱流行时最主要的传播形式是通过
A. 食物
B. 水
C. 生活接触
D. 苍蝇媒介
E. 呼吸道
26. 小儿死亡率最高的时期是
A. 新生儿期
B. 婴儿期
C. 幼儿期

- D. 学龄前期
E. 学龄期
27. 3岁小儿每天每千克体重所需总能量约为
A. 80kcal
B. 100kcal
C. 120kcal
D. 140kcal
E. 160kcal
28. 儿童蛋白质-热能营养不良的诱发因素中, 最常见的疾病是
A. 长期发热
B. 急、慢性传染病
C. 恶性肿瘤
D. 肠道寄生虫病
E. 消化系统疾病或先天畸形
29. 新生儿溶血病中, 需进行换血治疗时, 换血量为每千克体重
A. 60~80ml
B. 90~110ml
C. 120~140ml
D. 150~180ml
E. 190~210ml
30. 提示新生儿败血症较特殊的表现是
A. 精神萎靡、嗜睡
B. 哭声减弱
C. 食欲减退
D. 黄疸退而复现或突然加重
E. 体温不稳定
31. 咽-结合膜热的病原体为
A. 合胞病毒
B. 流感病毒
C. 柯萨奇A组病毒
D. 腺病毒3、7型
E. 鼻病毒
32. 婴幼儿哮喘评分法诊断标准中不包括
A. 反复咳嗽发热
B. 喘息发作次数
C. 肺部哮鸣音
D. 喘息症状突然发作
E. 一、二级亲属中有哮喘
33. 造成地方性甲状腺功能减低症的原因是
A. 促甲状腺激素缺陷
B. 甲状腺素合成途径中酶缺陷
C. 碘缺乏
D. 甲状腺不发育或发育不全
E. 甲状腺或靶器官反应低下
34. PPD 试验, 72 小时观察局部红肿硬结 15mm, 其结果判断为
A. 阴性
B. +
C. ++
D. +++
E. ++++
35. 非典型苯丙酮尿症是由于缺乏
A. 酪氨酸
B. 苯丙氨酸羟化酶
C. 多巴胺
D. 5-羟色胺

- E. 四氢生物蝶呤
36. 乳腺癌术后辅助化疗 CAF 方案的三种药物为
- A. 环磷酰胺、阿霉素、氟尿嘧啶
B. 环磷酰胺、阿霉素、多西紫杉醇
C. 长春新碱、甲氨蝶呤、多西紫杉醇
D. 长春新碱、阿霉素、氟尿嘧啶
E. 长春新碱、甲氨蝶呤、氟尿嘧啶
37. 肺孢子菌肺炎治疗应首选
- A. 克林霉素
B. 氨苯砒
C. 复方新诺明
D. 氯霉素
E. 卡泊芬净
38. 苯丙酮尿症血液中增高的是
- A. 酪氨酸
B. 苯丙氨酸
C. 多巴胺
D. 5-羟色胺
E. 丙氨酸
39. 子宫内膜异位症最常见的发病部位是
- A. 直肠
B. 膀胱
C. 卵巢
D. 输卵管
E. 阴道
40. 新生儿先天性甲状腺功能减低症筛查检测的指标
- A. T_3
B. T_4
C. TSH
D. TRH
E. ACTH
41. 妊娠早期心脏病患者是否继续妊娠, 主要根据
- A. 患者年龄
B. 胎儿大小
C. 心脏病种类
D. 心功能分级
E. 病变发生部位
42. 隐匿性维生素 D 缺乏性手足搐搦症可引出的神经肌肉兴奋性增高的体征是
- A. 布鲁津斯基征
B. 巴宾斯基征
C. 可尼格征
D. 面神经征
E. 阿宾汉征
43. 新生儿寒冷损伤综合征重度低体温患儿复温时间为
- A. 12 ~ 24 小时
B. 24 ~ 36 小时
C. 0 ~ 1 小时
D. 3 ~ 6 小时
E. 6 ~ 12 小时
44. 诊断子宫内膜异位症的依据不包括
- A. 腹腔镜检查发现卵巢巧克力囊肿
B. 镜下异位组织中找到子宫内膜间质细胞
C. 月经稀发

- D. 继发性痛经
E. 盆腔触痛结节
45. 急性乳腺炎最常发生在产后
A. 第3个月
B. 第4个月
C. 第5个月
D. 第1个月
E. 第2个月
46. 妊娠期母体循环血容量达高峰的时期是在妊娠
A. 28~30周
B. 32~34周
C. 36~38周
D. 20~22周
E. 24~26周
47. 胸部尺神经损伤的临床表现是
A. 拇指对掌功能障碍
B. Froment征阳性
C. 垂腕、垂指畸形
D. 手部2~4指感觉障碍
E. 环、小指末节屈曲功能障碍
48. 对哮喘持续状态的患儿，应及时尽早选用的治疗是
A. 静脉应用糖皮质激素
B. 皮下注射肾上腺素
C. 使用巴比妥类药
D. 速效 β_2 受体激动剂吸入
E. 氨茶碱静脉滴注
49. 6个月小儿需要接种的疫苗为
A. 卡介苗、乙肝疫苗、麻疹疫苗、百白破三联针
B. 卡介苗、乙肝疫苗、脊髓灰质炎糖丸、百白破三联针
C. 乙肝疫苗、麻疹疫苗、脊髓灰质炎糖丸、乙脑疫苗
D. 脊髓灰质炎糖丸、百白破三联针、麻疹疫苗、乙脑疫苗
E. 卡介苗、乙肝疫苗、乙脑疫苗、脊髓灰质炎糖丸
50. 卵巢恶性生殖细胞肿瘤的一线化疗方案是
A. PA方案（顺铂+阿霉素）
B. PC方案（顺铂+环磷酰胺）
C. BEP方案（博来霉素+依托泊苷+顺铂）
D. PEA方案（顺铂+依托泊苷+阿霉素）
E. TC方案（紫杉醇+卡铂）
51. 21-三体综合征患儿染色体核型的标准型是
A. 47, XX (XY), +21
B. 47, XX (XY), +21/46, XX (XY)
C. 46, XX (XY), -14, +t (14q21q)
D. 46, XX (XY), -21, +t (21q21q)
E. 46, XX (XY), -22, +t (21q22q)
52. 下列致病因素不引起人体感染的是
A. 病毒
B. 真菌
C. 原虫
D. 毒素

- E. 肌毒体
53. Apgar 评分的五项指标包括
- A. 心率、呼吸、皮肤颜色、肌张力、对刺激的反应
 - B. 心率、呼吸、对刺激的反应、哭声、皮肤颜色
 - C. 心率、肌张力、对刺激的反应、反射、皮肤颜色
 - D. 心率、意识、肌张力、对刺激的反应、皮肤颜色
 - E. 心率、肌张力、对刺激的反应、体温、皮肤颜色
54. 产程分期正确的是
- A. 初产妇第三产程需 15 ~ 30 分钟
 - B. 经产妇第三产程需 10 ~ 20 分钟
 - C. 初产妇第一产程需 11 ~ 13 小时
 - D. 经产妇第一产程需 8 ~ 10 小时
 - E. 初产妇第二产程需 1 ~ 2 小时
55. 属于子宫破裂的临床表现, 正确的是
- A. 病理缩复环不再升高
 - B. 产妇突感子宫收缩停止
 - C. 产妇疼痛难忍
 - D. 胎体触不清
 - E. 阴道多量鲜血流出
56. 枕先露妊娠时, 胎儿窘迫的诊断依据是
- A. 胎心 150 次/分
 - B. 胎儿头皮血 pH 值为 7.25
 - C. 胎动 40 次/24 小时
 - D. 破膜见羊水粪染
 - E. 胎心监测示“早期减速”
57. 妊娠末期心脏容量约增加
- A. 20% ~ 25%
 - B. 30% ~ 35%
 - C. 40% ~ 45%
 - D. 50% ~ 55%
 - E. 10% ~ 15%
58. 牛乳与人乳的最大区别是
- A. 饱和脂肪酸含量高
 - B. 各种免疫因子缺乏
 - C. 微量元素锌、铜含量较少
 - D. 蛋白质含量高
 - E. 乳糖含量少
59. 婴儿腹泻进行补液时兼有扩充血容量及纠正酸中毒的最合适的溶液是
- A. 2 : 3 : 1 溶液
 - B. 1.4% 的碳酸氢钠
 - C. 5% 的碳酸氢钠
 - D. 11.2% 的乳酸钠
 - E. 5% 的生理盐水
60. 骨折急救时主要应进行
- A. 抗感染治疗
 - B. 脱水治疗
 - C. 妥善固定
 - D. 通报家属
 - E. 开放骨折复位
61. 乙肝表面抗原阳性病人所用的手术器械, 术后使用哪种处理正确?
- A. 2% 戊二醛溶液浸泡 1 小时
 - B. 1 : 1000 新洁尔灭溶液浸泡 2 小时
 - C. 0.2% 过氧乙酸溶液浸泡 30 分钟

- D. 1:1000 洗必泰溶液浸泡 1 小时，煮沸 10 分钟
E. 1:1000 新洁尔灭浸泡 2 小时，煮沸 20 分钟
62. 8~11 个月的患维生素 D 缺乏性佝偻病的婴儿最常见的骨骼改变
A. 颅骨软化
B. 方颅
C. 手、足镯
D. 肋骨串珠
E. “O”形腿
63. 21-三体综合征确诊的依据是
A. 特殊面容
B. 智能落后
C. 体格发育落后
D. 皮肤纹理异常
E. 染色体检查
64. 典型苯丙酮尿症最主要的治疗方法是给予
A. 低苯丙氨酸饮食
B. 酪氨酸
C. 四氢生物蝶呤
D. 5-羟色胺
E. 左旋多巴
65. 人类语言发展的关键期为
A. 婴儿
B. 1 岁以内
C. 1~3 岁
D. 4~6 岁
E. 7~8 岁
66. 小儿乳牙开始萌出的时间最迟不超过生后
A. 8 个月
B. 10 个月
C. 12 个月
D. 14 个月
E. 16 个月
67. 维生素 D 缺乏病可靠的早期诊断指标是
A. 多汗、夜惊、烦躁
B. 血清钙、磷浓度降低
C. 血清活性维生素
D. 水平明显降低
E. 方颅、鸡胸或漏斗胸
68. 新生儿溶血病中，须进行换血治疗时，换血量为每千克体重
A. 60~80ml
B. 90~110ml
C. 120~140ml
D. 150~180ml
E. 190~210ml
69. 提示新生儿败血症较特殊的表现是
A. 精神萎靡、嗜睡
B. 哭声减弱
C. 食欲减退
D. 黄疸退而复现或突然加重
E. 体温不稳定
70. 小儿急性风湿热发生充血性心力衰竭时，使用强心剂治疗宜

- A. 用慢速制剂，剂量偏大
B. 用慢速制剂，剂量偏小
C. 用快速制剂，剂量偏大
D. 用快速制剂，剂量偏小
E. 需洋地黄，维持给药
71. 先天性甲状腺功能减低症最大的危害造成
- A. 运动功能发育迟缓
B. 生理功能低下
C. 消化功能低下
D. 智力发育低下
E. 造血功能低下
72. 绒毛膜癌的治疗首选
- A. 手术治疗
B. 化学治疗
C. 放射治疗
D. 中医中药治疗
E. 生物学治疗
73. 维生素 D 缺乏病可靠的早期诊断指标是
- A. 血钙降低
B. 血磷降低
C. 血镁降低
D. 血 $1,25-(\text{OH})_2\text{D}_3$ 降低
E. 血碱性磷酸酶增高
74. 新生儿溶血病换血治疗的指征，血清胆红素在足月儿至少应大于
- A. $171\mu\text{mol/L}$
B. $257\mu\text{mol/L}$
C. $342\mu\text{mol/L}$
D. $428\mu\text{mol/L}$
E. $513\mu\text{mol/L}$
75. 麻疹合并肺炎须隔离至出疹后
- A. 5d
B. 7d
C. 10d
D. 15d
E. 21d
76. 所谓 Roger 病是指
- A. 原发孔房间隔缺损
B. 继发孔房间隔缺损
C. 小型室间隔缺损
D. 中型室间隔缺损
E. 大型室间隔缺损
77. 关于小儿贫血的诊断标准，正确的是
- A. 新生儿期血红蛋白 $<90\text{g/L}$
B. 1~4 个月婴儿血红蛋白 $<100\text{g/L}$
C. 4~6 个月婴儿血红蛋白 $<110\text{g/L}$
D. 6 岁以上小儿血红蛋白 $<120\text{g/L}$
E. 血红蛋白 $<30\text{g/L}$ 为重度贫血

A2 型题 (78 ~ 104 题)

答题说明

每一道考题是以一个小案例出现的,其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

78. 初产妇, 21 岁, 妊娠 38 周, 双胎妊娠, 第二胎儿娩出后 10 分钟, 突然多量阴道流血, 色暗红。本例阴道流血最可能的原因是
- A. 胎盘剥离不全
 - B. 凝血功能障碍
 - C. 胎盘植入
 - D. 子宫收缩乏力
 - E. 软产道裂伤
79. 女, 10 岁, 水肿、少尿 3 天。尿量每天约 400ml, 伴头昏、头痛、眼花、恶心、频繁呕吐, 无心慌、胸闷、气促。查体: BP150/100mmHg, 双肺未见异常, 尿常规示: 红细胞 (++++), 白细胞 (++) , 蛋白 (+++)。血肌酐 $68\mu\text{mol/L}$, 血尿素氮 7.8mmol/L , ASO 阳性, C3 0.27g/L 。最可能的诊断是
- A. 急性肾小球肾炎合并急性肾功能不全
 - B. 急性肾小球肾炎合并高血压脑病
 - C. 急性肾小球肾炎合并严重循环充血
 - D. 急进性肾小球肾炎
 - E. 急性肾小球肾炎
80. 女性, 40 岁, 不规则阴道流血 3 个月。妇科检查: 宫颈呈菜花样, 约 $5\text{cm} \times 4\text{cm} \times 4\text{cm}$ 大小, 质脆易出血。三合诊左侧主韧带结节状增粗, 近达盆壁。宫颈活检示鳞状细胞癌。适合的治疗是
- A. 宫颈癌根治术
 - B. 化疗
 - C. 化疗后行宫颈癌根治术
 - D. 放疗
 - E. 宫颈癌根治术后加化疗
81. 女性, 35 岁, 因接触性出血经巴氏涂片示巴氏Ⅲ级, 活检诊断为浸润性宫颈癌, 临床分期Ⅱa, 治疗方案是
- A. 全子宫加双侧附件切除术
 - B. 全子宫加双侧附件切除术 + 盆腔淋巴结清除术
 - C. 次广泛性子宫加双侧附件切除术 + 盆腔淋巴结清除术
 - D. 广泛性子宫加双侧附件切除术 + 盆腔淋巴结清除术
 - E. 广泛性子宫加一侧附件切除术 + 盆腔淋巴结清除术
82. 初产妇, 27 岁, 妊娠 39 周临产, 规律宫缩 10 小时, 破膜 9 小时。胎心 140 次/分。肛查宫口开大 6cm, S + 1。本例应诊断为
- A. 胎膜早破
 - B. 正常潜伏期
 - C. 正常活跃期

- D. 潜伏期延长
- E. 第一产程延长

83. 女性, 30 岁, 与丈夫分居。在月经第 11 天时, 丈夫回家, 未避孕, 要求房事后紧急避孕, 首选的简便、安全、有效的措施为

- A. 宫内节育器
- B. 18 甲基炔诺酮
- C. 甲地孕酮
- D. 甲醚抗孕丸
- E. 米非司酮

84. 某患儿做健康体检, 测体重 12kg, 身高 85cm, 头围 48cm, 胸围 49cm, 乳牙 20 枚, 其相应的年龄应是

- A. 1 岁
- B. 2 岁
- C. 3 岁
- D. 4 岁
- E. 5 岁

85. 初产妇, 28 岁。妊娠 40 周, 临产 10 小时。枕右前位, 胎心 100 次/分, 胎心电子监测频繁出现晚期减速。立即行产钳术的指征是

- A. 先露 +1, 宫口开全, 骨盆无异常, 矢状缝与中骨盆前后径一致, 触及前囟
- B. 先露 +2, 宫口开全, 骨盆内测量无异常
- C. 先露 +4, 宫口开全
- D. 先露 +2, 宫口开全, 骶骨凹度差, 尾骨固定上翘

E. 先露 +2, 宫口开大 8cm, 骨盆内测量无异常

86. 初产妇, 28 岁。妊娠 39 周, 临产后宫缩强, 产程进展较快, 6 小时后宫口开大 9cm, 自然破膜后不久出现寒战、呛咳、气急、呼吸困难、血压下降。此时首选的应急措施是

- A. 静脉滴注多巴胺 20mg
- B. 静脉滴注低分子右旋糖酐 500ml
- C. 立刻气管切开正压给氧
- D. 静脉缓注氨茶碱 250mg
- E. 静脉注射地塞米松 20mg

87. 4 岁女孩, 自幼呼吸较急促, 消瘦, 乏力, 唇、指 (趾) 甲床青紫, 哭闹时加重, 体检: 胸骨左缘第 3 ~ 4 肋间可闻及Ⅲ级喷射样收缩期杂音, X 线检查右心室增大, 肺动脉凹陷, 最可能的诊断是

- A. 房间隔缺损
- B. 室间隔缺损
- C. 动脉导管未闭
- D. 肺动脉狭窄
- E. 法洛四联症

88. 1 岁半男孩, 高热 3 天, 体温高达 39℃, 第 4 天热退, 皮肤出现红色斑丘疹, 以躯干、颈部及上肢为多。最可能的诊断是

- A. 风疹
- B. 麻疹
- C. 幼儿急疹
- D. 猩红热

- E. 水痘
89. 男, 45 岁。体检发现抗 HIV 阳性, 患者无任何症状。进一步检查, $CD4^+$ T 淋巴细胞总数 $0.52 \times 10^9/L$, 淋巴细胞总数 $2.0 \times 10^9/L$; 血浆 HIV RNA5000 拷贝/毫升。目前正确的处理是
- A. 应用更昔洛韦
B. 观察, 定期复查
C. 应用 AZT 或 3TC
D. 应用蛋白酶抑制剂
E. 应用复方新诺明
90. 3 岁男孩, 因智力低下就诊, 查染色体核型为 46, XY, -14, +t(14q21q), 其母亲核型为 45, XX, -14, -21, +t(14q21q), 其母再次生育发生本病的风险为
- A. 10%
B. 25%
C. 50%
D. 75%
E. 100%
91. 女, 41 岁。继发性痛经进行性加重 1 年。妇科检查子宫增大, 如 2 个月妊娠大小, 质硬, 有压痛, 双侧附件正常。本例应诊断为
- A. 子宫肥大症
B. 子宫肌瘤
C. 子宫内膜癌
D. 子宫腺肌病
E. 妊娠子宫
92. 男, 2 个月, 体重 6kg, 需用牛奶喂养, 按计算每日需含 8% 糖的全牛奶和水分别为
- A. 700ml, 400ml
B. 600ml, 500ml
C. 400ml, 150ml
D. 500ml, 250ml
E. 600ml, 300ml
93. 男, 5 天, 昨起拒食, 反应差, 今日皮肤明显黄染而入院。体检, 颈周、前胸多个小脓疱, 分泌物涂片找到 G^+ 球菌, 心肺无异常, 肝右肋下 2.5cm, 脾肋下 1cm, 最可能的诊断是
- A. 新生儿肺炎
B. 新生儿败血症
C. 新生儿颅内出血
D. 新生儿胆红素脑病
E. 新生儿寒冷损伤综合征
94. 女, 2 岁, 发热 4 天, 体温达 $40^{\circ}C$, 伴流涕、鼻塞、咳嗽, 眼结合膜充血, 眼泪较多, 今发现耳后、颈枕部出现散在红色丘疹, 疹间皮肤正常, 最可能的诊断为
- A. 幼儿急疹
B. 水痘
C. 猩红热
D. 麻疹
E. 风疹
95. 男, 5 岁。反复咳嗽 3 个月, 常于夜间咳醒, 活动后加重, 痰不多, 无发热, 使用抗生素无效。既往有湿疹史。查

体：双肺呼吸音粗，无哮鸣音。最可能的诊断为

- A. 喘息性支气管炎
- B. 咳嗽变异性哮喘
- C. 胃食管反流病
- D. 支气管异物
- E. 支气管炎

96. 女，63岁。阴道不规则流血1个月。乳腺癌术后5年，一直应用他莫昔芬治疗。绝经后10年。妇科查体：宫颈光滑，子宫体正常大，附件（-）。首选的辅助检查是

- A. B型超声检查
- B. 肿瘤标志物检查
- C. 性激素测定
- D. 阴道分泌物检查
- E. 宫颈细胞学检查

97. 女，8岁。发热2周入院。查体：T 38℃，P100次/分，咽充血，心肺无异常，双足背见二处环形红斑。血红蛋白100g/L，WBC $13.6 \times 10^9/L$ ，N 0.82，L 0.17，ESR 50mm/h，CRP增高，ASO阳性，PPD（+），心电图正常。最可能的诊断为

- A. 过敏性紫癜
- B. 风湿热
- C. 川崎病
- D. 结核感染
- E. 链球菌感染

98. 女，26岁。产后42天复查，要求进行避孕指导，现处于哺乳期。查体子宫恢

复正常，已排除慢性全身性疾病。不适于该妇女的避孕方式是

- A. 阴道套
- B. 宫内节育器
- C. 复方口服避孕药
- D. 长效孕激素避孕针
- E. 阴茎套

99. 初孕妇，25岁。妊娠37周，外阴瘙痒伴阴道分泌物明显增多10天。妇科检查：宫颈阴道部有多个鸡冠状指样突起。本例应首先考虑的疾病是

- A. 淋病
- B. 尖锐湿疣
- C. 宫颈乳头瘤
- D. 宫颈癌
- E. 梅毒

100. 男，6岁。因咳喘加重，呼吸困难，大汗淋漓，烦躁不安8小时就诊。既往反复咳喘、气促、坚持药物治疗，缓解3年。根据患儿病情，除氧疗外，宜尽早选用的处理是

- A. 全身用糖皮质激素
- B. 机械通气
- C. 抗生素
- D. 镇静剂
- E. 补液纠酸

101. 女，14岁。患猩红热后出现水肿，少尿、血尿、高血压，经治疗好转，可以恢复上学的指标是

- A. 血尿消失
- B. 血沉正常

- C. Addis 计数正常
- D. 水肿消退
- E. 血压正常

102. 初产妇, 25 岁。妊娠足月。1 年前有流产史。胎儿顺利娩出 4 分钟后, 出现阴道暗红色间歇流血, 约 100ml。首先应考虑的原因是
- A. 子宫收缩乏力
 - B. 凝血功能障碍
 - C. 胎盘植入
 - D. 胎盘部分剥离
 - E. 宫颈裂伤
103. 患儿, 右侧阴囊包块, 质软, 卧位后包块缩小或消失, 透光试验阳性。最

可能的诊断是

- A. 睾丸鞘膜积液
- B. 精索鞘膜积液
- C. 右侧隐睾
- D. 右侧腹股沟疝
- E. 右侧交通性鞘膜积液

104. 女, 38 岁。常从事编织工作, 右中指疼痛, 屈伸活动受限。右中指掌指关节处可触及硬结, 屈伸时有弹响, 最可能的诊断是
- A. 骨软骨瘤
 - B. 化脓性关节炎
 - C. 狭窄性腱鞘炎
 - D. 慢性骨髓炎
 - E. 骨巨细胞瘤

B1 型题 (105 ~ 118 题)

答题说明

以下提供若干组考题, 每组考题共用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(105 ~ 106 题共用备选答案)

- A. 双嘧达莫
- B. 静脉注射丙种球蛋白
- C. 卡托普利
- D. 洋地黄制剂
- E. 糖皮质激素

105. 川崎病症状严重时宜早期用

106. 风湿热有心肌炎时宜早期用

(107 ~ 108 题共用备选答案)

- A. 左侧卧位
- B. 膝胸位
- C. 截石位
- D. 蹲位
- E. 弯腰前俯位

107. 直肠指检和结肠镜检查常用的体位是

108. 可看到内痔和脱肛状况的最佳体位是

(109 ~ 110 题共用备选答案)

- A. 外阴白癬风