

卷
三十九

外科

赤水玄珠全集

冊十三

赤水玄珠第二十九卷目錄

外科小引

五發癰疽論

背疽其源有五

疔瘡

雜瘡

癰

瘡科總論

華佗癰疽瘡腫論

五發癰疽通治方

反花瘡

婦人陰瘡

臙瘡

卷之二十一 目錄

魏人書

又書

正發靈

華

齊

魏

魏

魏

曹

正

長

宋

赤水玄珠第三十卷目錄

便毒

楊梅瘡

杖瘡

吠咬

風犬咬

蛇傷

瘰癧門

附馬刀

下疳瘡

金瘡

箭傷

砲傷

凍瘡

馬咬

貓咬

猪咬

人咬

癰瘤

結核

腸癰門

胃脘癰

痔瘡門

湯火門

顛撲損傷門

癘風

赤水玄珠第二十九卷

外科門小引

新安生生子孫一奎著輯

生生子曰外科最重者莫如癰疽最急者莫如喉風疽瘡癰者皆由氣血不和喜怒
癰皆可緩圖非若上三證急若風火也究其受病內以致陰陽乖錯氣血凝滯而
乃生癰腫又曰膏梁之^婦足生大疔又曰六府不也夫癰疽之疾多生於膏梁富
皆屬心火大抵皆氣血虛弱蘊鬱熱毒^調養失宜節以致虛邪熱毒內攻煎熬氣
常咨訪推究頗知治法大體茲採前人所論癰疽者沮也平而內發屬乎陰其脉
陶節庵癰疽經薛立齋外科精要二書實外科權輿業是者不可不使之隨囊檢
視能熟此二書鮮有敗事予固特舉歷試有功者揭出以告同志云

瘡科總論

夫癰疽瘡癰者皆由氣血不和喜怒不時飲食不節寒暑不調使五臟六腑之氣悒
鬱于內以致陰陽乖錯氣血凝滯而發也亦有久服丹石燥熱之藥熱毒結深而爲
癰疽也夫癰疽之疾多生於膏梁富貴之人以其平昔所食肥膩炙燂安坐不勞嗜
慾無節以致虛邪熱毒內攻煎熬氣血而成也癰者壅也大而起屬乎陽其脉浮
數疽者沮也平而內發屬乎陰其脉沉數瘡者總名也瘡者有頭小瘡也經云諸痛
痒瘡皆屬心火蓋心主血而行氣若氣血凝滯挾心火之熱而生癰疽之類也然所
感有淺深故所發有輕重大小之不同也六府積熱騰出於外肌肉之間其發暴甚
皮腫光軟侵表廣大者癰也五臟風毒積熱攻注於肌骨其發猛惡初生一頭如瘡

癰白色焦枯觸之而痛應心者疽也熱發於皮膚之間浮腫根小不過二三寸者癰也夫癰發於六府若燎原之火外潰肌肉疽生於五臟沉澁難療若陶室之燧內消骨髓癰則易療惟難將息而遲瘥疽則難療而易痊夫諸瘡之中惟背疽疔瘡最爲急症其次莫如腦疽腸癰喉癰之類亦其急者也至若瘰癧懸癰痔漏諸瘡之類其證可緩而治也又有疥癬癰瘡風疔之類雖云俱屬瘡類而其輕重緩急自有不同也夫癰疽之疾要須察其是虛是實是冷是熱或重或輕對證用藥無失先後次序凡人年四十以上等項鬢頤背脊腰脇或筋骨之上所視不見之處稍有瘡癰便不可輕易待之若視之怠慢以爲常疾每見至微至著喪命者多矣便宜速急治之庶幾得救譬之救火初起則易救至于燎原之勢不可撲滅矣其理亦由是也凡瘡未破毒攻臟府一毫熱藥斷不可用此是先後次第之妙訣也夫瘡有五善七惡不可不辨若動息自寧飲食知味一善也便利調勻二善也膿潰腫消色鮮不臭三善也神彩精明語聲清亮四善也體氣和平五善也如煩燥時嗽腹痛渴甚泄利無度小便如淋一惡也膿血大泄焮痛尤甚臭惡難近二惡也喘粗短氣恍惚嗜臥三惡也未潰先黑久陷面青唇黯便污者四惡也肩項不便四肢沉重五惡也不能下食服藥而嘔食不知味六惡也聲嘶色脫唇青黑面目四肢浮腫七惡也更有氣噫痞塞欬逆身冷自汗無時日瞪目聾恍惚驚悸語言頻錯皆惡證也五善見三則差七惡見四必危若五善并至則吉而安七惡全見必危而死矣已上所論大綱其諸證治法列論于後

五發癰疽論

夫五發癰疽者謂發背發腦發鬚發眉發頤是也人之一身血氣周流而無間稍有壅聚莫不隨所至而發焉又豈特五者哉夫發背者乃五臟風熱六府邪毒灌于筋骨之間發于經絡之內榮衛虛損氣血衰殘所致也其發初如粟米大最不可輕忽後必大發也若初起紅腫高起者後必不爲害故曰外形如粟中可容谷外貌如錢裏可着拳如惡毒深滿膿血交粘用藥可痊若膿臭穢無絲此血敗氣衰陽絕陰盛必難療理治初起或陰塌不起便可用艾多灸或隔蒜灸之如痛灸至痒如痒灸至痛此最妙法也若疽瘡已成亦可用火針烙開瘡口則易治也若瘡高起爲癰則易治平陷爲疽則難治癰疽形症已具前總論中茲不復論至如發腦發眉發鬚發頤發頤地位不同然皆由內臟伏陽結滯邪毒上壅隨其經絡地分而發也其諸發癰初起皆宜宣散熱毒要須看人元氣虛實而治之庶不悞矣若元氣實者亦可用大黃之劑泄去毒氣或用漏蘆五香連翹之類皆可用內托十宣之類補之亦有陰瘡寒塌不起雖云用灸然亦不可服寒涼之劑亦宜以煖藥溫之全在活法不可執一也其敷貼洗藥具方于下隨症用焉

外科精要曰癰疽既灸即服藥以護腑臟如護心散凡有疽疾早進數服使毒氣外出而無嘔吐之患否則咽喉口舌生瘡或黑爛如菌若瘡發四五日之後宜間用別藥治之

又曰護心散乃鮮金石發疽之藥若發熱焮腫作渴飲冷而嘔者宜之若發熱焮腫

作渴飲湯而嘔者不宜用之蓋脾虛停痰或寒邪內侵或痛傷脾胃宜用六君子湯若喉舌生瘡或口乾作渴或小便頻數宜用六味丸大凡諸瘡作嘔若飲冷便秘是熱毒也黃連消毒散解之飲冷便是胃火也竹葉石膏湯清之懶食飲湯是胃虛也補中益氣湯補之大便不實喜飲熱湯是脾胃虛寒也六君子加炮姜以溫之常見脾胃虛弱者用護心散反致胃寒嘔惡其喉舌生瘡乃腎水枯涸虛火炎上其證甚惡急用加減八味丸多有得生者

又曰癰疽嘔逆是毒氣沖心非脾胃之冷當服內托散楊氏云鼻衄初愈不曾表汗毒在經絡則背大疽自肩下連腰脇腫硬如石其色紫黑以涼藥投之終夜大嘔連進托裏散嘔止瘡潰赤水淋漓四十日而愈又有患癰者痛過輒嘔服托裏即止今有疽病不服此藥者故引楊氏之言以解世人之惑

華佗癰疽瘡腫論

夫癰疽瘡腫之作皆五臟六府蓄毒不流非獨因榮衛壅塞而發也其行也有處其止也有歸假令發於喉舌者心之毒發於皮毛者肺之毒發於肌肉者脾之毒發於骨髓者腎之毒發於下者陰中之毒發於上者陽中之毒發於外者六府之毒發於內者五臟之毒故內曰壞外曰潰上曰從下曰逆發於上者得之速發於下者得之緩感於六府則易治感於五臟則難瘳又近骨者多冷近膚者多熱近骨者久不愈則化成血蟲近膚者久不愈則傳氣成漏成蟲則多痒少痛或先痒後痛成漏則多痛少痒或不痛不痒內虛外實者多痛少痒血不止則多死潰膿則多生或嘔逆無

度飲食無時皆癰疽使然症候多端要當詳治薛立齋曰瘡瘍生虫乃肝經風熱其成漏乃元氣虛弱其出血乃脾虛有火其潰膿乃元氣充實至於嘔逆等證屬脾胃虧損所致當調補元氣庶保無虞

背疽其源有五

一天行二瘦弱氣滯三怒氣四腎氣虛五飲冷酒食炙燻服丹藥

治癰疽用藥大綱

- 一初患癰疽便服內托散以免後來口舌生瘡仍用騎竹馬或隔蒜灸
- 一服五香連翹湯如大便疎快即止仍量人虛實
- 一癰疽潰後宜服排膿內補散若嘔逆木香湯下
- 一癰疽初作便宜灼艾及麥飯石膏塗四圍中留口出毒如瘡小通傳之既潰用神異膏貼之

一癰疽已潰日用猪蹄湯淋洗將愈之際三日一次

一癰疽將斂宜用神異膏如毒未盡不可遽用生肌之劑

一癰疽將安宜用加味十全湯補其氣血庶肌肉易生

一背疽多先渴而後發或先疽而後渴不救者多矣若服加減八味丸非特杜絕渴疾抑亦大滋氣血生長肌肉

一癰疽嘔逆有二一因初發不服內托散伏熱在心一因脾氣不正伏熱在心者則心煩身熱焮腫作痛宜用內托散三兩服之脾氣不正者則不煩熱或聞穢氣作

嘔宜用嘉禾散如有寒熱用不換金正氣散五更初兼服山藥丸以補腎

癰疽用香藥調治論

伍氏曰氣血聞香則行聞臭則逆大抵瘡瘍多因營氣不從逆於肉理鬱結爲膿得香則氣血流行故服五香連翹湯萬金散金粉散凡瘡本腥穢又聞臭觸則愈甚若毒入胃則咳逆古人用之可謂有理且如飲食調令香美以益脾土養其真元可保無虞矣

五發癰疽通治方

漏蘆湯 治一切惡瘡毒腫丹瘤瘰癧疔腫魚臍五發癰疽初覺一二日便如傷寒頭疼煩渴拘急惡寒肢體疼痛四肢沉重恍惚悶亂坐臥不寧皮膚壯熱大便閉澀小便赤黃並皆服之 妊婦勿服 漏蘆 白欬 黃芩 麻黃去節枳實去白炒 升麻 芍藥 炙甘草 朴硝各一兩 大黃二兩 右每服三五錢看虛實用

水煎空心熱服

五香連翹湯

治諸瘡腫初覺一二日便厥喉咽塞發寒熱 乳香 木香 木通

大黃各一錢半連翹

沉香 獨活 桑寄生 丁香 射干 升麻 射香另

研各二錢甘草五分

姜三片水煎不拘時服

托裏護心散

治諸疔腫發背曾經汗下毒氣攻心迷悶嘔吐而痛可服二三服

乳香一兩

藁豈粉四兩

和勻每服三錢甘草湯調服

神仙蠟礬丸

此藥不問老幼皆可服之服至一兩已上無不取效最止疼痛不動

臟府委是神効活人不可勝數 白礬明亮者一兩研 黃蠟七錢燐化提起待少冷入礬

末不住手攪勻

右衆手丸如梧桐子大倘蠟冷不能丸以滾湯頓之便軟每服

二十丸漸加至三四十丸白湯或酒吞下 如未破即內消已破即便合如

服金石發動致疾更用白礬末一兩匙頭溫酒調下亦三五服見効有人遍

身生瘡狀如蛇頭服此亦効諸書皆稱神奇但一日之中服近百粒則方有

功此藥能防毒氣內攻蓋能護膜也切不可欺其淺近而忽之始終服過半

斤必能萬全瘡愈後服之尤佳

一方治蛇咬只熔化白礬乘熱滴傷處痛即止毒氣即趕出立見效驗要知白礬大

能解毒也

千金托裏散 治一切瘡腫發背疔毒若氣血虛而不能作膿或潰後膿清痛仍不

減最宜服此便能排膿止痛 黃耆一兩半厚朴 防風 桔梗各二兩連翹二兩二錢

木香 沒藥各三錢 乳香二錢 當歸五錢 川芎 白芷 芍藥 官桂 人參

甘草各一兩 右爲細末每服三錢酒一大盞煎三二沸溫服

十六味流氣飲 治無名惡瘡癰疽等證 川芎 當歸 芍藥 防風 人參

木香 黃芪 官桂 桔梗 白芷 檳榔 厚朴 烏藥 紫蘇 枳殼

甘草各一錢 右作一帖水煎食遠服

內托羌活湯 治尻臀生癰堅硬腫痛大作 羌活 黃栢酒製各二錢 防風 歸尾

藁本 連翹 蒼朮 陳皮 炙甘草各一錢 肉桂三分 黃芪一錢半 水一

鍾酒半鍾煎八分食前服

清心內固金粉散 一名金花散 專治惡瘡熱盛癰痛煩躁作渴此藥解毒

辰砂另研白茯苓 人參 甘草各三錢 葦荳粉四兩雄黃一錢冰片 白荳仁

朴硝各五錢 射香與冰片各一錢另研 右以參苓葦蔻爲末入研藥和勻每服一

錢半蜜湯調下

麥飯石膏方 又名鹿角膏 白麥飯石其石顏色黃白像麥飯團者研細末聽用 鹿角要生

者自解者不用截作二三寸長炭火內煨令煙盡爲度研爲細末白欵爲細末 右將麥飯石

用炭火煨紅以好米醋淬之如此煨淬十次研爲極細末每用二兩白欵末
二兩鹿角灰末四兩同入乳鉢乳令無聲方有效驗若研不細敷上作痛若
研得極細如眼藥一般極能止痛排膿收口量藥末多寡用經年好米醋入
銀石器內煎令魚眼沸却旋旋入前三味藥末在內用竹篦子不住手攪熬
一二時久令稀稠得所傾出磁盆候冷以紙蓋蜜勿惹塵灰每用時先用猪
蹄湯洗去癰瘡上膿血至淨以故帛挹乾以鵝翎拂藥膏塗數四圍凡有赤
處盡塗之但留中心一竅如錢大以出毒氣膿血如瘡未潰能令內消如已
潰則排膿如湍水逐日見瘡口收欵如患瘡久肌肉腐爛筋骨出露用舊布
片塗藥以貼瘡上但肉膜纔穿亦能取安洗瘡勿以手觸動嫩肉仍忌口氣
及有腋氣之人并月婦皆令忌之 此方但得好帶蓋鹿角好麥飯石精虔
修合勝用他藥多矣仍可熬取好米醋一大碗候逐日用藥於瘡上俟乾便

以鵝毛蘸醋拂潤勿令緊也初用須一日一洗換十日後兩日一換

排膿內補十宣散一名十奇散一名內補散 治癰疽瘡癤未成者速散已成速潰敗膿自

出無用手擠惡肉自去不用刀針服藥後其痛頓減效驗如神 人參 當歸

黃耆各二兩 甘草 川芎 防風 厚朴姜汁炒 苦梗 白芷 薄桂各一兩

右爲末每服三錢酒調下日夜各數服以多爲妙服至瘡口潰更服爲嘉不
飲酒人濃煎木香湯調下然終不若酒力之勝或飲酒不多能勉強以木香
湯兼酒調下亦可

乳香黃芪散 治一切惡瘡癰疽發背疔瘡痛疼不可忍者或未成者速散已成者

速潰不假刀砭其惡自下 又打撲傷損筋骨疼並皆治之 黃耆 當歸

川芎 麻黃去根節 甘草 人參 芍藥各一兩 嬰粟殼蜜炙 陳皮各一兩

乳香 沒藥各五錢 每服五六錢水煎服

黃耆湯 治一切瘡腫癰疽並宜服之 黃耆 川歸酒洗各二兩大黃 芍藥

陳皮 炙甘草各五錢 右加生姜二片水煎服

托裏內補散 專治一切惡瘡潰爛出膿之後宜服之 人參 川歸 川芎

白芍 甘草 白芷 防風 白朮 茯苓 官桂 黃耆 金銀花 各等

分水煎服

護心散 治毒氣沖心嘔吐又名不二散 炙甘草 硃砂飛各一錢菴荳粉炒二錢 爲

細末作一帖白湯調下

當歸連翹散 清熱解毒通潤大小便 當歸 連翹 梔子仁 芍藥 金銀花

各一兩 黃芩五錢 右每服五錢水二鍾煎七分空心溫服如欲通大便加大

黃二錢待藥煎將熟入之再煎一二沸服之

托裏散 治一切惡瘡發背疔疽便毒治發脉洪絃實數腫甚欲作膿者 當歸

括裏根一錢半 大黃三錢 皂角刺 牡蠣 朴硝 連翹各一錢半金銀花

赤芍藥 黃芩各一錢 水酒各一盅煎服

乳香止痛散 治一切瘡腫疼痛不止 乳香 沒藥各一錢 丁香五分 粟殼

白芷 陳皮 炙甘草 水煎服

加味當歸飲子 古云諸瘡皆屬心火火鬱則發之 當歸 生地 升麻各五錢

防風二錢半 荊芥穗 何首烏各一錢 柴胡 白芍藥 川芎 羌活 黃耆

各三錢 紅花 蘇木 甘草各一錢 每服五錢生姜三片煎或沐浴取微汗

效速使血氣通暢服藥應效

托裏溫中湯 治瘡爲寒變而內陷者膿出清解皮膚涼心下痞滿腸鳴切痛大便

微澹食則嘔氣短促吃逆不絕不得安臥時有昏潰 丁香 沉香 茴香

陳皮 益智仁各一錢 木香一錢半 羌活 良姜炮三錢 黑附子 炮去皮臍四錢

炙甘草二錢 姜三片水煎服 忌生冷

豬蹄湯 治一切癰疽并諸腫毒消毒氣去惡肉凡瘡有口便須用此湯洗 黃芩

白芷 赤芍藥 川歸 羌活 生甘草 露蜂房有蜂兒者各等分 先將獮

猪前蹄兩隻重一斤只用白水三升煮軟將汁分作二次澄去面上油并下肉渣每次用藥一兩投于汁中再用文武火煎十數沸去渣以故帛蘸湯溫溫徐揩瘡上死肉惡血隨湯而下洗淨訖以帛拭乾仍避風忌人口氣吹之有狐臭人及月婦猫犬並不宜入病人房中洗瘡切忌手觸洗疽之方甚多惟此方極效其用露蜂此甚有理蓋以毒攻毒也

麥門冬湯

癰疽潰後膿水不絕

麥門冬

黃蓍

五味子

人參

官桂

當歸

遠志

白苓

芎藭各一兩

灸甘草三錢

姜一片棗二枚水煎

四虎散

治發疽腫硬厚如牛皮按之痛

天南星

草烏頭

半夏生用

狼毒

各等分爲細末醋蜜調敷留頭出氣

內托散

諸腫毒惡瘡一服立愈便毒尤効

大黃

牡蠣各五錢

甘草三錢

括蕪仁

二兩如無用山梔子亦可

右分三帖水煎服

鐵井欄

治無名腫毒背疽以此圍之留口出氣

芙蓉葉重陽前收蒼耳端午前收燒

存性

爲末以蜜水調上

五香湯

諸瘡入腹托裏

丁香

木香

沉香

乳香各二兩

人參一兩另加

射香三錢嘔惡者去之加藿香

右爲細末每服三錢水一盞煎六分空心熱服總

錄聖惠千金外臺治諸瘡腫方中皆載此方大同小異大抵專治毒氣入腹

煩悶氣不通者其餘熱結昏昧口燥咽乾大便秘硬小便澀者未可與服

止痛當歸湯

治腦疽發背穿潰疼痛

當歸

黃蓍

人參

官桂

芍藥

炙甘草 生地各二兩 每服五錢水煎服

金銀花散 發背惡瘡托裏止痛排膿 金銀花無花藤葉代之四兩甘草八錢 分爲

三帖酒水各半煎服

拔毒散 治熱毒丹腫遊走不定 寒水石生用 石膏生用各四兩黃柏 甘草各二兩

爲細末新汲水調掃之或油調塗之或紙花上攤貼以凉水潤之

寸金丹 二名返魂丹 三名再生丸四名追命丹六名來甦丹七名知命丹八名

得道丸非人勿示若有人患癰身未爛者與三丸服之嚥下便活如口噤斡開研

化灌之下喉立生治發背腦疽癰腫遍身附骨腫痛先時飲水口中煩渴發熱

四肢沉重身體壯熱 射香一分 乳香 輕粉 烏金石 雄黃 狗寶 沒藥

各一錢 蟾酥二錢 粉霜 黃蠟各三錢 礪砂五錢 鯉魚胆乾用 狗胆各一枚

頭男胎乳一盞金頭蜈蚣七條酥炙全用 右俱爲細末以黃蠟熬成膏子和勻

爲丸菴荳大小兒丸如芥子大每服一丸病重者加三丸白丁香七枚研爛

新汲水調送下被蓋出汗勿令透風凡服藥後喫白粥瓜薑就睡大妙頭瘡

腫痛不過三服

定痛托裏散 一切瘡腫疼痛不可忍如年少氣實先用疎利後服此藥 川芎

川歸 乳香 白芍藥 沒藥與乳香各一錢半 官桂一錢御米穀去筋膜炒二錢

水煎服

柞木飲子發背癰疽已成未成並宜服之 乾柞木葉四兩 乾荷葉心蒂 萱草根