

許琴書屋葉案括要目錄

卷五

濕

燥

疫

癩痧疹癩

痰

痰飲

鬱

肝火

不寐

餽

三消

脾瘕

卷六

葉案括要

目錄



瘡

泄瀉

痢

便血

脫肛

痿

痺

痺火

本草綱目卷之...

評琴書屋葉案括要卷五

番馮潘名熊蘭坪纂

男

龍章雲臺  
鸞章翅霓

校刊

濕

肢冷自利。不語無神。朮苓樸瀉。木瓜果仁。

生於朮

三錢

厚樸

五分

川木瓜

五分

雲茯苓

三錢

澤瀉

五分

草果仁

七分

案云。濕邪內伏。足太陰之氣不運。經云。脾竅在舌邪。滯竅必少靈。以致語言欲寒。必須分利佐辛香以默。



運坤陽。是太陰裏症治法。

氣蒸於上。濕滯於中。失降不寐。三焦宜通。朮苡陳桔。寒水石同。豬苓澤瀉。相助成功。

生於朮 五錢

陳皮白 半一錢

豬苓 一錢

桔梗 七分

生苡仁 三錢

寒水石 半一錢

澤瀉 一錢

案云。開上鬱。佐中運利腸間。亦是宣通三焦也。

古白目黃。口渴溺赤。脈象鈍呆。濕鬱露迹。茵朮苓皮。桂枝不易。澤瀉豬苓。寒滑二石。

綿茵陳 三錢

生白朮 一錢

豬苓 三錢

寒水石 三錢

茯苓皮 錢三

桂枝木 錢一

澤瀉 錢一

川滑石 錢三

陽微體質。易聚濕痰。便溏脘悶。症更肌升降相系。宜清

邪令氣機升降 二陳去草。斛蒺鈎堪。

大金釵斛

白蒺藜

鈎藤

結雲茯苓

製半夏

陳皮

寒熱微嘔。身痛脈濡。胸身重濕鬱阻氣。杏樸通俱。白薏

苓腹。滑石竹需。

厚樸

川滑石

茯苓皮

木通

北杏

白薏仁

大腹皮

竹葉

先生論濕阻氣分亦有寒熱。倘悞認外感寒熱表而汗之。不誠犯仲景師濕家大忌發汗。汗之則變痙厥戒乎。甚矣醫之難也。苟非專其功以博覽羣書。精其識於小心臨症。安能無過耶。

發熱身疼。濕鬱阻氣。汗仍熱來。患濕所致。濕家有汗不解 芩薏滑通。二苓腹備。

淡黃芩

滑石

苓皮

大腹皮

白薏仁

通草

豬苓

案云。脈緩身痛。汗出熱解復熱。此水穀之氣與濕併

阻於氣分鬱而成熱。治宜利濕宣通氣分。濕去熱自解矣。徒進清熱不應。

地中濕氣腫自足先

濕屬陰邪陽不易復故畏寒筋骨強無力

苓薑朮桂

湯名

金匱湯煎

茯苓

乾薑

白朮

桂枝

案中本案上一段治莫症亦因濕阻中陽見症吞酸形寒亦用金匱此湯案云時令潮冷氣蒸內應脾胃夫濕屬陰晦必傷陽氣致陽不運行議鼓運轉旋脾胃一法立治

清陽不旋。濕濁所侵。胸脘痞悶。荅桂朮甘。

湯名

茯苓

桂枝

白朮

炙甘草

案云。中年清陽日薄。致濕易傷脾胃。胃陽微。仲景法以輕劑宣通其陽。若投破氣開降。最傷陽氣。有格拒之害。

暑濕氣蒸。

三焦瀰漫

諸竅不靈。二便艱澀。神識不清。小腹硬

滿。甘露法應。

案云用甘露飲法

水石皂莢。蚕沙二荅。

豬苓

寒水石

皂莢子

去皮

茯苓

晚蚕沙

案云仲景云小便不利者爲無血也。小便利者血症  
諦也。此症暑濕氣蒸。三焦瀰漫。以致神昏。乃諸竅阻  
塞之兆。至小腹硬滿。大便不下。全是濕鬱氣結。

風暑濕邪。渾雜阻氣。咳嗽不飢。右肢痿痺。杏苡蒺藜。桂  
枝佐使。防己生薑。夏樸同治。

杏仁

錢三

生苡仁

錢三

防己

半

錢

桂枝

分五

厚樸

錢一

白蒺藜

錢二

半夏

半

錢

生薑

分七

案云風暑濕渾雜。氣不主宣。咳嗽頭脹。不飢。右肢若  
廢。法當通陽驅邪。

汗多身痛。自利溲無。小便全無。苡苓蔻滑竹葉通符。

生苡仁 白蔻仁 鮮竹葉

雲茯苓 川滑石 川通草

案云風濕傷於氣分濕鬱在脈為痛。濕家本有汗不

解

燥 附倣先生法

治驗案一段

脈石數大氣分燥侵。梔豉浙貝桑杏沙參

桑葉 白沙參 梔子皮

杏仁 浙貝母 淡豆豉

夏熱秋燥致傷胃陰。扁豆玉竹。麥冬沙參地骨桑葉。花

粉生甘。

生扁豆 玉竹 地骨 冬桑葉

白沙參 麥冬 花粉 生甘草

上燥治氣肺主。下燥治血肝藏。今屬津傷。肺胃治決氣。

失下行燥傷胃津致。大便應結。清補甘寒養陰法。切參

梨地冬生蜜冲啜。

大生地八錢 天冬肉三錢 人參一錢

甜梨肉

兩

生白蜜

一杯

余生平津液虧。故納食少。納食少。斯津液愈虧。致胃

氣不主下行。腸中傳送失司。徃徃數日始一如廁。因

此食必難於用飽。稍飽則胸腹不舒。延醫調治。謂食

停胸膈也。枳樸查麩益劫其津。謂熱結大腸也。芩栢

硝黃愈虛其液。服此等藥。大便雖一時通快。下次欲

便倍苦其難。津液重傷故也。

津液上承而胃氣乃降亦下潤而大便始通

余時尚業儒而未通醫理。偶翻先生案見此方平淡

無竒妄加分錢自服。

時參用北麗參三錢

一二劑必便通而食

進。諸恙俱安。下次大便更無所苦。津液得滋故也。此  
後凡便結三四日未通服此方輒效。夫乃歎醫不必  
業而醫理不可不於文字之暇講求。無俾不讀書之  
醫貽害也。

心煩熱渴。正值經期。

經水適來。

復脈法合。

此下燥症案云清用復脈湯法。

肺則非。

上燥治肺下燥治肝。

地冬膠草。棗蔗漿宜。

炙甘草

清阿膠

熟棗仁

大生地

大麥冬

甘蔗漿

津液重傷。渴飲潮熱。用復脈湯。麻仁不列。

人參 生地 麥冬 阿膠

炙草 桂枝 生薑 大棗

案云陽津陰液重傷。餘熱淹留不解。臨晚潮熱。舌色若赭。頻飲救亢陽。焚燎究未能解渴。形脈俱虛。難投白虎。議以仲景復脈一法。為邪少虛多。使厥陰少陰二臟之陰。少甦冀得胃關復振。因左關尺空數不減。非久延所宜耳。

# 疫

其病發三四日未發脈洪大雖發夫八效曾不... 清恙則定不為大則更難... 苦... 效... 治也...

時疫上受分布三焦犀角生地菖蒲連翹銀花金汁玄  
參鬱療。

犀角

生地

銀花

連翹

菖蒲

鬱金

玄參

金汁

案云疫癘穢邪從口鼻吸受分布三焦瀰漫神識不  
是風寒客邪亦非停滯裏症故發散消導即犯劫津  
之戒與傷寒六經大不相同今喉痛丹疹舌如硃神  
躁暮昏上受穢邪逆走膈中當清血絡以防閉結然  
必大用解毒以驅其穢先生別案又云必兼佐芳香  
宣竅逐穢即犀角銀花菖蒲

薛金至 必九日外不致昏憤。冀其邪去正復。

吸受疫癘。三焦分馳。久漸血瘀。散結合施。恐愈結花露

金汁 元參 翠衣

西瓜翠衣 銀花露 元參 白金汁

案云當以鹹苦之製仍是輕揚理上。倣古大製小用之意。

# 癩痧疹癩

伏熱發癩。夜躁無寐。兩脈數搏煩犀角 羚羊 葛蒲 生地

銀花連翹元參粉備

摩犀角

細生地

元參心

南花粉

羚羊角

金銀花

連翹心

石菖蒲

癩疹隱約症屬濕溫已入血絡

早輕夜重

舌赤譫昏

邪于膈中漸至

閉

元參犀角菖蒲翹銀牛黃金汁調服為君

犀角

石菖蒲

元參

連翹

銀花

先煎至六分後和入雪白金汁一杯臨服

研入周少川牛黃丸一九

風溫疹發薄荷桑皮連翹牛子甘桔杏梔