

幼幼集成卷之五

羅浮陳復正飛霞

刪潤

黃州萬密齋痘麻

盧陵劉勸案孟

校正

遂陽周宗頤虛中

參定

○天元賦

痘本胎毒俗曰天瘡傳染由於外感輕重過於內訌初起太陽王水尅乎丙火次歸陽明血水化爲膿漿所喜者鮮潤可畏者黑陷焦黃勢若燃眉變如反掌皮膚臭爛血氣虛耗若救焚兮徙薪何如焦額似拯溺兮落井不及寢裳原乎一元肇化三氣成祥慾火動而妄作胎毒熾而流殃啼聲驟發機毒深藏命門養火胞戶收鋟待四時之疫癘動五臟之皮囊榮氣逆於腠理惡血發於膀胱二火相煽四大成瘡毒之輕者發則微貴乎幼幼集成

卷之五

天元賦

調養毒之重者發則密急於隄防至於運氣推遷有關勝復升降時令乖異無非寒熱溫涼苟陰陽之逆理爲氣候之反常五行鬱而灾見九曜空而變彰厲氣流行無論郡邑鄉黨惡毒傳染豈分黎庶侯王此則不形於診貴在能制其亢先事解散兮十全八九臨時區處兮止曰尋常

大抵氣運先歲痘疹屬陽春夏爲順兮樂其生長秋冬爲逆兮惡其收藏暴寒兮恐邪毒之鬱遏暴熱兮慮腠理之開張膿疮在春而莫療黑陷在夏以爲殃秋斑實惡冬疹非祥此逆四時之令休謗三世之方且如證候殊形臟腑異狀肝主淚而水泡肺主涕而膿癧心斑紅艷脾疹赤黃惟腎經之無證惟變黑而可妨所以觀乎外候因而辨其內臟呵欠頓悶兮肝木之因咳嗽噴嚏兮肺金之相手足令而昏睡兮脾土困於中央面目赤而

驚悸兮。心火炎於膈上。耳聾屬腎。溫暖如常。二處爍熱兮。下極火炎而必斃。四肢厥冷兮。中州土敗而傾亡。

先分部位。次察灾祥。陽明布於面中。太陽行於頭上。心肺居胸膈之要。肝膽主脇腋之旁。手足司於脾胃。腰背統於膀胱。泄瀉者邪甚於下。嘔吐者邪甚於上。氣逆而腹痛隱隱。毒深而腰痛皇皇。心熱甚而搗掘胃邪。實疎顯狂。鼻燥咽乾。肺受火邪而液竭。尿頻溺澁。腎由火旺而精亡。氣弱減食者。不任其毒。神強能食者。不失其常。

欲決重輕。但觀發熱如占順逆。須認其瘡毒甚兮。身如炎火。熱微兮。體或清涼。若寒熱之來往。定徵兆之佳祥。數番施出兮。春回陽谷。一齊湧出兮。火烈昆岡。蚊跡蚤斑。刻期而爲鬼籙。蛇皮蠶殼。引日而返泉鄉。不喜硃紅。更嫌灰白。最宜蒼蠅。切忌紫黃。常

幼幼集成

卷之五

天元賦

要明潤兮。恐薄嫩之易破。不宜乾枯兮。防搔癢之難當。惡候如此。上工審詳。面頰稀而磊落。清安可保。胸膈密而連串。凶吉難量。頂要尖圓。不宜平陷。漿宜飽滿。切忌虛空。顏色喜老而惡嫩。皮膚愛糙而怕光。起根窠終防癩壞。丹浮皮肉必主天殤。頭面預腫兮。三陽亢甚。手足厥冷兮。五臟摧傷。瘡堆喉舌。毒纏頸項。咽喉痛而呼吸則難。飲食少而吞吐則嗆。此天命之安排。豈人力之可仗。

煩燥悶亂兮。七神離散。譖語眩冒兮。五毒猖狂。鼓項戰慄兮。肺敗咬牙。口噤兮。腎傷渴不住兮。焦膈漏不止兮。滑腸失聲兮。咽爛吼氣兮。腹脹晝夜搔爬兮。將榮衛之外脫乳。食斷絕兮。必冒氣之受戕。腫忽消毒歸於裏。色反黑疔起於瘡。食穀則喰兮。在嬰兒之命促。飲水則噴兮。較醫工之短長。

輕重反復。調理乖張。輕變重而可畏。重變輕而莫慌。風寒素慎。飲食如常。出入禁乎。男女蓋覆適其溫涼。內無妄動。治不乖方。此則變輕之候。實爲保命之良。若當犯乎禁忌。或誤投乎丸湯。徒肆房室。不順陰陽。外感不正之氣。內傷不時之糧。平人且病。患者敢當。是以順則逆而逆則險。宜乎輕變重而重則亡。

發自肺經。相連脾臟。氣熱味辛。燥金受剋。形寒飲冷。華蓋先傷。渴飲則水來侮土。而成泄痢。遇食則脾不運化。而作痞。脹皮毛虧損。肌肉虛庭。起發遲而不胖壯。收鑿緩而作膿瘍。輕則延綿乎時日。重則泣迷於郊刦。柰愚夫之不曉。致生命之夭亡。不信醫而禱諸神鬼。枉殺牲而號乎窮蒼。

藥貴中病。醫不執方。喜行溫補者。動稱平文。中專用涼瀉者。祖述乎仲陽。貴其因人而治。相時而行。王氣爲先。戒開門延寇。解毒幼幼集成。

卷之五

五元賦

三

爲急休視虎如狼。首尾不可汗下。法休固執。緩急各有權。宜治別經。常擒其繩墨者。如守株之待兔。惑於方書者。似多歧以亡羊。

且如紅撤紫腫兮。涼血爲上。灰白平陷兮。補氣最良。出不快兮。責表實而發散可用。便或秘兮。責裏實而疏利何妨。毒不能速解。毒甚者令微汗之。散越熱不可盡除。熱劇者使小便之清長。二陰多寒兮。必投辛熱。三陽多熱兮。無過苦涼。安可惡寒而喜熱。莫如貴陰而賤陽。

是故補氣者參耆白朮。養血者歸芍地黃。發散表邪。輕葛根而重官桂。疎通裏實。微枳殼而甚大黃。解毒兮芩連桔子。快班兮荆防牛蒡。通翹藥內之要領。甘草方中之君。相咽痛。求諸甘桔頭腫。取乎羌防。木通利其小水。人屎攻其黑瘡。氣逆兮青皮陳皮。

胃寒兮丁香木香泄瀉無如芩朮。吐莫若生薑。麥冬乾葛而止渴。厚機腹皮而消脹。望月砂退翳。有準。穿山甲折毒無雙。枳實麥芽山楂子消宿食而勸化。大黃乾葛地骨皮解餘熱以清涼。咳嗽以枳桔。又用杏仁。痢疾以黃連再同木香。苦參主乎熱毒。溺白治其瘡瘍。用之合宜。工可稱良。

其諸藥物各有主張。春夏桂枝宜少服。秋冬芩連切莫嘗。瘡若乾枯白朮非其所貴。色如紅艷。萸耆胡麻入方。裹虛少食者勿投枳實。表虛多毒者休使生薑。汗自出兮。用乾葛重虛其表。瀉本數兮。加木通更損其陽。泄瀉酸臭兮。柯蔻不宜輕用。嘔吐清冷兮。連梔切勿入湯。凡用芩連必須炒製。如加丁桂須假寒涼應制。伏而不誅。無過保和平而福壽無疆。

大勢若平。餘邪頻講。熱毒流肝兮。雙睛生翳。火邪入脾兮。四肢成幼幼集成

卷之五

八九賦

四

瘍口內生瘻兮。爛齦破舌。腸中作痛兮。腐胃敗腸。皮膚嫩而洗浴太早。因以添熱。臟腑虛而甘肥太過。遂致內傷。若中風寒凝瘀。作嗽如逢擇。招灌蝕歸瘡。

嗟夫。擢此證候其苦非常。外纏皮肉。內連腑臟。改換形容。如蛇蛻皮龍蛻骨。淋漓膿血。若蛆在灰蠭在湯。軒岐置而未言。秦漢闕而無方。古無此證。或云起於建武。今有是疾。相傳得自南陽。拘於日數者不知輕重之責。執其偏見。奢枉增虛實之防。本溫再熱已寒。又涼徒自膠而必固。反致惡而見殃。洩骨髓之真詮。非人不授。宣肺腑之秘奧。牢記莫忘。

○痘疹西江月

凡四十九首

痘疹毒從何起。母胎火毒流傳。生來穢物下喉咽。藏在命門裏面。一旦天行時氣感。令相火熬煎。毒從骨髓見皮間。彼此一般傳。

染

五臟各有形證。認時須要分明。往來寒熱。睡脾經。阿欠。頓悶。肝證。
咳嗽噴嚏。受肺面紅驚悸。屬心。惟貴清靜。忌邪侵。手足耳尻。宜
冷。

五臟各有一證。其間治法難同。肝爲水泡。肺爲膿。大小瘡形異種。
脾證發爲疹子。心經現作斑紅。腎爲黑陷。病多凶。縱有靈丹何
用。

痘疹要知順逆。天時人事相隨。大端陽火是根基。若遇陰寒不喜。
春夏發而多吉。秋冬逆以何疑。如逢稠密必凶。危稀少方爲平
易。

治法而今不定。清涼溫補分明。各持一見論紛紜。自曰予爲神聖。
解毒喜行涼瀉。補中愛使辛溫。不明時令與元神。枉自捕風捉
影。

幼幼集成

卷之五

痘疹西江月

五

假令天時暄熱。辛溫助爲炎殃。寒凝涼解雪加霜。病者如何抵擋。
壯實再行溫補。虛旭又使寒涼。虛實貳伐元陽。無異隔靴搔
癢。

看取時行疫癘。天時熱氣炎炎。精神肥健。食能兼解。毒清涼甚便。
若是風寒太甚。虛羸吐瀉連綿。此宜溫補法爲先。又在醫人活
變。

痘疹要知輕重。吉凶順逆精通。毒輕瘡少。順家風。湯藥不宜妄用。
瘡密毒重爲逆。皮膚寸寸成膿。此般形證。例多凶。仔細扶持休
縱。

輕者三四次出。頭面胸背稀疎。小便清利。大便稠。飲食如常。充足。
重者遍身齊出。狀如麻子。麥粒。咽喉疼。泄瀉悶慄。飲食不思。可

惡。

多有先輕後重。只因觸冒風寒。房屋不避穢腥。干飲食偏於冷暖。間雜人帶穢厭。諸般禽獸盤桓。庸工術淺誤湯丸。反使痘瘡變換。

重者變輕何以。常常和暖衣衾。房中謹密少人行。飲食隨時添進。未見誤投湯藥。不曾妄啖酸腥。此爲人事奪天靈。安可歸於有命。

要識痘瘡死證。無過五證分明。紫黑喘渴悶。尚寧瘡塌咬牙寒噤。灰白頂陷腹脹。皮嫩易破成坑。泄瀉氣促見鬼。神聲啞頭面足冷。

旣識五般死證。其間吉病如何。瘡頭飽滿作膿窠。任是推磨不破。四畔根盤紅活。安眠靜臥平和。壯收醫不蹉跎。管教喜占勿幼勿集成。

卷之五

痘疹西江月

六

藥。

黑陷乾枯腎敗。咬牙寒戰肝傷。失聲喘氣肺摧。創泄瀉脾虛腹脹。癰塌悶亂心死。狂言見鬼神亡。皮嫩易破氣無陽。便血陰崩模樣。

首尾不可汗下。汗時腠理開張。風寒易入透斑。瘡收醫不齊火旺。悞下必犯脾胃。無事自取內傷。泄瀉黑陷致傾。枉使魂靈飄蕩。

大抵痘瘡未出。先須升葛參蘇。如斯不出汗忙疏。紅點見時藥住。大便若還秘結。輕輕四順相符。假饒自利伐無辜。定與閻羅掌簿。

調痘無過二法。補中解毒兼行。補中參朮草耆芩枳實山楂有應。解毒芩連梔檗連翹枳實防荆芎歸養血妙如神。加減須詳前。

定

血氣要分虛實。但於瘡色推求。紫腫紅掀血實。由四物內加解毒。灰白中陷氣弱。四君子是良謨畧。加解毒藥相符。補氣實脾無誤。

但是痘瘡初出。如逢熱盛昏沈。解毒發散藥先行。莫待臨渴掘井。桔梗升麻乾葛連翹甘草黃芩牛蒡梔子木通荆蟬蛻防風作引。

若是如常潮熱。只消乾葛升麻芩連甘草赤芍加牛蒡連翹無價。或用參蘇飲子。青皮木香內加煎來一服勝靈砂。痘現表疏纔罷。

初熱多生搐搦。急將導赤疎通木通。甘草與防風。生地黃連同用。再著辰砂調服。須臾救護朦朧。此方端的有神功。管取行之必

幼幼集成

卷之五 痘 參西江月

中

壯熱不會出現。大便秘結難通。顛狂脣裂眼珠紅。此證凶危堪慟。急與芩連梔蘖。大黃酒炒疎中連翹牛蒡與木通。貫眾射干俱用。

自此出而稠密。認他虛實調醫。虛家泄瀉色如灰。大補十全堪取。若是腫掀紅綻。芩連梔蘖芎歸翹菊升葛桔甘奇。此箇真機妙秘。

灰白不能起發。又加泄瀉頻煩。溫中炒藥不宜停。急扶危濟困。

當歸黃芩芍藥甘草乾薑人參木香梔子及青陳官桂丁香靈應。

若是這堆頸項。此名鎖膈悽惶。一朝破爛命將亡。變作暗啞水。

瘡

起發狀如蠶殼乾枯不見水漿。此名血竭毒歸藏。不治必然命喪。
當歸地黃養血。參耆甘草溫良連翹牛蒡與木香桔梗青皮發
旺。

起發常將撲。視切防黑陷來攻。若然黑陷現其中。藥點許多妙用。
豌豆七粒燒過亂髮火煅和同珍珠水浸胭脂紅針破擦之自
腫。

藥點反加黑陷。喪門弔客匆匆百祥。牛李與宣風。總是脫空賣弄。
不如人貓雞犬。四般屎眼和同木香湯引妙無窮。妙法半文不用。

起發初生搔癢。比於癢搨爭差。傷寒身癢表留邪痘亦同茲休訝。
治用疎風涼血。荆防翹芍芎麻地黃歸葛效堪誇。竹葉木通無
幼幼集成。

卷之五

痘疹西江月

價。

大抵痘宜脹痛。最嫌虛癢相干。只因飲食溼邪攢心火尅而悶。能
外宜茵陳艾炬。內宜參朮湯丸。若還癢止證方安。抓破面皮斷

何爲正面怕癢。面含五臟精華。假如破損實堪嗟。氣散魄飛魂罷。
尤忌先傷正額。心經火帶虛邪。幾番試驗不爭差。寄語明人體
察。

人相火居正額。出現胖壯休先果。然額上痘蟬聯。大抵凶而不遠。
喜是兩頤口鼻始終都在其間。教稠密勢纏綿到底終無傾
險。

起發成漿欲齧忽然泄瀉來攻。此時脾胃不宜空。變出百端可慟。
多是內傷飲食。只求藥有神功。若還消腫泄淋濃。難免北邙相

送

先用人參白朮黃耆炙草燒薑茯苓山藥其木香大劑煎來溫養
不效次求荳蔻本香芡實良方三番只有異功良此實盡頭酌
量

記取成漿欲醫最防厭穢腥羶大黃芩尤共燒烟可解一切穢
內服調元飲子黃耆炙草人參當歸蒼朮酒芩連犯著荆防卽
變

到得成漿痘熟依時都要成痂若還腐爛臭腥加此是表虛塊訶
急進參耆歸朮荆防蒼葛升麻連翹牛蒡密蒙花休得弄真成
假

若是痘瘡熟爛皮破膿血淋漓內服歸朮與參芪牛蒡連翹官桂
外用多年敗草晒乾研細成灰鋪開牀席任施爲最解火邪毒

幼幼集成

卷之五

痘疹西江月

九

氣

痘熟不能收斂反行破爛成瘡一時焦痛甚難當請問如何發放
但取甘草滑石辰州豆粉清涼密調塗上便安康此法不留書
上

有等痘瘡純正緣何日久難收請君仔細問根由不可臨時差謬
授

果是會傷冷水溼傷脾胃皆虛脾應肌肉主中區無怪血膿流注
可用參耆蒼白青陳甘桔無拘丁香官桂有方書救裏收表妙
處

如是大便秘結三朝一七未通此爲熱氣內蒸烘因此毒難開縱
內服歸黃麻子大黃畧入相攻再行膽導妙無窮管取成痂去

收後許多餘證。醫家須要分明。毒留肝臟自生疔。翳障瞳人隱。隱
毒入肺脾癰腫。實歸手足陽明。內傷外感要調停。免致多生怪

病。
兩目忽然腫痛。痘家毒入肝經。輕爲浮翳掩瞳睛。重則終身廢病。
去翳菊花蟬蛻。蒙花蒺藜殼。各爲細末。共和勻。湯煮猪肝作
引。

癰毒發於肢節。常常膿血不乾。不知調理。早求安廢疾。終身爲患。
內服千金托裏。外塗太乙金丹。排膿長肉。未爲難。任是千金不
換。

痘後不宜澡浴。痘疤皮嫩易傷。不知禁忌。受寒涼。遍體熱生痛癢。
此因傷寒勞復。不宜官桂麻黃。只須九味羌活湯。次以補中調
幼。幼集成

卷之五

痘疹西江月

十

養。

痘後或傷飲食。致令腹痛非輕。不宜轉下。損脾經。消導方爲對證。
白朮人參枳實黃芩瞿麥青陳山楂白芍與砂仁。積化痛疼俱
定。

痘爛不齊收醫。正面灌痛流膿。急防兩目毒來。解毒清涼好用。
酒炒芩連梔。連翹蟬蛻木通。升麻牛蒡苦參同細研爲丸。酒
送。

大凡痘瘡一證。名爲百歲聖瘡。如龍蛻骨換心腸。又似蟬蛻殼樣。
出現光壯收醫。落痂顏色相當。飲食寒暑順陰陽。自此精神長
旺。

○痘有順陰逆并五善七惡之證。

順證○氣血冲和。痘毒宣暢。素健。食飲如常。不必施治。

險證○氣血不舒痘毒壅遏或雜證攬擾開落失期速宜施治逆證○痘毒疑結氣血乾枯怪證叢生病不對藥治之無功

五善○一飲食如常。二大小便調。三瘡色紅活皮厚堅實。

四脈靜身涼手足溫暖。五聲音清亮動止安和五者不能盡得得一二亦自清吉。

七惡○一煩燥悶亂譖妄恍惚。二嘔吐瀉利飲食不能。三黑陷焦枯癟塌破爛。四頭面預腫鼻煽肩擡目張唇裂。五喉舌潰爛食入卽嘔飲水則嗆。六寒顫咬牙聲啞色黯。七腹脹喘促四肢厥冷七者不必皆有有一二亦自難爲。

七惡之外又有渾身血泡心腹刺痛伏陷不起便溺皆血尋衣撮空是又卒死而不可救者。

○一痘疹總畧歌歌十一首方十五道

幼幼集成

卷之五 痘疹西洋月

士

痘雖火毒肇胚胎

不遇天行不見災

預施靈藥解將來

郡邑若逢疫癟日

凡痘疹之證皆由父母胎毒蓄於命門之中命門者下極丹田也爲人身生化之源或遇冬溫陽氣暴泄人則感之觸動相火至春夏生長之時卽發傳染相似是謂天行疫癟也未出痘疹者但覺冬溫宜先服解毒之藥如辰砂散三豆湯代天宣化丸之類使毒氣無傾伏留連之患如脾胃素弱者更宜調其胃氣間以四君子湯加陳皮木香之屬與之使胃氣和暢樂衛流通庶痞易出易醫也予按代天宣化卽韓氏之五瘟丹也苦寒尅削損胃敗脾縱能解疫癟之毒未必能預解先天之毒倘膏梁稟怯不察妄投吾恐毒未解而胃先損痘未至而中已寒豈有先天之毒深藏潛伏於命門之中毫未發覺而敢用此沉陰沮寒之品預代其生機者誠爲危道必不可行卽欲解之又不若三豆湯之爲得也欲知痘疹吉凶機察色觀形在細微

年壽山根尤緊要

鮮明可喜黯青非

痘疹未出之先欲知吉凶輕重但於面部推之其色紅黃明潤者吉青黑昏黯者凶相書以山根管命官年壽管疾厄所以二處尤爲緊要也

汗下雖然謂不宜

刻舟求劍豈通醫

能分虛實知權變

可越乾坤造化維

首尾不可汗下。誠痘科固執之言然亦自其平證言之耳。若遇風寒外襲應出不出。則汗劑仍不可少。如大便連日不通。煩悶狂躁不與下之。豈不失人生命。是下劑在所必用。但能消息虛實。與時權變。斯可謂之通醫。

始終便溺自調嘉

便若艱難事可嗟

腹脹喘吁多壅遏

急行疏導免留邪

此言可利則利者也。大抵痘瘡始終小便清利。而大便滋潤者爲順。若小便或秘急。宜以八正散利其小便。若大便秘結。速用通幽湯滋潤之。

痘家脈證喜中和

徐疾由來不可過

弦急浮洪爲時候

微遲短濶屬虛多

夫人以胃氣爲主。脈亦當以胃氣爲主。脈有胃氣。則氣象中和。所謂弦不弦。芤不芤者。是也。太過爲實。不及爲虛。最宜消息。痘疹傷寒證一般。

上工臨證貴詳端

幼幼集成

卷之五 痘疹絲畧

解表和中病自安

痘疹發熱與傷寒相似。但傷寒只見一經形證。痘疹則五臟之證皆見。如呵欠頓悶。肝證也。乍冷乍熱。手足稍冷。好睡。脾證也。面燥腮赤。咳嗽噴嚏。肺證也。驚悸不寧。心證也。尻涼耳涼。腎之平證也。若尻耳俱熱。則邪伏腎經也。

痘疹雖然本屬陽

往來微熱始相當

倘逢晝夜身熱火

解毒須教小便長

凡痘疹屬陽。非熱不成。故治痘不可盡除其熱。如熱太甚。毒未發盡。只宜解毒。並利小便。宜連翹升麻葛根湯。

食飮能多。胃氣充

自然榮衛兩豐隆

休言食少無他慮

但恐脾虛毒內攻

痘疹始終能食者。其人體胃素強。自然氣血充實。易壯易曆。若一旦食減。卽宜詢問。或咽喉腫痛。宜甘桔湯。傷食者。橘皮湯。若非已土二證。因脾胃氣弱。不能消食者。宜參苓白朮散。運用之。

最宜安靜號和平

表裏無邪心自清

忽爾燥煩宜審諦

更防神爽欠分明

痘瘡以安靜爲責。如表裏無邪，不必服藥。但有燥熱心神，吟不此瘡痛也。非折肱之手，莫能識其病情。治療見後。

四時分治證須真。

暑熱風寒各有因。

異氣莫教輕觸犯。

炎危反復立纏身。

大凡治病之道。春夏養陽。秋冬養陰。故春病治在肝。夏病治在心。秋病治在肺。冬病治在腎。不可逆也。治痘之人。一切須識此。如天有烈風暴雨。酷暑嚴寒。常要謹其帷幕。適其寒溫。寒則益覆。欲厚熱則居處欲清。苟傷熱則血氣乾燥。瘡易腐爛。偏寒則血氣凝滯。瘡難起發。若有觸犯。輕則變重。猝生異證。是謂災怪。如暴風連日。病見傷風之證。治以桂枝葛根湯。如寒威凜烈。病見傷寒之證。治以正氣散。若酷暑熏蒸。病見熱證。治以人參白虎湯。倘值久雨侵淫。有受溼之證。泄瀉身重。治以胃苓湯。

治痘皆言在補脾。

補中有害少人知。

虛虛實實休輕放。

審證施方貴合宣。

凡痘瘡始終以脾胃爲本。若飲食如常。六腑充實。不須服藥。若補其脾。反增煩燥。爲害匪輕。倘不能食。常多泄瀉。此氣虛也。以四君子湯助之可也。

幼幼集成

卷之五 痘疹總畧

○入方

辰砂散 預解時行痘毒。

鏡面砂 一錢研末水飛。

右研末。蜜水調分三次服。

豆湯 預解痘毒。不損元氣。

紅飯豆 一升

黑大豆 一升

鮮菜豆 一升

生甘草 三兩

右以三豆淘淨。甘草切碎。入雪水八升。若無雪水。以長流水代之。同煮豆熟爲度。去甘草。將豆曬乾。又入原湯內再浸再曬。汁盡爲度。遂日取豆與兒食之。最解痘毒。

代天宣化丸 卽五瘟丹。○預解時行疫癘。傳染相似。併治痘毒。

人中黃 屬土。甲己之年爲君。

黃芩 屬金。乙庚之年爲君。

黃蘖 屬水。丙辛之年爲君。

梔 屬木。丁壬之年爲君。

黃連 屬火。戊癸之年爲君。

苦參 佐荆芥穗。佐

防風佐 連翹佐

山豆根佐 牛蒡子佐 蘇葉佐

前五味視年之所屬者以爲君。分兩倍之。其餘四味以爲臣。分兩半之爲佐者如臣。四分之三冬至之日修合爲末。取雪水煮升麻湯。加竹懸在內。煮神麴糊爲丸。龍眼核大用辰砂明雄爲衣。每服一丸。竹葉湯下。

製人中黃法。取大甘草不拘多少。納於新竹筒中。緊塞其口。放在糞缸中浸七七日。取起曬乾。聽用。

八正散 治痘疹小便秘澁。宜清心火利膀胱。

木通

滑石

甘草

連翹

升麻

猪苓

茯苓

瞿麥

淡竹葉

已上各
痘疹總畧

燈心十莖

水煎熱服。
治痘疹大便秘結。宜潤腸。涼血降火。

幼幼集成

卷之五

痘疹總畧

紫草

當歸

生地

火麻仁

枳殼

大黃

檳榔

紅花

桃仁

俱等分

生薑一片

爲引水煎熱服。
連翹升麻葛根湯。治痘毒不能盡發。宜升托之。

連翹

升麻

乾葛

赤芍

桔梗

黃芩

梔仁

木通

麥冬

牛蒡子

滑石

炙甘草

淡竹葉七片

燈心十莖爲引水煎熱服。
加味甘桔湯。治痘疹不能飲食。由咽喉作痛。

加味甘桔湯

治痘疹不能飲食。由傷食所致。

甘草

桔梗

牛蒡子

射干

升麻

荆芥穗

燈心十莖

水煎熱服。

橘皮湯

治痘疹不能飲食。由傷食所致。

陳皮

青皮

枳殼

木香

甘草

楂肉

雲苓

麥牙一撮爲引水煎空心服

參苓白朮散

治痘疹脾胃虛弱不思飲食

人參

白朮

雲苓

甘草

楂肉

廣皮

桔梗

木香

蜜

砂仁三粒爲引水煎半餳服

桂枝葛根湯

治痘疹初起傷風咳嗽自汗

桂枝

白芍

粉葛

防風

炙甘草

生薑三片大棗三枚水煎熱服。畧緩益覆。

正氣散

治痘疹初起因傷於寒作熱無汗頭身痛肢強

漂蒼术

陳皮

厚樸

木香

麻黃

幼幼集成

卷之五

痘疹總畧

生薑三片大棗一枚水煎溫服。

人參白虎湯

治痘疹初起夏月傷暑大熱煩燥作渴

人參

知母

熟石膏

香薷

麥冬

藿香

扁豆

淡竹葉

炙甘草

蜜

粳米一撮爲引水煎熟服

胃苓湯

治痘疹初起傷食泄瀉身重

蒼朮

陳皮

厚樸

白朮

雲苓

猪苓

澤瀉

桂枝

炙甘草

燈心十莖水煎熟服

四君子湯

治痘疹脾虛食少更多泄瀉

人參

白朮

雲苓

炙甘草

生薑三片大棗一枚水煎服

生薑

大棗

水煎服

四物湯 治痘瘡能食大便秘。瘡紅腫。

當歸

川芎 白芍 生地

生薑一片引水煎熱服。

○一發熱證治歌

歌一十五首 方二十五道。

痘瘡初起身先熱。

輕重吉凶何以別。

熱輕毒淺吉堪云。

熱重毒深凶可說。

凡發熱乍進乍退、與微熱者其痘必稀而輕。毒亦淺不必服藥。
若蒸蒸作熱煩燥昏眩其痘必密而重。毒亦深宜發表解毒托
裏加味。升麻 乾葛 赤芍 甘草 荆芥 柴胡

葛根湯 牛蒡 桔梗 連翹 木通

葛根湯

桔梗

連翹

木通

防風

初逢熱渴邪藏裏。

切忌冰瓜兼冷水。

生津止渴是良圖。

小渴任之而已矣。

凡發熱作渴因痘毒內蒸銷其津液故令口乾而渴。微者頻以
炒米湯與之切不可以冷水凍柿柑梨西瓜菱角之類食之。反
傷胃氣亦不可以椒薑湯飲之恐生瘡毒而有他變渴甚不
宜解渴。葛根湯。

幼幼集成

卷之五 痘疹總畧

六

如痘已出齊或起發或收靡而渴不止者宜人參麥冬散。
如泄瀉不止而作渴者此脾胃虛弱津液枯也宜七味白朮散。

腹痛剛逢發熱時。

毒攻於裏報君知。

大腸秘結須攻下。

莫待臨危悔已遲。

書云發熱腹中痛痘瘡毒內攻發多生不久發少更防癰。可見
痘疹腹痛即是毒氣內攻便當托裏化毒爲上不可逡巡以生
他變若飲食如常而腹痛者宜化毒湯。
如大便秘結煩燥作渴而腹痛者宜三黃解毒湯。若泄瀉而腹
痛者宜建中托裏湯。

發熱腰疼毒伏留。

幾人逢此得優游。

人參敗毒真解絕。

痛減瘡稀病可瘳。

凡痘瘡發熱腰痛其證最惡速用人參敗毒散托之服藥後痛
止者吉不 止者凶。

初時發熱多風搐。

要識病源屬肝木。

木能勝土又歸心。

風火相爭脾不足。

凡痘瘡發熱有作搐者因木邪盛而侮土。以導赤散加辰砂服
之即止。此痘甚好以搐搦發散於四肢故也。

如痘癰出不出而搘搘不止。宜瀉青導赤散解之。服藥後搘止。但心煩啼叫。用麥冬導赤散清之。

若痘已收曆餘熱不退而作搘。此大虛之候多不可救。但不外坐視。當以益神湯合抱龍丸倍加人參服之。輕者可愈。

熱時吐瀉相兼作。

上下毒伸無鬱遏。

三焦火盛熱中求。

日久須防脾胃弱。

凡痘瘡發熱有嘔吐者。有泄瀉者。有吐瀉兼作者。不可驟止。令毒上不得出。但痘瘡現形。吐瀉即止者吉兆也。如久不止。先以調中湯和之。如仍不止。以豆蔻丸止之。服藥後吐瀉既止。更服

狂言燥擾莫遲疑。使脾氣實其痘易壯易曆也。

神識昏迷熱在裏。

譖妄不休應不起。

凡痘瘡發熱。妄有所見而譖語者。或昏昏好睡。夢中謬語喃喃。或狂走尋衣摸牀。皆毒氣內攻。神室不清所致也。急用鎮心解毒之藥。以辰砂導赤散主之。服藥神情復舊者吉。不止則凶。不可治也。

渾身發熱四肢寒。

脾胃虛衰陰冷干。

益氣補中應令暖。

仍前瘡盛禍百端。

幼幼集成

卷之五

痘疹總畧

七

凡痘瘡証身宜熱。獨耳尻二處宜涼。所以痘疹之證頭宜涼。手足宜溫。若反冷者。此脾胃虛弱也。四肢脾胃所同。宜補中益氣扶其中氣。斯可矣。

發熱熏蒸血妄行。

不知何道血如傾。

但從鼻出方無忌。

別道來時禍立萌。

人身之血不可妄動。痘疹之火熏蒸於內。迫血妄行。隨火而動。或從日出。或從大小便出。皆死證也。但從鼻出者。或有可救之機。宜玄參解毒湯清之。若煩躁闇亂出血不止。此陽瘡出離之證。多不可治。

晨昏發熱渾無歇。

口舌生瘡唇破裂。

咽喉塞痛食難嘗。

方用黃連及甘桔。

凡痘未出而熱不止。晝夜煩躁。口舌生瘡。唇裂。咽痛。此毒火盛。其熱甚。急治不宜緩。急以黃連解毒湯合甘桔湯治之。服藥不效者。不治。

微微熱汗吉之機。

調元固胃效無違。

但恐汗多陽氣弱。

腠理疏通毒發稀。