

自然珍藏

AD

图鉴丛书

北方药用植物

近600种中国北方药用植物的 彩色图鉴



北方药用植物

丁学欣 编著

郭卫东 郭宪 薛凯 彭博 姚一麟 姜良宝 张植玮 摄影
蒋虹 华玉龙 朱柏春 河源龙 丁学欣 等



南方日报出版社
NANFANG DAILY PRESS

中国·广州

图书在版编目(CIP)数据

北方药用植物 / 丁学欣编著. — 广州: 南方日报出版社, 2009.9

(自然珍藏图鉴丛书)

ISBN 978-7-80652-927-0

I. 北… II. 丁… III. 药用植物—图集 IV. Q949.95-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第164946号

Copyright © 2009 Anno Domini Media Co. Ltd., Guangzhou

广州公元传播有限公司

All rights reserved

所有权利保留

图片提供:  www.fototee.com

北方药用植物

编 著 / 丁学欣


责任编辑 / 阮清钰

特约编辑 / 区 蕾

装帧设计 / 唐 薇

责任技编 / 杨 扬

出版发行 / 南方日报出版社 (地址: 广州市广州大道中289号)

制 作 /  广州公元传播有限公司

印 刷 / 广州市一丰印刷有限公司

规 格 / 889mm × 1194mm 1/32 9.5印张

版 次 / 2009年10月第1版第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-80652-927-0

定 价 / 49.00元

(咨询电话: 020-38865309)

前言 PREFACE

我国北方大体指秦岭淮河以北的地区。地理环境多样，有山地、平原、湿地、沙漠、草原等，给各种植物创造了不同的生长环境，因此北方的植物种类繁多，其中有很多具有药用价值。为了更好地利用这些丰富的药用植物资源，继承和发扬传统的中医药文化，在《南方药用植物》的基础上，编写此书，作为补充和完善。

本书收录北方常见药用植物556种，按恩格勒系统的科属分类进行排列，采用图文对照的形式编排。文字部分包括植物名称、药名、植物特征、药用部位、性味归经、功能主治、用法用量等。受篇幅限制，对于同一植物不同的药用部位，只对常用部分进行描述。每一植物，均有准确的论述和精美彩图，便于研究人员、中药工作者、院校学生和爱好者参考和查阅，轻松辨认植物，并可学到相应的药学知识。

本书所收录的植物，大体分为野生、栽培两大类。收录地区以华北、华中地区为主，兼顾部分东北、西北地区常见野生或栽培的重要药用植物，同时也收录少量珍贵的民间草药。

本书收录的野生药用植物，出自编者的野外观察记录，以看到其野外生长形态为标准；栽培药用植物，则来源于植物园或药圃的种植记录，以能在北方自然生长的形态特性为标准；民间药材，则以通过国家检测标准，入册的药品为标准。栽培不超过一年、药典未收录、野外未见而仅见于文献的药用植物，本书暂不收录。

本书编者长期从事植物教学工作，有丰富的野外经验和丰厚的植物分类学功底。本书的出版，对普及药用植物知识将起到一定的辅助作用。由于时间仓促，以及编者自身知识所限，本书定会存在相当的缺点和错误，恳请读者批评指正。

丁学欣



目录

CONTENT

蕨类植物

中华卷柏·····	12
木贼·····	12
节节草·····	13
问荆·····	13
溪洞碗蕨·····	14
蕨·····	14
剑叶凤尾蕨·····	15
井栏边草·····	15
银粉背蕨·····	16
团羽铁线蕨·····	16
普通凤丫蕨·····	17
蛾眉蕨·····	17
虎尾铁角蕨·····	18
荚果蕨·····	18
中岩蕨·····	19
全缘贯众·····	19
金鸡脚·····	20
有柄石韦·····	20
瓦韦·····	21
乌苏里瓦韦·····	21
苹·····	22
槐叶苹·····	23
满江红·····	23



裸子植物

华北落叶松·····	26
金钱松·····	26
油松·····	27
红松·····	27
柳杉·····	28
沙地柏·····	28
刺柏·····	29
杜松·····	29
三尖杉·····	29
紫杉·····	30
东北红豆杉·····	30
草麻黄·····	31
木贼麻黄·····	31



被子植物

双子叶植物

银线草·····	34
山杨·····	34
旱柳·····	35
胡桃·····	35
胡桃楸·····	36
枫杨·····	36
白桦·····	37
棘皮桦·····	37
榛·····	38
栗·····	38
麻栎·····	39
榆·····	39
榔榆·····	40
小叶朴·····	40

蒙桑····· 41
 柘树····· 42
 构棘····· 42
 无花果····· 43
 啤酒花····· 43
 葎草····· 44
 大麻····· 44
 狭叶荨麻····· 45
 宽叶荨麻····· 45
 麻叶荨麻····· 46
 大叶苧麻····· 46
 蝎子草····· 47
 透茎冷水花····· 47
 墙草····· 48
 北桑寄生····· 48
 榭寄生····· 49
 细辛····· 49
 杜衡····· 50
 马蹄香····· 50
 北马兜铃····· 50
 木通马兜铃····· 51
 绵毛马兜铃····· 51
 篇蓄····· 52
 红蓼····· 52
 支柱蓼····· 53
 拳蓼····· 53
 水蓼····· 54
 刺蓼····· 54
 杠板归····· 55
 珠芽蓼····· 55
 酸模叶蓼····· 56
 苦荞麦····· 56
 羊蹄····· 57
 尼泊尔酸模····· 57
 酸模····· 58
 皱叶酸模····· 58
 大黄····· 59
 波叶大黄····· 59
 河北大黄····· 60
 短毛金线草····· 60

肾叶山蓼····· 61
 中华山蓼····· 61
 蕺苕菜····· 62
 灰绿藜····· 62
 菊叶香藜····· 63
 菠菜····· 63
 翅碱蓬····· 64
 地肤····· 64
 皱果苋····· 65
 反枝苋····· 65
 苋····· 66
 凹头苋····· 66
 尾穗苋····· 67
 垂序商陆····· 67
 番杏····· 68
 蚤缀····· 68
 灯心草蚤缀····· 69
 异花假繁缕····· 69
 异叶假繁缕····· 70
 牛繁缕····· 70



簇生卷耳····· 71
 叉歧繁缕····· 71
 异色繁缕····· 72
 漆姑草····· 72
 剪秋罗····· 73



大花剪秋罗····· 73
 蝇子草····· 74
 石生蝇子草····· 74
 麦瓶草····· 75
 狗筋蔓····· 75
 瞿麦····· 76
 旱麦瓶草····· 76
 莲····· 77
 芡实····· 78
 睡莲····· 78
 萍蓬草····· 79
 金鱼藻····· 79
 连香树····· 80
 牡丹····· 80
 芍药····· 81
 金莲花····· 81
 铁筷子····· 82
 长果升麻····· 82
 升麻····· 83
 单穗升麻····· 83
 黄连····· 84
 天葵····· 84
 华北楼斗菜····· 85
 瓣蕊唐松草····· 85
 贝加尔唐松草····· 86
 高乌头····· 86
 北乌头····· 87
 黄乌头····· 87
 华北乌头····· 88
 高山乌头····· 88
 翠雀····· 89
 还亮草····· 89
 毛茛····· 90
 石龙芮····· 90
 茴茴蒜····· 91

侧金盏花·····	91	白花菜·····	106	合萌·····	126
林荫银莲花·····	92	大白菜·····	106	皂荚·····	126
草玉梅·····	92	菘蓝·····	107	槐树·····	127
小花草玉梅·····	93	芥菜·····	107	苦参·····	127
獐耳细辛·····	93	豆瓣菜·····	108	木蓝·····	128
白头翁·····	94	蕹菜·····	108	截叶铁扫帚·····	128
黄花铁线莲·····	94	播娘蒿·····	109	胡枝子·····	129
棉团铁线莲·····	95	二月兰·····	109	杭子稍·····	129
短尾铁线莲·····	95	瓦松·····	110	鸡眼草·····	130
		小丛红景天·····	110	补骨脂·····	130
		狭叶红景天·····	111	米口袋·····	131
		景天·····	111	膜荚黄芪·····	131
		景天三七·····	112	野葛·····	132
		华北景天·····	112	落花生·····	132
		佛甲草·····	113	歪头菜·····	133
		落新妇·····	113	广布野豌豆·····	133
		刺果茶藨子·····	114	红花锦鸡儿·····	134
		细叉梅花草·····	114	硬毛棘豆·····	134
		山楂·····	115	刺果甘草·····	135
		槲寄生·····	115	甘草·····	135
		木瓜·····	116	红花菜豆·····	136
		皱皮木瓜·····	116	五脉山黧豆·····	136
		山刺玫·····	117	牻牛儿苗·····	137
		地榆·····	117	蒺藜·····	137
		棣棠·····	118	白刺·····	138
		鸡麻·····	118	花椒·····	138
		石生悬钩子·····	119	白鲜·····	139
		山楂叶悬钩子·····	119	黄檗·····	139
		覆盆子·····	120	枸橘·····	139
		华北覆盆子·····	120	香橼·····	140
		东方草莓·····	121	臭椿·····	140
		委陵菜·····	121	苦木·····	141
		鹅绒委陵菜·····	122		
		银露梅·····	122		
		西伯利亚杏·····	123		
		郁李·····	123		
		欧李·····	124		
		櫻桃·····	124		
		稠李·····	125		
		合欢·····	125		





远志	141
地锦草	142
续随子	142
大戟	143
甘遂	143
泽漆	144
野漆树	144
黄枬	145
冬青卫矛	145
卫矛	146
七叶树	146
水金凤	147
马甲子	147
酸枣	148
拐枣	148
鼠李	149
山葡萄	149
爬山虎	150
白藜	150
野葵	151
蜀葵	151
药用蜀葵	152
苘麻	152
梧桐	153
软枣猕猴桃	153
猕猴桃	154
木天蓼	154
紫花地丁	155
鸡腿莖菜	155
中华秋海棠	156
结香	156
瑞香狼毒	157
草瑞香	157
河朔堇花	158

木半夏	158
翅果油树	159
千屈菜	159
瓜木	160
菱角	160
月见草	161
锁阳	161
刺五加	162
无梗五加	162
土当归	163
人参	163
峨参	164
北柴胡	164
黑柴胡	165
防风	165



茴香	166
窃衣	166
辽藁本	166
细叶藁本	167
葛缕子	167
当归	168
白芷	168
独活	169
短毛独活	169
石防风	170
山茱萸	170
鹿蹄草	171
照山白	171
迎红杜鹃	172
点地梅	172
七瓣莲	173

胭脂花	173
过路黄	174
轮叶排草	174
二色补血草	175
黑枣	175
小叶白蜡	176
连翘	176
流苏树	177
红丁香	177
密蒙花	178
秦艽	178
当药	179
红直当药	179
睡菜	180
罗布麻	180
萝藦	181
杠柳	181
白薇	182
牛皮消	182
白首乌	183
徐长卿	183
菟丝子	184
金灯藤	184
打碗花	185
田旋花	185
圆叶牵牛	186
紫草	186
鹤虱	187
附地菜	187
荆条	188
臭牡丹	188
海州常山	189
白苞筋骨草	189
黄芩	190
夏至草	190
藿香	191
荆芥	191
白透骨消	192
糙苏	192
独一味	193

野芝麻····· 193
 丹参····· 193
 牛至····· 194
 野薄荷····· 194
 甘露子····· 195
 百里香····· 195
 石香薷····· 196
 岩青兰····· 196
 假酸浆····· 197
 宁夏枸杞····· 197
 天仙子····· 198
 小菖蓉····· 198
 酸浆····· 199
 龙葵····· 199
 白英····· 200
 茄····· 200
 辣椒····· 201
 曼陀罗····· 201
 地黄····· 202
 洋地黄····· 202
 玄参····· 203
 胡黄连····· 203
 细叶婆婆纳····· 204
 草本威灵仙····· 204
 反顾马先蒿····· 205
 沟酸浆····· 205
 阴行草····· 206
 梓树····· 206
 凌霄····· 207
 角蒿····· 207
 肉苁蓉····· 208
 黄花列当····· 208
 珊瑚苣苔····· 209
 牛耳草····· 209
 爵床····· 210
 透骨草····· 210
 大车前····· 211
 平车前····· 211
 猪殃殃····· 212
 蓬子菜····· 212

盘叶忍冬····· 213
 金银花····· 213
 接骨木····· 214
 败酱····· 214
 缬草····· 215
 续断····· 215
 日本续断····· 216
 假贝母····· 216
 绞股蓝····· 217
 赤雹····· 217
 丝瓜····· 218
 西瓜····· 218
 香瓜····· 219
 冬瓜····· 219
 瓜蒌····· 220
 王瓜····· 220



瓢瓜····· 221
 苦瓜····· 221
 南瓜····· 222
 桔梗····· 222
 党参····· 223
 羊乳····· 223
 芥苳····· 224
 石沙参····· 224
 紫沙参····· 225
 展枝沙参····· 225
 多歧沙参····· 226
 山梗菜····· 226
 兰花参····· 227
 泽兰····· 227
 白鼓钉····· 228
 全缘马兰····· 228
 东风菜····· 228
 紫菀····· 229
 铃铃香青····· 229
 鼠麴草····· 230
 旋复花····· 230
 土木香····· 231
 天名精····· 231
 蒙古苍耳····· 232




狼把草····· 232
 鬼针草····· 233
 辣子草····· 233
 高山蓍····· 234
 菊花····· 234
 甘野菊····· 235
 茵陈蒿····· 235
 南牡蒿····· 236
 青蒿····· 236
 野艾蒿····· 237
 款冬····· 237
 兔儿伞····· 237
 北苍术····· 238
 白术····· 238
 牛蒡····· 239
 狭苞橐吾····· 239
 小蓟····· 240
 大刺菜····· 240
 毛大丁草····· 241
 川木香····· 241
 祁州漏芦····· 242
 红花····· 242
 鸦葱····· 243
 桃叶鸦葱····· 243
 蒲公英····· 244
 山苦荬····· 244
 苦苣菜····· 245
 苦苣菜····· 245
 毛连菜····· 246
 三七草····· 246

单子叶植物

东方香蒲····· 247

慈姑····· 247
野慈姑····· 248
苦草····· 248
芦苇····· 249
荻····· 249
茭白····· 250
狗牙根····· 250
荻草····· 251
高粱····· 251
薏苡····· 252
玉米····· 252
小麦····· 253
蟋蟀草····· 253
马唐····· 254
光头稗子····· 254
早园竹····· 255
荆三棱····· 255
刚毛荸荠····· 256
香附子····· 256
宽叶苔草····· 257
蛇头草····· 257
独角莲····· 258
半夏····· 258
掌叶半夏····· 259
东北南星····· 259
天南星····· 260
大藻····· 260
浮萍····· 261
紫萍····· 261
谷精草····· 262
鸭舌草····· 262
雨久花····· 263



凤眼莲····· 263
百部····· 264
直立百部····· 264
藜芦····· 265
知母····· 265
黄花菜····· 266
小萱草····· 266
北黄花菜····· 266
大花萱草····· 267
玉簪····· 267
芦荟····· 268
老鸦瓣····· 268
郁金香····· 269
兰州百合····· 269
有斑百合····· 270
卷丹····· 270
山丹····· 271
大百合····· 271
川贝母····· 272
绵枣····· 272
小根蒜····· 273
苍葱····· 273
洋葱····· 274
铃兰····· 274
鹿药····· 275
兴安鹿药····· 275
热河黄精····· 276
小玉竹····· 276
黄精····· 277
北重楼····· 277
延龄草····· 278
龙须菜····· 278
曲枝天门冬····· 279
麦冬····· 279
粉条儿菜····· 280
牛尾菜····· 280
华东菝葜····· 281
忽地笑····· 281
石蒜····· 282
水仙····· 282

穿山龙····· 283
盾叶薯蓣····· 283
野薯蓣····· 284
番红花····· 284
马蔺····· 285
野鸢尾····· 285
美人蕉····· 286
二叶舌唇兰····· 286
白芨····· 287
天麻····· 287
绶草····· 288
手参····· 288
石斛····· 289
角盘兰····· 289



笔画索引····· 290
拉丁名索引····· 297
参考文献····· 303





蕨类植物

PTERIDOPHYTE

科：卷柏科	种： <i>Selaginella sinensis</i> (Desv.) Spring	药名：中华卷柏	别名：地网子、地柏、翠云草、地柏枝
-------	---	---------	-------------------

中华卷柏

药用部位：全草。


植物特征：多年生草本。主茎圆柱形，坚硬。茎下部叶卵状椭圆形，全缘，贴伏于茎，疏生；上部叶二型，四列，侧叶长圆形或长卵形，钝尖或有短刺，基部圆楔形，边缘干后常反卷；中叶长卵形；叶草质，光滑。孢子囊穗单生枝顶；孢子叶卵形、三角形，先端锐尖；孢子囊圆肾形；大孢子囊通常少数，小孢子囊多数，孢子二型。

性味归经：淡、微苦，凉。归肝、胆、大肠经。

功能主治：清热利尿，化痰，止血，止泻。用于湿热、小便不利、淋症，咳嗽、咳痰，外伤出血、痢疾等症。

用法用量：4.5 ~ 9克，水煎服。

使用注意：孕妇慎用。



生境：山地岩石。

科：木贼科	种： <i>Equisetum hiemale</i> L.	药名：木贼	别名：木贼草、锉草、节骨草、无心草
-------	--------------------------------	-------	-------------------

木贼

药用部位：地上部分。

植物特征：一年或多年生草本。枝端产生孢子叶球，矩形，顶端尖，形如毛笔头。地上茎单一枝不分枝，中空，有纵列的脊，脊上有疣状突起。叶成鞘状，紧包节上，顶部及基部各有一黑圈，鞘上的齿极易脱落。

性味归经：甘、苦，平。归肺、肝经。

功能主治：散风热，退目翳。用于风热目赤，迎风流泪，目生云翳。

用法用量：3 ~ 9克，水煎服或入丸、散。外用研末撒于患处。

使用注意：气虚、血虚目疾者应慎用。

顶端尖

叶呈鞘状

茎单一不分枝

药材

生境：坡林下阴湿处、河岸湿地、溪边，喜阴湿的环境，有时也生于杂草地。

科：木贼科

种：*Equisetum ramosissimum*
Desf.

药名：节节草

别名：土木贼、锁眉草、
笔杆草

茎细弱

节节草

药用部位：地上部分。**植物特征：**多年生草本。茎细弱，绿色，基部多分枝，上部少分枝或不分枝，粗糙具条棱，叶鳞片状，轮生。孢子囊长圆形，有小尖头；孢子叶六角形，中央凹入。**性味归经：**甘、微苦，平。
归肺、肝经。**功能主治：**清热，利尿，明目退翳，祛痰止咳。用于目赤肿痛、角膜云翳、肝炎、咳嗽、支气管炎、泌尿系感染。**用法用量：**10 ~ 15g，水煎服。**使用注意：**有小毒，不可长期大量服用；孕妇慎用。

生境：河滩、路边潮湿处。



科：木贼科

种：*Equisetum arvense* L.

药名：接续草、公母草

别名：土麻黄、笔头草

问荆

药用部位：地上部分。**植物特征：**多年生草本。营养茎在孢子茎枯萎后生出，叶退化，下部联合成鞘；分枝轮生，中实。孢子茎常为紫褐色，肉质，不分枝。孢子叶六角形，盾状着生，螺旋排列，边缘着生长形孢子囊。孢子一型。**性味归经：**苦，平。归肺、肝、肾经。**功能主治：**清热，凉血，止咳，利尿。治吐血，鼻出血，便血，倒经，咳嗽气喘，淋病。**用法用量：**5 ~ 15克，水煎服。外用捣敷或研末调敷。**使用注意：**有小毒，不可长期大量服用；孕妇慎用。营养茎具分枝，
叶退化

孢子囊穗



生境：田边沟旁。

科：碗蕨科

种：*Dennstaedtia wilfordii* (Moore) Christ

药名：溪洞碗蕨

溪洞碗蕨

药用部位：叶柄、根状茎。


植物特征：多年生草本。根状茎长而横走，栗黑色，密被棕色节状长毛。叶疏生，由下向上依次为栗黑色、红棕色、麦秆色，除基部疏生毛外其余无毛而有光泽；叶片长圆状披针形，先端渐尖，2~3回羽状深裂；羽片互生，具柄，卵状披针形、卵形或披针形，基部不对称；裂片形状不规则，近倒卵形，粗锯齿缘，脉羽状，每锯齿有1条小脉，小脉不伸达叶缘，先端有水囊体。孢子囊群近圆形，囊群盖浅杯形，淡绿色。

性味归经：苦，寒。归膀胱、胃经。

功能主治：清利湿热，通淋止痛。
用于热淋、砂淋、血淋、膏淋、尿道涩痛。

用法用量：6~12克，
水煎服。

羽片互生

2~3回
羽状深裂

生境：山地阴处石缝、水沟旁或阔叶

林下。

科：凤尾蕨科

种：*Pteridium aquilinum* var. *latiusculum*.

药名：蕨菜

别名：如意菜

蕨

药用部位：根状茎。

植物特征：多年生草本。根状茎长而横走，有黑褐色绒毛。早春新生叶拳卷，呈三叉状。柄叶鲜嫩，上披白色绒毛，此时为采集期。叶片呈三角形，2~3回羽状分裂，下部羽片对生，褐色孢子囊群连续着生于叶片边缘，有双重囊群盖。

性味归经：甘、涩，寒，无毒。归大肠、膀胱经。

功能主治：有清热，健胃，滑肠，降气，驱风，化痰等功效。主治食隔、气隔、肠风热毒等症。


用法用量：内服煎汤，5~15克。

叶片三角形

三叉状

幼叶拳卷

羽状分裂



生境：林下。

科：凤尾蕨科 种：*Pteris ensiformis* Burm. 药名：凤尾蕨 别名：井边茜、三叉草

剑叶凤尾蕨

药用部位：全草。

植物特征：多年生蕨类。根茎短而细，斜上或横生，不分歧或有少数侧芽，外被稀疏赤褐色鳞片；鳞片线形。蕨叶为1~2回羽状复叶，侧生羽片2~5对，簇生，绿色至深绿色，草质；两型：营养叶叶柄短，羽片与小羽片椭圆形至长椭圆形且边缘有锯齿；营养孢子叶羽片与小羽片为细长的剑形至线形，背面近叶缘处着生大量的孢子囊群。孢子囊群线形，并由反卷的叶缘所包裹。孢子黄褐色。

性味归经：甘、淡、微涩，凉。归肝、肺、肾经。

功能主治：清热利湿，宁肺止咳，软坚消积。用于感冒发热、咳嗽、肺结核咯血、痢疾、急性肠炎、小儿疳积、中毒性消化不良、泌尿系感染；外用治乳腺炎、淋巴结炎。

用法用量：块茎或全草25~50克，煎汤内服；外用适量，捣敷患处。

生境：林下。



孢子叶



科：凤尾蕨科 种：*Pteris multifida* Poir 药名：井栏边草 别名：凤尾草、铁脚鸡

井栏边草

药用部位：全草。

植物特征：多年生草本。根状茎粗状，直立，密被钻形黑褐色鳞片。叶二型，丛生，无毛；生孢子囊的能育叶片卵形，1回羽状，上面绿色，下面淡绿色，下部羽片常2~3叉，羽片线形，对生或近对生，全缘，沿羽片下面边缘着生孢子囊群；孢子囊群线形，膜质。不生孢子囊群的羽片或小羽片均较宽，线形或卵圆形，边缘有不整齐的尖锯齿。

性味归经：微苦，凉。归肝、肺、肾经。

功能主治：清热利湿，凉血止血，消肿解毒。主治湿热痢、泄泻、黄疸、淋浊、带下、尿血、便血、崩漏、咽喉肿痛等病症。

用法用量：30克，水煎服。

生境：阴湿墙脚、井边和石灰岩石上。



羽片线形

科：中国蕨科	种： <i>Aleuritopteris argentea</i> (Gmel.) Fee	药名：通经草	别名：金丝草、铜丝草、金牛草
--------	---	--------	----------------

银粉背蕨

药用部位：全草。

植物特征：多年生草本。根状茎直立或斜生，其上有亮黑色披针形鳞片，鳞片边缘红棕色。叶厚纸质，簇生，叶片五角形，由3片基部相连或分离的裂片组成，每一裂片2回羽状裂，顶生裂片近菱形，侧生的二个裂片为三角形。叶表暗绿色叶背有银白色或乳黄色的粉粒。

性味归经：淡、微涩，温。归肺、肾经。

功能主治：活血调经，补虚止咳。用于月经不调、闭经腹痛、肺结核咳嗽、咯血。

用法用量：15 ~ 25克，水煎服。



生境：山区岩石缝隙中。

科：铁线蕨科	种： <i>Adiantum capillus-junonis</i> Rupr.	药名：猪鬃七	别名：翅柄铁线蕨、乌脚芒、岩浮萍
--------	---	--------	------------------

团羽铁线蕨

药用部位：全草。

植物特征：多年生草本。根状茎短而直立，顶端被褐色狭披针形鳞片。叶簇生，薄草质，光滑无毛，叶柄纤细，亮栗色，有光泽，基部疏生鳞片；叶片狭披针形，1回羽状，叶轴顶端常延伸成鞭状，接地生根，行营养体繁殖；羽片5 ~ 10对，有小柄，通常互生，圆扇形或扇形，上缘半圆形，波状至浅裂，全缘。孢子囊群生于裂片边缘，线状长圆形或长圆形，稀为圆肾形；囊群盖同型，灰棕色，纸质，近全缘。

性味归经：微苦，凉。归肺、肾经。

功能主治：清热利尿，舒筋活络，补肾止咳。主治血淋、尿闭、乳腺炎、遗精、咳嗽。

用法用量：25 ~ 50克，水煎服。外用适量捣敷患处。



生境：石灰岩岩石缝中。