

醫

便

醫便卷四

海陽

張受孔心如父

重訂

姚學顏伯愚父

濟陰類

凡婦人小兒老人諸症除婦人胎產經候小兒驚
痺變蒸痘疹老人血氣衰憊水火升降失度與大
人治法不同故另立方法其餘症同大人者悉照
前四時方法用

四物湯

百五

治婦人之總藥隨症加減妙用無窮

方見滋補類加減于後

經水過期不行血寒血少也本方五錢加香附莪

朮

各一錢

蘇子

八分

桃仁

三十粒

紅花官桂木通

各七分

甘草

草

三分

空心煎服

○經水先期而來血熱也加黃柏

知母条芩黃連

各七分

甘草

三分生

人參阿膠艾葉

各五

分

香附荆芥穗

各一錢

空心煎服

○血枯經閉本方

一半加桃仁紅花共五錢空心煎服○色淡者痰

多也本方去地黃加二陳湯等分和服○紫黑者

血熱也本方五錢加黃芩黃連荆芥穗

各一錢

○臨

行腰腹疼痛乃鬱滯有瘀血加桃仁紅花莪朮玄

胡索香附錢各一木香五分另磨入○潮熱發熱本方五

錢加地骨皮薄荷各一錢五分柴胡防風各五分甘草三分

烏梅箇一同煎食遠服○虛寒者用熟地黃加乾姜

官桂吳茱萸錢各一甚者再加熟附子錢一○虛極者

本方與四君子等分加黃芪半一錢熟附子七分○經

行不止者本方加真阿膠艾葉地榆荆芥穗錢各一

○妊娠胎動加香附砂仁紫蘇各七分白朮条芩各一

錢阿膠炒八分蘼艾五分去生地黃用熟地黃○胎前

產後血痢加黃連地榆阿膠艾葉

各八分

厚朴

五分

五心煩熱加柴胡黃芩地骨皮

各一錢

甘草

三分

麥門

冬

八分

○

漏死胎

加交桂麝香

白芷

○

赤白帶下

加

藁本牡丹皮川續斷

各八分

○

產後惡露作痛

加香

附乾姜

炒黑七分

生蒲黃

陳皮

各八分

○

產後發熱

加

白朮茯苓陳皮黑乾姜

各八分

○

久無子息

加附子

肉蓯蓉

各一錢

熟地黃

鹿角膠

各一錢半

烏骨鷄丸

附

治婦人經候不調

并胎前產後一切諸

症調經育子之上藥也累用奇効

香附

二斤

蘼艾

去梗淨 二斤

上二味分作四分每分

一斤二分老酒二分米醋一分童便一分糯米泔
各浸一宿炭火煮爛熟為佳石臼內木槌搗成薄
餅晒乾磨為末聽用大白毛烏骨雄雞一隻弔死
去毛熱湯修理腸雜潔淨勿見生水再用

當歸

酒洗淨 四兩

白芍藥

酒炒 四兩

熟地黃

酒浸忌 鐵器 四兩

兩

人參

去蘆 二兩

黃芪

蜜炙 二兩

白朮

炒

陳皮

去白

白茯苓

去皮

砂仁

炒各一 兩五錢

烏藥

炒一 兩

神麴

炒

甘草

炙各七 錢五分

右藥十二味製淨爲粗末裝入雞肚內以線縫住
仍用老酒米醋童便米泔等分入砂鍋內炭火煮
令爛熟去骨石臼搗成餅晒乾磨爲細末聽用再
加

木香

沉香

各五錢
不見火

官桂

乾姜

炒半黑
各三錢

右四味另研爲細末聽用

右三次藥末和勻重

羅篩過煉蜜丸如梧桐子大每服七十丸空心滾
水打塩湯下愚按此方血虛多鬱婦人服極効

濟陰返魂丹

百五
三

治婦人胎前產後總藥一名益

母丸用益母草一味其草卽克蔚子其葉類大麻對節而生方梗四面立六月間節節開紫花白花者不是南北隨處有之於端午小暑或六月六日花正開時連根收採透風處陰乾不犯銅鐵器石臼木杵搗羅爲細末煉蜜爲丸如彈太每服一丸各照後開引下或量加當歸赤芍藥木香尤妙其藥不限丸數以病愈爲止日服三五丸或丸如梧桐子太每服七八十丸空心食遠照後引下或熬膏調引用尤妙

熬膏法

附

益母草不拘多少連根莖葉洗淨入石臼

內搗爛以布濾取濃汁入砂鍋內文武火熬如黑
砂糖色爲度以磁瓶收貯每用一茶匙照後開引
調用極効○胎前臍腹刺痛胎動不安下血不止
煎秦艽當歸粳米湯下○胎前產後臍腹作痛作
聲或寒熱往來如瘧狀者並用米湯下○臨產併
產後各先用一丸童便酒化下安魂定魄調血順
氣諸病不生又能破血止痛養脉息調經絡其功
甚大○產後胎衣不下落在胞中及產前一切難

產併橫生逆產胎死經日不下腹中脹滿心下悶
痛炒鹽湯下○產後中風牙關緊急半身不遂失
音不語童便酒各半化下○產後氣喘欬嗽胸膈
不利吐酸水面目浮腫手足疼痛舉動失力者溫
酒下○產後兩太陽穴痛呵欠怔忡氣短肢體羸
瘦不思飲食血風身熱手足頑麻百節骨痛米湯
下○產後眼前黑暗血暈血熱口渴煩悶如見鬼
神狂言不省人事薄荷自然汁下如無濃煎薄荷
湯或童便酒各半下○產後面垢顏赤五心煩熱

或結成血塊。臍腹奔痛。時發寒熱。有冷汗者。童便酒各半下。薄荷湯亦可。○產後瘀血惡露不盡。結滯臍腹刺痛。惡物上冲。心胸滿悶。童便酒下。○產後未經滿月。氣血不通。欬嗽。四肢無力。臨睡自汗不止。月經不調。久而不治。則爲骨蒸。瘵疾。童便酒各半化下。○產後鼻衄。口乾。舌黑。童便化下。○產後大小便不通。煩燥。口苦者。薄荷自然汁下。如無生的。乾的濃煎湯亦可。○產後赤白痢疾。米湯下。○產後瀉血水。濃煎棗湯下。○產後赤白帶下。阿

膠艾葉湯下○血崩漏下糯米湯下○婦人久無
子息溫酒下一日一九至三五十九決有效驗○
勒奶痛或成癰為末水調塗乳上一宿自瘥或生
搗敷上亦可○右一十九症調引歷歷有效不能
盡述用者自知其妙也

蒸臍法

四百五

治婦人月經不通或癥瘕血塊臍腹

作痛此方神効

乳香

沒藥

血結

沉香

丁香

各三錢

麝香

一錢上六味各另研

青鹽

食鹽

五靈脂

兩頭尖

各六錢四
味共為末

右各末和勻外用麝香少許安入婦人臍內次將
麵作條方圓一寸遶臍圍住安藥末於內令滿以
槐樹皮方圓一寸蓋上皮上鑽三孔用大艾炷灸
之月經即通血塊即消累用神効

紅花當歸丸

百五
五

治婦人血臟虛竭經候不調或

斷續不來或積瘀成塊腰腹刺痛肢體瘦弱

馬鞭草

半斤

劉奇奴

半斤二味共
熬膏丸藥

當歸

三兩
酒洗

赤芍藥

牛膝

去蘆
酒浸

川芎

香附

醋
炒

牡丹皮

去木

甘草

各一兩半

紅花

白芷

各七錢半

官桂

六錢

紫葳

即凌霄花

蘇木

各三兩

枳殼

炒一兩

右爲末以前膏入少糯米粉打糊爲丸如梧桐子大每服七八十丸空心濃煎紅花酒送下

濟陰百補丸

百五十六

治女人勞傷氣血不足陰陽不

和作寒作熱心腹疼痛胎前產後諸虛百損並宜

用之

香附子

一斤分四製醋酒童便

當歸

酒洗晒乾六兩

益母草

五月五日採者佳忌鐵淨末半斤

熟地黄

酒洗一

白芍藥酒炒 川芎 甘草炙各一兩 白茯苓去皮三兩

玄胡索炒二兩 人參去蘆二兩 木香不見火

白朮土炒各四兩

右爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服六七十丸
漸加至八九十丸空心米湯酒任下

按此方調脾胃補虛損極効

治赤白帶下神方百五十七

樗根白皮 香椿根白皮 苦參 香附醋炒

梔子仁炒 山茱萸去核 黃栢鹽酒炒 龜板去弦

酥炙各二兩

乾姜炒五錢

貝母去心一兩

白朮炒

當歸酒洗各一兩五錢

白芍藥酒炒一兩

右爲末酒糊爲丸如梧桐子大每服八十九空心

清米湯送下若孕婦赤白帶加蒼朮條芩川連白

芷各一兩

去乾姜檮皮貝母苦參龜板梔子爲丸服

固真湯附

治婦人赤白帶下行時臍下甚痛此方二

服卽効

人參五錢

黃芩

黃栢

白葵花各一錢

郁李仁八分

柴胡七分

陳皮去白八分

甘草炙

乾姜

炒各三分

右用水一鍾半煎七分空心服葵花白者治白帶赤者治赤帶赤白混下二花並用

按此方治氣血滯陰陽不清極効

涼血地黃湯

百五十八

婦人血崩來如山崩水湧之勢

明是血熱妄行豈可作寒論治宜清補兼升提不可驟止徐徐調理血清自歸源矣

黃芩

甘草

生

荊芥穗

蔓荊子

各七分

黃栢

知母

藁本

川芎

細辛

各六分