

药考金题库

2016国家执业药师考试

通关必做2000题

药学综合知识与技能

主编 张万金

赠

药考金题库
180元体验卡



药师在线

SIYADSHI.COM

100%解析
赠2套模拟试卷

中国医药科技出版社


2016 国家执业药师考试通关必做 2000 题

药学综合知识与技能

主 编 张万金

副主编 袁 芳

编 者 张万金 袁 芳 刘 畅 卢丽霞



中国医药科技出版社

内 容 提 要

本书由从事执业药师考前培训的权威专家根据最新版执业药师资格考试大纲及考试指南的内容要求精心编写而成。本书习题按考试指南章节编排,便于考生系统复习。习题题型包括最佳选择题、配伍选择题、综合分析选择题和多项选择题,并根据2015年执业药师考试真题各章节考试分值,对各章节习题总量和各题型比例做了合理分配。书后附有两套模拟试卷,以方便考生系统复习后自查备考。本书题量丰富,考点覆盖全面,题型与真题完全一致,是参加2016年国家执业药师资格考试考生的首选必备用书。

图书在版编目(CIP)数据

药学综合知识与技能 / 张万金主编. —北京:中国医药科技出版社,2016.3

2016 国家执业药师考试通关必做 2000 题

ISBN 978-7-5067-8148-0

I. ①药… II. ①张… III. ①药理学-药剂师-资格考试-习题集 IV. ①R9-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 020131 号

美术编辑 陈君杞

版式设计 郭小平

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编 100082

电话 发行:010-62227427 邮购:010-62236938

网址 www.cmstp.com

规格 889×1194mm $\frac{1}{16}$

印张 13

字数 382 千字

版次 2016 年 3 月第 1 版

印次 2016 年 3 月第 1 次印刷

印刷 北京九天众诚印刷有限公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978-7-5067-8148-0

定价 69.00 元

版权所有 盗版必究

举报电话:010-62228771

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

出版说明

执业药师资格制度的核心是保障职业准入人员具备良好的职业素质和能力。国家执业药师资格考试以执业药师岗位职责和实践内容为出发点，以培养在药品质量管理和药学服务方面具有综合性职业能力、具备自主学习和终身学习的态度和意识、能较好地服务公众健康的人才为目标。

为了更好地服务于考生，帮助考生应对考试，我们组织国内工作在教学一线、有着丰富考前培训经验的专家编写了这套丛书。本丛书紧紧围绕最新版国家执业药师资格考试大纲的要求，密切配合最新版考试指南，在对2015年考试真题的考点分布及题型比例、出题难度进行深入研究的基础上编写而成。力求语言规范化、试题原创性和考点全覆盖。

本丛书具有以下特点。

1. 紧扣最新考试大纲。第七版考试大纲从考试内容、重点要求、考题类型等多方面，更加强调实际应用，要求药学服务从业人员系统地掌握“药”“用药”以及“用药治病”三方面的综合知识和技能。本丛书题目的设计紧紧围绕“以用定考”这一中心原则。

2. 精选通关试题。本丛书所设题型与实际考试完全一致，包括最佳选择题、配伍选择题、综合分析选择题和多项选择题，并根据2015年执业药师考试真题中各章节所占分值比重，对各章节习题总量和题型比例做了合理配置。对重要考点，多角度出题，可帮助考生举一反三，利用联想记忆、对比记忆等方法掌握相关考点内容。

3. 精准试题解析。为了方便考生及时补救知识缺漏，我们针对每道试题均设有解析。针对难点和重点题目做了详细解析，旨在开拓考生解题思路。

4. 精编模拟试卷。书后附有两套模拟试卷，模拟考场，题型、题量与真题完全一致，以方便考生系统复习后自查备考，熟悉考试，提高实战能力。

5. 合理题量安排。本丛书各分册均设计试题2000余道，题量丰富，旨在使考生通过反复做题，从不同角度熟悉考点，提高复习效率和应试能力。

6. 全方位增值服务。考生可配套享受政策咨询、电话疑难解答、在线名师指导、精品课程免费试听等一系列增值服务。备考路上，我们伴您一路同行。

为了不断提升本系列图书的品质，欢迎广大读者提出宝贵意见，我们将在今后的工作中不断修订完善。

中国医药科技出版社

2016年2月

目录 Contents

上篇 通关试题

第一章 执业药师与药学服务	2
第二章 药品调剂和药品管理	4
第三章 用药教育与咨询	15
第四章 用药安全	24
第五章 药品的临床评价方法与应用	35
第六章 药物治疗基础知识	37
第七章 常用医学检查指标的解读	39
第八章 常见病症的自我药疗	44
第九章 呼吸系统常见疾病	59
第十章 心血管系统常见疾病	64
第十一章 神经系统常见疾病	73
第十二章 消化系统常见疾病	77
第十三章 内分泌及代谢性疾病	79
第十四章 泌尿系统常见疾病	84
第十五章 血液系统疾病	86
第十六章 恶性肿瘤	87
第十七章 常见骨关节疾病	90
第十八章 病毒性疾病	92
第十九章 妇科疾病与计划生育	94
第二十章 中毒解救	96


下篇 试题答案与解析


第一章 执业药师与药学服务	101
第二章 药品调剂和药品管理	102
第三章 用药教育与咨询	110
第四章 用药安全	116



第五章 药品的临床评价方法与应用	125
第六章 药物治疗基础知识	126
第七章 常用医学检查指标的解读	127
第八章 常见病症的自我药疗	132
第九章 呼吸系统常见疾病	144
第十章 心血管系统常见疾病	147
第十一章 神经系统常见疾病	154
第十二章 消化系统常见疾病	158
第十三章 内分泌及代谢性疾病	160
第十四章 泌尿系统常见疾病	164
第十五章 血液系统疾病	166
第十六章 恶性肿瘤	166
第十七章 常见骨关节疾病	168
第十八章 病毒性疾病	169
第十九章 妇科疾病与计划生育	170
第二十章 中毒解救	172
模拟试卷一	176
模拟试卷二	184
模拟试卷答案与解析	192

上篇
通关试题





第一章

执业药师与药学服务

一、最佳选择题

- 有关药学服务的概念,叙述错误的是
A. 提供与用药有关的服务
B. 既有直接服务,也有间接服务
C. 既有实物形式,也有信息形式服务
D. 服务于治疗性药物和预防性药物,不服务于保健用药
E. 涵盖了用药相关的全部需求
- 下列工作内容不属于药学服务范畴的是
A. 选择药物
B. 疗效跟踪
C. 书写处方
D. 调整用药方案与剂量
E. 公众健康教育
- 药学服务的对象是
A. 广大公众
B. 所有患者
C. 重症疾病患者
D. 特殊人群患者
E. 住院患者
- 药学服务的重要人群不包括
A. 慢性支气管哮喘患者
B. 流感患者
C. 合并患有心肌梗痛、高血压、糖尿病的患者
D. 新生儿患者
E. 聋哑患者
- 不属于药学服务重要人群的是
A. 肝肾功能不全者
B. 过敏体质者
C. 妊娠期妇女
D. 血液透析患者
E. 急性结膜炎患者
- 不属于药学服务特殊人群的是
A. 过敏体质者
B. 老年患者
C. 盲人
D. 特殊体质者
E. 终生用药者
- 药学服务的特殊人群有
A. 长期用药人群
B. 儿童
C. 联合用药人群
D. 需做监测的给药人群
E. 有药物不良反应者
- 作为执业药师,应具备的专业技能不包括
A. 药物警戒技能
B. 与患者沟通技能
C. 药品管理技能
D. 药历书写技能
E. 审核医生疾病诊断是否正确技能
- 与患者的沟通技巧,正确的是
A. 使用专业术语
B. 一次性提供给患者尽可能多的信息
C. 对老年患者可以适当给予宣传资料
D. 尽可能单向交流,避免患者说得过多,而影响判断
E. 观察患者表情,决定是否需要沟通
- 药历书写是药师进行规范化药学服务的一项工作,下列内容一般不作为药历书写内容的是
A. 患者基本信息
B. 用药评价
C. 临床诊断要点
D. 用药记录
E. 患者知情同意书
- 下列内容不会出现在药历上的是
A. 患者手机号码
B. 患者所患疾病
C. 患者所用药物的名称、剂量、给药途径等
D. 患者所用药物的禁忌证、适应证、主要不良反应
E. 患者用药后的疗效和不良反应
- 下列有关药历的叙述,正确的
A. 与病历相同,由医师填写
B. 药师为患者建立的用药档案
C. 是患者病危抢救时的用药记录
D. 可作为患者退药的唯一证据
E. 不能干涉医师的药物治疗方案
- 不会出现在中国药历上的内容是
A. 患者遗传史
B. 患者过敏史
C. 患者疾病诊断的实验室检查数据

- D. 对患者的用药指导
E. 药物的化学名
14. 下列哪一项不属于药学服务实施的主要内容
- 把医疗、药学、护理结合起来,让医师、药师、护士齐心协力,共同承担医疗责任
 - 既为患者个人服务,又为整个社会公众健康教育服务
 - 积极参与疾病的预防、治疗、保健
 - 指导、帮助患者合理使用药物
 - 代替医护人员制定和实施药物治疗方案
15. 药学服务的具体工作不包括
- 处方审核及处方点评
 - 参与临床药物治疗和治疗药物监测
 - 药物利用研究和评价及药学信息服务
 - 药物不良反应监测和报告
 - 对医生所开处方发现错误后,可自行决定修改并发药
16. 对慢性病患者进行长期管理与服务,以达到优化药物治疗和提高患者治疗效果的目的是,这种新发展起来的药学服务形式称为
- 药学干预
 - 药物重整
 - 药物治疗管理
 - 药物警戒
 - 不良反应监测
- ## 二、多项选择题
1. 药学服务的重要人群包括
- 慢性病患者
 - 终生用药者
 - 病情复杂患者
 - 特殊人群
 - 需要监测给药的患者
2. 药师进行药学服务应具备的专业技能包括
- 患者用药教育技能
 - 沟通技能
 - 疾病诊断技能
 - 药历书写技能
 - 药物警戒技能
3. 药师在与患者进行沟通交流时,需要注意的事项是
- 开放式提问
 - 尽可能使用专业术语
 - 适当给予宣传资料
 - 尽可能长时间交流
 - 一次性尽可能提供更多信息
4. 与患者的沟通技巧包括
- 开放式提问
 - 认真聆听
 - 尽量使用专业术语
 - 注意掌握时间
 - 正确使用微笑、手势等肢体语言
5. 国内药历推荐格式项目包括
- 基本情况
 - 病历摘要
 - 用药记录
 - 用药评价
 - 患者投诉
6. 药历的内容包括
- 病人的个人信息
 - 病历的部分摘要
 - 病人用药后的不良反应
 - 病人用药后的药效评价
 - 药物的禁忌证
7. 有关药历的描述,正确的是
- 属于专业技术档案
 - 个体化给药依据
 - 同于病历
 - 与病历无关
 - 由医生记录
8. 教学药历的内容包括
- 病人的遗传史
 - 病人的用药评价
 - 病人的疾病诊断结果
 - 学员自我总结
 - 教师对学员药历书写的评价
9. 药学服务的具体工作包括
- 处方审核
 - 静脉药物配置
 - 参与临床药物治疗
 - 治疗药物监测
 - 药学信息服务与患者健康教育
10. 执业药师在进行药学服务时,下列哪些工作属于此范畴
- 审核处方中药物的给药途径是否合理
 - 和医师共同制定个体化给药方案
 - 监测药物不良反应,有责任向国家药监局有关部门汇报
 - 进入社区为广大群众进行健康教育
 - 对病人用药后的疗效和安全性进行评价

第二章

药品调剂和药品管理



一、最佳选择题

- 关于处方的描述, 错误的是
A. 由实习医师填写 B. 患者报销的凭据
C. 具有法律性 D. 具有技术性
E. 具有经济性
- 关于处方的法律性, 描述错误的是
A. 医师具有诊断权 B. 医师具有开具处方权
C. 药师具有审核权 D. 药师具有调配处方权
E. 药师具有修改处方权
- 处方正文书写的内容是
A. 患者姓名 B. 医师签名
C. 药品通用名 D. 药师签名
E. 患者住院病历号
- 处方正文书写的内容不包括
A. 药品通用名 B. 药品剂型
C. 药品规格 D. 药品不良反应
E. 药品用法用量
- 关于处方的说法, 正确的是
A. 由医务人员开具, 药师审核、调配、核对, 作为患者用药凭证的医疗文书
B. 由执业药师开具, 药师审核、调配、核对, 作为患者用药凭证的医疗文书
C. 由注册医师开具, 药师审核、调配、核对, 作为患者用药凭证的医疗文书
D. 由实习医师开具, 药师审核、调配、核对, 作为患者用药凭证的医疗文书
E. 由注册医师开具, 护士审核、调配、核对, 作为患者用药凭证的医疗文书
- 《中华人民共和国药典》收录的处方属于
A. 法定处方 B. 医师处方
C. 协定处方 D. 普通处方
E. 急诊处方
- 药师审核用药适宜性, 不包括的内容是
A. 对于必须做皮试的药品, 审核是否注明过敏试验及结果的判断
B. 审核处方用药与临床诊断的相符性
C. 审核是否有重复给药现象
D. 审核剂型、剂量、疗程是否合理
E. 审核患者年龄是否准确
- 下列处方属于合理的是
A. 给流感患者开具左氧氟沙星
B. 咳嗽患者经实验室检查, 白细胞和 C 反应蛋白均正常, 开具阿奇霉素治疗
C. 给高血压患者开具坦洛新
D. 给 I 类手术切口患者开具头孢拉定预防感染
E. 给输尿管结石患者开具黄体酮, 注明了原因并有医生签名
- 关于处方书写要求, 错误的是
A. 处方上需要标明临床诊断结果, 特殊情况除外
B. 一张处方最多可以为 2 名患者开具药品
C. 处方当天有效
D. 处方如果涂改, 需要在涂改处有医师签名
E. 处方上须书写药品用法用量, 不可以用“遵医嘱”代替
- 一张处方所开具的药品种类(中药饮片除外), 不能超过
A. 1 种 B. 2 种
C. 3 种 D. 4 种
E. 5 种
- 下列哪种书写符合处方书写规则
A. 医生签名与药学部门备案的式样不一致
B. 开具处方完毕没有在空白处划斜线
C. 开具的药品没有分行书写
D. 药品数量用阿拉伯数字书写
E. 超剂量没有标明原因
- 处方书写的药品名称是
A. 商品名 B. 通用名

- C. 化学名 D. 专利名
E. 非专利名
13. 对食道癌患者给予顺铂、依托泊苷、氟尿嘧啶、多柔比星治疗, 该处方可定义为
A. 无适应证用药 B. 超适应证用药
C. 有禁忌证用药 D. 过度治疗用药
E. 重复用药
14. 氯苯那敏用于花粉过敏治疗时, 不宜用于
A. 伴有高血压的病人 B. 伴有青光眼的病人
C. 伴有胃溃疡的病人 D. 伴有湿疹的病人
E. 伴有荨麻疹的病人
15. 老年人服用含有盐酸伪麻黄碱的抗感冒药后, 可导致的不良反应是
A. 蛋白尿 B. 肺栓塞
C. 血压升高 D. 胃出血
E. 低血糖
16. 司来吉兰的禁忌证是
A. 尿潴留 B. 抑郁症
C. 低血压 D. 过敏性鼻炎
E. 甲状腺功能低下
17. 通常情况下, 80 岁以上老年人的用药剂量是中青年人的
A. 90% B. 80%
C. 70% D. 50%
E. 20%
18. 对于老年性高血压患者, 适宜的给药途径是
A. 静脉滴注 B. 肌内注射
C. 口服给药 D. 舌下给药
E. 栓剂
19. 下列中药和化学药联合应用中, 不存在重复用药的是
A. 新癬片+吡哌美辛胶囊
B. 曲克芦丁片+维生素 C 片
C. 脉君安片+氢氯噻嗪片
D. 消渴丸+格列本脲片
E. 珍菊降压片+氢氯噻嗪片
20. 根据《中华人民共和国药典临床用药须知》, 使用前必须做皮试的药物是
A. 红霉素 B. 氨苄西林
C. 克林霉素 D. 维生素 K₁
E. 万古霉素
21. 药物相互作用在药动学方面的影响不包括
A. 影响吸收 B. 影响分布
C. 影响代谢 D. 影响排泄
E. 影响配伍
22. 下列复方制剂中, 不具有联合增效意义的是
A. 阿莫西林-克拉维酸钾
B. 替卡西林-克拉维酸
C. 亚胺培南-舒巴坦
D. 头孢哌酮-舒巴坦
E. 氨苄西林-舒巴坦
23. 青蒿素与乙胺嘧啶、磺胺多辛联合应用的主要意义是
A. 降低毒性 B. 增强吸收
C. 减少代谢 D. 降低耐药性
E. 抑制排泄
24. 长期应用利血平后, 如果使用具有直接作用的拟肾上腺素药, 如肾上腺素、去甲肾上腺素, 可以使升压作用增强, 这一现象称为
A. 协同增效 B. 非竞争性拮抗
C. 敏感化作用 D. 受体脱敏
E. 竞争性拮抗
25. 肝素钠在用于血栓患者的溶栓治疗时, 为防止出血风险, 禁止与其合用的药物是
A. 阿司匹林 B. 普萘洛尔
C. 洛伐他汀 D. 硝苯地平
E. 硝酸甘油
26. 甲氧氯普胺与吩噻嗪类抗精神病药合用, 可以增强的毒副作用是
A. 胃肠道刺激 B. 锥体外系反应
C. 耳毒性 D. 肾毒性
E. 血液系统毒性
27. 与链霉素合用, 可以增强耳、肾毒性的药物是
A. 青霉素 B. 红霉素
C. 头孢拉定 D. 呋塞米
E. 磺胺嘧啶
28. 能够延缓胃排空, 增加其他药物吸收的是
A. 甲氧氯普胺 B. 多潘立酮
C. 莫沙必利 D. 对乙酰氨基酚
E. 阿托品
29. 可以加快胃肠道蠕动, 减少其他药物吸收的是
A. 阿托品 B. 颠茄浸膏
C. 多潘立酮 D. 丙胺太林
E. 东莨菪碱



30. 属于肝药酶诱导剂的药物是
A. 酮康唑 B. 利福平
C. 异烟肼 D. 西咪替丁
E. 阿奇霉素
31. 能够与青霉素配伍的是
A. 葡萄糖 B. 阿托品
C. 氨茶碱 D. 维生素 C
E. 氯化钠
32. 更昔洛韦与亚胺培南配伍, 容易引发的不良反应是
A. 二重感染 B. 癫痫发作
C. 粒细胞减少 D. 胃肠道刺激出血
E. 高血压
33. 阿昔洛韦与齐多夫定合用, 最常见的毒性反应是
A. 肾毒性 B. 肝毒性
C. 血液系统毒性 D. 消化系统毒性
E. 呼吸系统毒性
34. 将丙谷胺与甘草、白芍、冰片制成复方制剂, 其主要临床用途是治疗
A. 痛风 B. 支气管哮喘
C. 肝炎 D. 消化性溃疡
E. 糖尿病
35. 合用维生素 B₁₂与陈皮, 可以达到的效果是
A. 促进维生素 B₁₂的吸收
B. 抑制维生素 B₁₂的代谢
C. 加快维生素 B₁₂的排泄
D. 减少维生素 B₁₂的氧化
E. 提高人体对维生素 B₁₂的敏感性
36. 氟尿嘧啶、环磷酰胺与海藻酸钠、白芨、奋乃静、鲨肝醇做成复方制剂的目的是
A. 减轻焦虑 B. 保肝
C. 减轻胃肠道反应 D. 减轻骨髓抑制
E. 防止脱发
37. 与中成药舒肝丸药理作用拮抗, 禁止两者合用的化学药是
A. 颠茄浸膏 B. 阿托品
C. 对乙酰氨基酚 D. 甲氧氯普胺
E. 普萘洛尔
38. 蛇胆川贝液联合应用可待因, 可能导致的危险是
A. 成瘾性加大 B. 镇痛作用降低
C. 镇咳作用减弱 D. 呼吸抑制加剧
E. 便秘不良反应加大
39. 禁止与黄连上清丸合用的药物是
A. 青霉素 B. 乳酶生
C. 呋喃唑酮 D. 磺胺嘧啶
E. 四环素
40. 服用金银花制剂, 不能合用的药物是
A. 青霉素 B. 培菲康
C. 磺胺甲噁唑 D. 红霉素
E. 氨苄西林
41. 应当判定为不规范处方的是
A. 药物剂型不合理的处方
B. 适应证不适宜的处方
C. 未有医师签名的处方
D. 重复给药的处方
E. 无正当理由开具高价药品的处方
42. 属于超常处方的是
A. 早产儿未标明体重或日、月龄
B. 中药饮片和西药开在一张处方上
C. 用法、用量写“遵医嘱”、“自用”字样
D. 无正当理由不首选国家基本药物
E. 无正当理由为同一患者同时开具 2 种以上药理作用机制相同的药物
43. 下列处方属于用药不适宜处方的是
A. 开具麻醉药品使用白色处方纸
B. 适应证不适宜
C. 单张处方开具 6 种药品
D. 涂改处无医生签名
E. 无正当理由超说明书用药
44. 药师在调配下列药品时, 需要登记的是
A. 吗啡注射液 B. 双氯芬酸钠缓释片
C. 甲硝唑栓剂 D. 普萘洛尔片剂
E. 胰岛素笔
45. 药师在给阴道炎患者发放克霉唑栓剂时, 药品袋标签上应写明
A. 室温保存 B. 置于 2℃~8℃保存
C. 避光保存 D. 凉暗处保存
E. 真空保存
46. 甲硝唑的别名是
A. 安宫黄酮 B. 咳必清
C. 雷米封 D. 灭滴灵
E. 吗丁啉
47. 药品说明书上标明药品需要在“凉暗处”贮存, 指的是

- A. 10℃~30℃ B. ≤20℃
C. ≤20℃并遮光 D. 2℃~10℃
E. ≤-4℃
48. 药品说明书上标明药品需要在“阴凉处”贮存,指的是
A. 10~30℃ B. ≤20℃
C. ≤20℃并遮光 D. 2~10℃
E. ≤零下4℃
49. 单剂量调配的优点不包括
A. 便于患者服用 B. 防止服药药
C. 提高药品稳定性 D. 降低成本
E. 提高患者依从性
50. 药师在给患者的服药标签上,下列书写不合理的是
A. 每次2片 B. 每日3次
C. 每次50mg D. 服药后禁止驾车
E. 避光保存
51. 影响药品质量的环境因素不包括
A. 日光 B. 时间
C. 震荡 D. 管理人员设置
E. 空气
52. 在药品运输过程中,既要冷链运输,又要防止震荡的药品是
A. 胰岛素制剂 B. 破伤风免疫球蛋白
C. 白喉抗毒素 D. 链激酶
E. 人促红细胞生成素
53. 下列药品中,无需避光贮存的是
A. 维生素C注射液 B. 奥美拉唑注射液
C. 硝苯地平缓释片 D. 氯化钠注射液
E. 硫酸亚铁片
54. 药品仓库一般的湿度要求是
A. 10%~20% B. 20%~30%
C. 30%~40% D. 35%~75%
E. 70%~85%
55. 下列药品中,不需要避潮湿贮存的是
A. 维生素C片剂 B. 奥美拉唑肠溶片
C. 布洛芬颗粒剂 D. 氯化钠注射液
E. 罗红霉素散剂
56. 下列药品中,属于高警示药品的是
A. 咪达唑仑片剂
B. 普萘洛尔胶囊
C. 0.9%氯化钠注射液
D. 胰岛素注射液
E. 阿司匹林肠溶片
57. 下列药品中,不属于高警示药品的是
A. 25%葡萄糖注射液
B. 100ml灭菌注射用水
C. 氨茶碱静脉注射液
D. 腹膜透析液
E. 硫酸镁片剂
58. 按照药品管理要求规范,阿维A胶囊属于
A. 麻醉药品
B. 高警示药品
C. 第一类精神药品
D. 第二类精神药品
E. 兴奋剂
59. 实行“印鉴卡”管理的药品是
A. 高警示药品
B. 贵重药品
C. 麻醉药品和第一类精神药品
D. 第二类精神药品
E. 兴奋剂
60. 不需要向指定的药品经营单位采购,但需要向具有相关药品经营资质的企业购买的是
A. 高危药品
B. 贵重药品
C. 麻醉药品和第一类精神药品
D. 第二类精神药品
E. 兴奋剂
61. 第二类精神药品每张处方用量不应超过
A. 3d B. 5d
C. 7d D. 14d
E. 30d
62. 下列药品不需要凭处方购买的是
A. 可待因片剂 B. 地西洋片剂
C. 人促红细胞生成素 D. 罗红霉素胶囊
E. 维生素C片剂
63. 下列药物,不属于兴奋剂范畴的是
A. β受体阻断剂 B. 肽类激素
C. 麻醉药品 D. 药品类易制毒化学品
E. 非甾体类抗炎药
64. 对于蛋白同化激素类药物的销售记录保管,一般要求保管超过药品有效期
A. 半年 B. 1年



- C. 2年 D. 5年
E. 10年
65. 要求冷链运输管理的药品是
A. 麻醉药品 B. 高警示药品
C. 第一类精神药品 D. 生物制品
E. 第二类精神药品
66. 我国对生物制品和血液制品的管理要求, 不包括的是
A. 专人管理
B. 每批产品均要检验、审核
C. 一个单采血浆站只能与一个血液制品生产单位签约和提供原料血浆
D. 药库应设置血液待验区、合格区、不合格区
E. 储存库要求无菌
67. 关于医疗机构制剂的管理, 错误的是
A. 医疗机构不能研制生产市场上已有的品种
B. 不能生产生物制品(变态反应原除外)
C. 不能生产麻醉药品、精神药品、放射性药品
D. 不能在市场上流通销售
E. 不能调剂给其他医疗机构使用
68. 已知盐酸地卡因的冰点值为 -0.109°C , 血液冰点值为 -0.52°C , 如果配制 100ml 盐酸地卡因等渗溶液, 那么需要加入盐酸地卡因的量约为
A. 1.2g B. 2.4g
C. 3.6g D. 4.8g
E. 6.0g
69. 已知盐酸地卡因冰点值为 -0.109°C , 血液冰点值为 -0.52°C , 氯化钠冰点值为 -0.578°C , 配制 1% 盐酸地卡因等渗溶液 100ml, 需要加入氯化钠的量约为
A. 0.41g B. 0.51g
C. 0.61g D. 0.71g
E. 0.81g
70. 普鲁卡因等渗当量值为 0.21, 氯化钠等渗当量值为 0.9, 配制 1% 盐酸普鲁卡因等渗溶液 100ml, 需加入氯化钠的量为
A. 0.39g B. 0.49g
C. 0.59g D. 0.69g
E. 0.79g
71. 普鲁卡因等渗当量值为 0.21, 氯化钠等渗当量值为 0.9, 配制 1% 盐酸普鲁卡因等渗溶液 100ml, 需加入普鲁卡因的量约为
A. 1.285g B. 2.285g
C. 3.285g D. 4.285g
E. 5.285g
72. 1IU 的青霉素 G 钠盐相当于
A. $0.6\mu\text{g}$ B. $6\mu\text{g}$
C. $60\mu\text{g}$ D. $600\mu\text{g}$
E. $6000\mu\text{g}$
73. 配制 10% 葡萄糖注射液 500ml, 现用 50% 和 5% 两种浓度葡萄糖注射液混合配制, 分别需要
A. 56ml 和 444ml B. 72ml 和 428ml
C. 85ml 和 415ml D. 94ml 和 406ml
E. 106ml 和 394ml
74. 万古霉素 0.5g 溶于生理盐水 100ml 中, 每毫升相当于 15 滴, 每分钟滴数 25 滴, 滴定时间需要
A. 20min B. 30min
C. 40min D. 50min
E. 60min
75. 1U 维生素 A 相当于视黄醇当量
A. $0.344\mu\text{g}$ B. $3.44\mu\text{g}$
C. $34\mu\text{g}$ D. 3.4mg
E. 34mg

二、配伍选择题

[1~4 题共用备选答案]

- A. 第一类精神药品处方 B. 第二类精神药品处方
C. 普通处方 D. 急诊处方
E. 儿科处方

- 用淡黄色处方纸书写的是
- 用淡绿色处方纸书写的是
- 用白色处方纸书写, 右上角无标注的是
- 用淡红色处方纸书写的是

[5~6 题共用备选答案]

- A. 1 日用量 B. 3 日用量
C. 5 日用量 D. 7 日用量
E. 30 日用量

- 门诊处方一般不超过
- 急诊处方一般不超过

[7~9 题共用备选答案]

- A. qd B. qn
C. q4h D. hs
E. qh

- 每 4 小时给药的外文缩写是
- 每晚给药的外文缩写是

9. 临睡前给药的外文缩写是

[10~12 题共用备选答案]

- A. bid B. tid
C. qid D. qod
E. St

10. 每天给药 3 次的外文缩写是

11. 隔天给药 1 次的外文缩写是

12. 立即给药的外文缩写是

[13~15 题共用备选答案]

- A. Cap B. gtt
C. Inj D. Mist
E. ung

13. 注射剂的外文缩写是

14. 合剂的外文缩写是

15. 胶囊剂的外文缩写是

[16~19 题共用备选答案]

- A. im B. ih
C. iv D. ivgtt
E. po

16. 口服给药的外文缩写是

17. 肌内注射给药的外文缩写是

18. 静脉注射给药的外文缩写是

19. 静脉滴注给药的外文缩写是

[20~22 题共用备选答案]

- A. Ac B. pc
C. po D. qn
E. pm

20. 处方中“餐后给药”的外文缩写是

21. 处方中“餐前给药”的外文缩写是

22. 处方中“必要时”的外文缩写是

[23~25 题共用备选答案]

- A. 小檗碱
B. 盐酸地芬诺酯
C. 双八面体蒙脱石散剂
D. 胰酶
E. 胃蛋白酶

23. 用于治疗细菌感染性腹泻的药物是

24. 用于治疗激惹性腹泻及化学刺激所致腹泻的药物是

25. 用于治疗急慢性功能性腹泻的药物是

[26~27 题共用备选答案]

- A. 超适应证用药 B. 有禁忌证用药
C. 盲目联合用药 D. 过度治疗用药

E. 无适应证用药

26. 脂肪乳用于脂质骨髓炎属于

27. 二甲双胍用于非 2 型糖尿病减肥属于

[28~30 题共用备选答案]

- A. 便秘 B. 妊娠高血压
C. 急性皮炎 D. 经尿道行前列腺切除术
E. 水肿

28. 口服硫酸镁用于

29. 肌注硫酸镁用于

30. 湿敷硫酸镁用于

[31~33 题共用备选答案]

- A. 静脉滴注 B. 舌下给药
C. 口服给药 D. 栓剂
E. 溶液剂

31. 阴道炎轻症患者宜选用的给药剂型是

32. 有破损的湿疹轻症患者宜选用的给药剂型是

33. 稳定型心绞痛患者发作时给予硝酸甘油的适宜给药途径是

[34~37 题共用备选答案]

- A. 对乙酰氨基酚 B. 盐酸麻黄碱
C. 硫酸亚铁 D. 碳酸钙
E. 格列本脲

34. 不能与消咳宁片合用的药物是

35. 不能与速感康胶囊合用的药物是

36. 不能与健脾生血颗粒合用的药物是

37. 不能与珍黄胃片合用的药物是

[38~40 题共用备选答案]

- A. 肾功能衰竭 B. 膀胱梗阻
C. 低血糖 D. 低血钾
E. 粒细胞减少

38. 中成药含氯苯那敏会导致

39. 中成药含格列本脲会导致

40. 中成药含氢氯噻嗪会导致

[41~44 题共用备选答案]

- A. 甲氧苄啶 B. 阿托品
C. 西司他丁钠 D. 苄丝肼
E. 维生素 C

41. 与磺胺甲噁唑合用,可以起到抗菌增效作用的药物是

42. 与硫酸亚铁合用,可以促进铁剂吸收的药物是

43. 与亚胺培南合用,可以抑制肾肽酶代谢的药物是

44. 与解磷定合用,可以对抗胆碱能神经中毒兴奋症状的药物是



[45~46 题共用备选答案]

- A. 甲氧苄啶 B. 阿托品
C. 西司他丁钠 D. 克拉维酸钾
E. 卡比多巴
45. 与阿莫西林联合使用, 可以提高药物对 β -内酰胺酶稳定性的是
46. 与左旋多巴联合使用, 可以防止药物在外周被多巴脱羧酶代谢的是

[47~51 题共用备选答案]

- A. 降低抗药性 B. 降低不良反应
C. 增强敏感性 D. 相互拮抗
E. 增强毒性
47. 普萘洛尔与硝酸甘油合用的结果是
48. 青蒿素与乙胺嘧啶和磺胺多辛合用的结果是
49. 链霉素与万古霉素合用的结果是
50. 地高辛与氢氯噻嗪合用的结果是
51. 甲苯磺丁脲与氢氯噻嗪合用的结果是

[52~55 题共用备选答案]

- A. 美西律 B. 硝酸异山梨酯
C. 硝苯地平 D. 阿托品
E. 舒巴坦
52. 与普萘洛尔联用, 对室性早搏及室性心动过速治疗有协同作用的是
53. 与普萘洛尔联用, 可协同抗心绞痛, 并消除心动过缓毒副作用的是
54. 与普萘洛尔联用, 可提高降压作用, 并对劳力型和不稳定型心绞痛有较好疗效的是
55. 与普萘洛尔联用, 可消除心动过缓毒副作用的抗胆碱药物是

[56~59 题共用备选答案]

- A. 体内吸收 B. 体内分布
C. 体内代谢 D. 体内排泄
E. 药物理化配伍禁忌
56. 联合使用硫酸亚铁和环丙沙星产生的影响是
57. 联合使用青霉素和丙磺舒产生的影响是
58. 联合使用氟康唑和阿托伐他汀产生的影响是
59. 联合使用阿司匹林和格列美脲产生的影响是

[60~61 题共用备选答案]

- A. 体内吸收 B. 体内分布
C. 肝脏代谢 D. 肾脏排泄
E. 肠道排泄
60. 联合用葡萄糖酸钙片和米诺环素产生的影响是
61. 联合用罗红霉素和辛伐他汀产生的影响是

[62~65 题共用备选答案]

- A. CYP3A4 抑制剂 B. CYP3A4 诱导剂
C. CYP2C19 底物药物 D. CYP1A2 底物药物
E. CYP2D6 抑制剂
62. 茶碱属于
63. 红霉素属于
64. 利福平属于
65. 奥美拉唑属于

[66~68 题共用备选答案]

- A. 黄连 B. 金银花
C. 大蒜素 D. 甘草
E. 丹参
66. 与氢化可的松合用, 可以增强抗炎、抗变态反应药效的是
67. 与青霉素合用, 可以增强青霉素对耐药性金黄色葡萄球菌杀菌作用的是
68. 与呋喃唑酮合用, 对治疗痢疾有协同作用的是

[69~71 题共用备选答案]

- A. 大蒜素 B. 仙鹤草
C. 陈皮 D. 冰片
E. 丹参
69. 与间羟胺合用, 可以增强升压作用, 延长作用时间的中药是
70. 与链霉素合用, 可以增强链霉素抗菌活性的中药是
71. 与吡喹酮合用, 可以增强抑制日本血吸虫疗效的中药是

[72~75 题共用备选答案]

- A. 呋喃唑酮 B. 链霉素
C. 氯氮平 D. 可乐定
E. 氟尿嘧啶
72. 与珍珠层粉、野菊花、槐花米、氢氯噻嗪做成复方制剂, 可以减少用量、降低不良反应的药物是
73. 与甘草酸合用, 可降低对于第Ⅷ对脑神经毒性的药物是
74. 与石麦汤合用, 可以减少流涎不良反应的药物是
75. 与甘草合用, 既可以减少胃肠道不良反应, 又能保留抗菌作用的药物是

[76~78 题共用备选答案]

- A. 蛇胆川贝液 B. 黄连上清丸
C. 虎骨酒 D. 麝香保心丸
E. 昆布
76. 与抗心律失常药普罗帕酮合用, 可导致心脏骤停

风险的中成药是

77. 与异烟肼合用, 可导致异烟肼氧化失效的中药是
78. 与吗啡合用, 可导致呼吸抑制风险的中成药是

[79~81 题共用备选答案]

- A. 六神丸 B. 舒筋活络酒
C. 贝母枇杷糖浆 D. 麻杏止咳片
E. 黄连上清丸

79. 与氯苯那敏合用, 可增强中枢神经抑制作用的是
80. 与地高辛合用, 可增强心律失常毒副作用的是
81. 与奎尼丁合用, 可增强心脏骤停风险的是

[82~83 题共用备选答案]

- A. 阿司匹林 B. 苯巴比妥
C. 格列美脲 D. 硝苯地平
E. 甲硝唑

82. 与中药酒合用, 可加重胃肠道刺激出血毒性的药物是
83. 与中药酒合用, 可加重中枢抑制的药物是

[84~86 题共用备选答案]

- A. 胃舒平 B. 胃蛋白酶
C. 硫酸亚铁 D. 连翘
E. 蜂蜜

84. 与胰岛素合用, 影响降血糖效果的是
85. 与雄黄合用, 可使药物吸收减少的是
86. 与牛黄解毒片合用, 助消化作用减弱的是

[87~89 题共用备选答案]

- A. 普通处方 B. 不规范处方
C. 用药不适宜处方 D. 超常处方
E. 麻醉药处方

87. 为高血压患者开具坦洛新, 该处方属于
88. 为患者输液, 同时开具了青霉素和碳酸氢钠, 该处方属于
89. 为急诊患者开具 7 日用量的感冒药, 该处方属于

[90~91 题共用备选答案]

- A. 不规范处方 B. 用药不适宜处方
C. 超常处方 D. 普通处方
E. 麻醉药品处方

90. 未使用药品规范名称开具药品的处方属于
91. 药物之间有配伍禁忌的处方属于

[92~94 题共用备选答案]

- A. 心得安 B. 消心痛
C. 舒喘灵 D. 痢特灵
E. 消炎痛

92. 沙丁胺醇的别名是

93. 普萘洛尔的别名是

94. 呋喃唑酮的别名是

[95~97 题共用备选答案]

- A. 心痛定 B. 氟哌酸
C. 病毒唑 D. 黄连素
E. 胃舒平

95. 硝苯地平的别名是

96. 小檗碱的别名是

97. 复方氢氧化铝的别名是

[98~99 题共用备选答案]

- A. $-5^{\circ}\text{C} \sim 10^{\circ}\text{C}$ B. $-2^{\circ}\text{C} \sim 4^{\circ}\text{C}$
C. $2^{\circ}\text{C} \sim 10^{\circ}\text{C}$ D. $10^{\circ}\text{C} \sim 30^{\circ}\text{C}$
E. $20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$

98. 冷处所指温度是

99. 室温所指温度是

[100~102 题共用备选答案]

- A. 氯化钠注射液 B. 氨茶碱注射液
C. 氯化钾注射液 D. 利巴韦林颗粒剂
E. 巴曲酶注射液

100. 需要低温并避光保管的药品是

101. 需要防潮的药品是

102. 需要避光保存的平喘药是

[103~105 题共用备选答案]

- A. 青霉素粉针剂 B. 胰岛素注射剂
C. 奥美拉唑肠溶片 D. 甲硝唑栓剂
E. 布洛芬混悬液

103. 为了保持药品形状, 可以冷冻贮存的药品是

104. 需要在冷处贮存, 但不宜冷冻的药品是

105. 需要避光贮存, 但无需冷藏的药品是

[106~108 题共用备选答案]

- A. 地西洋片剂 B. 艾司唑仑静脉注射剂
C. 浓氯化钾注射液 D. 凝血酶冻干粉
E. 阿片酊

106. 既要按照高警示药品, 又要按照第二类精神药品管理的药品是

107. 既要按照高警示药品, 又要按照麻醉药品管理的药品是

108. 既要按照高警示药品, 又要按照生物制品管理的药品是

[109~111 题共用备选答案]

- A. 顺铂注射剂 B. 胺碘酮注射液
C. 丙泊酚注射液 D. 维库溴铵注射液
E. 吗啡注射剂