

廣州中學院
圖書館
圖

評琴書屋葉案括要目錄

卷三

汗

脫

脾胃

木乘土

腫脹

卷四

積聚

痞

噎膈反胃

噫噎

嘔吐

吐衄

不食

腸痺

便閉

肺痺

胸痺

哮

喘

呃

疸

風

寒

風溫

溫熱

暑

評琴書屋葉案括要卷三

番禺潘名熊蘭坪纂

男

龍章雲臺
驚章翅霓

校刊

汗

脈細自汗。

下體怯冷

衛陽式微。於朮炙草。附子黃芪煨薑南

棗六味煎之。

綿黃芪

三錢

熟於朮

二錢

南棗肉

三錢

熟附子

七分

炙甘草

五分

煨老薑

一錢

勞傷營衛。汗熱相將。

脈弦大身時熱汗出

經云勞者溫之最良。

經云

勞者溫之桂枝

湯名桂芍生薑草棗

補血

湯名黃芪當歸

加減二湯

嫩黃芪

錢三

桂枝木

錢一

炙草

分五

南棗肉

錢三

當歸

錢一

白芍

錢一

煨薑

錢一

陽虛汗泄亦屬勞傷。朮芪防草同補胃陽。

黃芪

錢三

白朮

錢二

防風

分六

炙草

分五

勞傷心神氣泄爲汗。生脈四君。

生脈散合四君子湯

見於梅案

人參

麥冬

五味

於朮

茯苓

炙草

案云案牘積勞神困食減五心汗出非因實熱乃火

與元氣勢不兩立。此即內經所謂少火生氣壯火食氣氣泄爲熱爲汗。

當治在無形。以實火宜清。虛熱宜補耳。議用生脈四

君子湯。

鎮攝汗止。參神芍美。草棗龍骨。送五味子。

人參男

雲茯神

生白芍

生龍骨

熟棗仁

炙甘草

煎藥送吞蒸熟北五味子三十粒。

案云陽明胃弱致厥陰來乘。當丑時澱然汗出少寐

多夢。

附做先生法

脫

治驗案一段

厥逆脈絕。陽微欲脫。人參附薑。胆汁冲啜。

人參

淡附子

淡乾薑

豬胆汁

冲服

服藥後。脈微續者生。暴出者死。

案云。四肢冷汗。氣喘。胸腹脹悶。都是陽微欲脫。脈絕。厥逆。勉與通脈。四逆湯。回陽驅陰以挽之。

絡血洞下。昏亂無神。子丑防脫。陰陽離根。參芪朮附。五味相因。

人參

黃芪

於朮

附子

五味

案云絡血洞下昏亂無神脈診三五參差陰陽已屬
離根恐壞於子丑二時真氣不相維續勉用大封固
一法先生云大封固者參附固守腎氣朮附固守
脾氣芪附固守衛氣也佐五味又欲固攝其陰陽無
陰無以附也

陽飛欲脫油汗神昏參附童便接續真元

熟川附子

人參

童便

沖服

案云遺尿目瞑口開面亮汗油陽飛欲脫無藥力可

挽擬參附湯法加入童便圖元真接續耳。又云子

丑爲陰陽交界時正不相續復現脫象用兩攝陰陽

方用參附湯加五味子又云陽回汗止神醒無如陰液欲涸

心熱渴飲轉救胃汁方用人參麥冬五味茯苓建蓮

昏躁妄言神氣消索陰陽不交五液枯脫象欲作三才

湯加磁硃金箔

人參一錢天冬半錢硃砂二分

熟地五錢磁石五錢金箔三張

案云議三才湯以滋水源加磁石硃砂金箔以甯神

志。

神迷。嚙語。陰陽相離。脈大不斂。欲脫之機。參神小麥。阿膠炒之。龍骨牡蠣。鎮固相宜。

人參

錢一

清阿膠

錢三

生龍骨

錢五

茯神

錢三

小麥仁

錢五

生牡蠣

錢五

案云。救陰無速效。急急鎮固。陰陽冀其甦息。

余治陰竭症。欲救陰以維陽。多用此二方法。因竊加人分錢。上方或獨煎三才。用磁硃丸錢零同金箔研勻。沖服。真阿膠不必炒。用錢零同參另燉沖服。

固陽攝陰附子人參龍牡五味暴脫治堪

土木人參

錢一

生龍骨

錢五

五味子

錢一

熟川附子

錢四

生牡蠣

錢五

此方列中風案中但脫症最險要不嫌重複使學醫者觸目留心

羊城河南徐耕南少尹親邀診其堂叔據述叔年六

十因納妄喜補養近日酷暑天氣亦連日食酒燉雄

雞芪燉綿羊加以參茸補酒偶外遊身即發熱醫謂

外感暑熱內伏熱滯頻進大劑苦寒服之無功反增

胸脘脹悶呃逆嘔惡。叔家人不明。仍信熱滯之論。余因求君診之。余隨之往診。按其脈浮虛無神。重按無有。余曰。氣虛中寒。大非熱症。家人訝余言。曰。食燥熱起病。何致寒中。余曰。寒藥便能寒中。又曰。病起身熱。余曰。身熱豈必服苦寒。據述感暑起病。凡虛人感暑。初病與以清暑益氣。或補中益氣。一服熱或解矣。又曰。中寒身應冷。何故反熱。此一問却妙。古人有陽虛生外寒說。余曰。臟腑一派陰寒。拒陽於外。而真陽無所歸。此所謂重陰則熱也。故症有周身寒冷。而偏服苦寒藥者。陽盛隔

陰是也。周身熱熾而反服燥熱藥者。陰盛隔陽是也。余見其家人不甚見信。欲辭去。耕南苦留擬方。余曰。惡悶呃逆。脫樣顯然。恐非余藥力所能挽。交戌亥陰盛時。臟陰益肆。余深慮其肢冷汗泄而陽脫矣。家人聞余言始懼。亦誠求訂方。余卽將先生此方加入分錢與之。原方無分錢家人畏人參。余因以北麗參五錢代之。苦留余宿。余因止於耕南之家。初交申復邀診。謂漸覺肢冷神昏。余曰。午後便屬陰分。卽慮其汗泄脫矣。藥已服否。曰藥剛煎就。求先生再診服之。余診其

脈漸散。余曰：脈散四肢冷，亡陽汗至矣。宜冲入童便。

一杯急進服，以挽之。藥將服，汗已漸泄。服後數刻，汗

漸止，神漸清。病者再索藥飲，謂服此藥，脹悶已無。胸

腹暢甚。

久服苦寒，乍進溫熱，中寒者胸腹安得不暢快。

余仍遵先生方，附子

改用五錢。麗參仍用五錢，另燉土木參一錢，冲服。余

曰：戊亥至陰之時，今四肢尚冷，仍慮其復脫，當速煎

服之。交戌再進飲，手足漸溫，旋即熟睡。明早診脈，漸

有根柢，但口微渴，思飲。轉方議兼顧陽明胃陰，土木

參、附子、麥冬、木瓜各一錢，北麗參、建蓮肉、南棗肉各

三錢茯神一錢半。三帖諸恙畧安。後將芪朮歸杞等
參入加減而獲愈。

先生於脫症治法。回陽中必佐陰藥。攝陰內必兼顧
陽氣。卽此五症方法。足知其要旨。

凡陽脫於上。陰脫於下。陽脫如中風眩暈嘔吐喘
汗多亡陽之類是也。陰脫如瀉利崩漏胎產下多亡
陰之類是也。內閉外脫如痧脹乾霍亂痞脹痙厥神
昏不醒臟腑室塞之類是也。至難經謂脫陰者目盲
脫陽者見鬼。脫而至此。治亦難矣。醫者須爲預防也。

脾胃

胃虛少納。土不生金。音低氣餒。調養胃陰。沙參玉竹冬

豆桑甘。胃陰虛

生扁豆。一兩不研

白沙參。三錢

鮮桑葉。二錢

大麥冬。三錢連心

明玉竹。二錢

細甘草。四分

余治溫邪暑熱。或吐血。或一切燥熱症。因熱傷脾胃

津。致病後納食少者。用先生此方法。必應。渴者多煎

代茶。用南棗肉四錢。代甘草。雪梨乾亦佳。

九竅不和。都屬胃病。不食不飢。甘涼乃應。冬芍草麻。蔗漿相稱。

大麥冬

錢一

火麻仁

錢二

小甘草

五分水炙黑

生白芍

錢二

臨服冲入青甘蔗漿一杯

案云。胃為陽土。喜柔潤。惡剛燥。四君異功等。竟是治

脾之藥。

脾為陰土。喜燥惡潤。

胃宜通。即是補。甘涼濡潤。胃氣下

行。則有效驗。

口渴有痰。

脈數

胃陰未足。冬豆沙參。粳米草斛。

肺胃陰虛

炒麥冬

生扁豆

金釵斛

北沙參

白粳米

生甘草

知飢少納。胃陰有傷。麥冬、桑葉、神斛、蔗漿。

大金斛

大麥冬

生桑葉

雲茯神

臨服冲甘蔗漿一杯

能食少運。溫通脾陽。苓朮、益智、乾薑。

脾陽虛

生白朮

一錢半

結雲苓

三錢

乾薑

一錢

淡川附子

一錢

益智仁

一錢

薤白

一錢

上一症。脾陽不病。故知飢。胃陰有傷。故少納。此一症。

胃陰不病。故能食。脾陽有病。故少運。蓋納食主於胃。