

御纂醫宗金鑑卷三十

刪補名醫方論卷五目錄

礞石滾痰丸

指迷茯苓丸

金匱枳朮湯

桂苓甘朮湯

疏鑿飲子

葶藶大棗瀉肺湯

蘇葶定喘丸

舟車神祐丸

實脾飲

清脾飲

芍藥湯

溫脾湯

大黃附子湯

越鞠湯丸

四磨飲

備急丸

磁硃丸

石斛夜光丸

洗刀散

失笑散

獨聖散

大黃虜蟲丸

仙方活命飲

托裏消毒散

御纂醫宗金鑑卷三十

刪補名醫方論卷五

礞石滾痰丸

治實熱老痰之峻劑虛寒者不宜服

黃芩 八兩

大黃 八兩
酒蒸

沉香 五錢
忌火

礞石

一兩煅消煨過
理地內七日用

右四味爲細末水丸川椒大量人大小用之用溫水一口

送過咽卽仰臥令藥徐徐而下半日不可飲食勿起身行

動言語待藥氣自胃口漸下二腸然後動作飲食服後喉

間稠黏壅滯不快此藥力相攻故痰氣泛上也少頃藥力

至而漸逐惡物入腹下腸效如響應

指迷茯苓丸 治中焦停痰伏飲

半夏

二兩製

茯苓

一兩

枳殼

五錢

風化消

二錢半

右四味薑汁糊爲丸

註

經曰飲入於胃游溢精氣上輸於脾游者運行也溢者滲

溢也輸者輸布也精氣者水化之精氣也言入於胃運行

水化之精氣滲溢於腸胃之外而上輸布於脾也又曰脾

氣散精上歸於肺言水之清者上升猶天之雨露也又曰

通調水道下輸膀胱言水之濁者下降猶地之江河也此

皆言水自濁化清由府輸藏自清分濁由藏輸府水之運
行循環也又曰水精四布五經並行言水發源於脾周布
四藏並行五經也此皆言水內養藏府外滋百骸水之變
化精微也如是者何痰之有若飲食失度不和於中水精
不滲溢於外直下走大小腸而爲泄瀉矣若三焦失運氣
不蒸化水之清者不升水之濁者不降精化爲水則內停
作脹外泛作腫上攻喘呼下蓄淋瀝矣若上焦氣不清肅
不能輸布留於胸中水之精者悉變爲濁陽盛煎灼成痰
陰盛凝蓄爲飲也故治痰者以清火爲主實者利之虛者
化之治飲者以燥濕爲主實者逐之虛者溫之所以古人

治飲有溫補之法而治痰則無之也王隱君製礞石滾痰
丸治老痰一方用黃芩清胸中無形諸熱大黃瀉腸胃有
質實火此治痰必須清火也以礞石之燥悍此治痰必須
除濕也以沉香之速降此治痰必須利氣也二黃得礞石
沉香則能迅掃直攻老痰巢穴濁膩之垢而不少留滾痰
之所由名也若陽氣不盛痰飲兼作又非此方所宜當以
指迷茯苓丸合而治之用半夏燥濕茯苓滲濕風消軟堅
枳殼利氣別於二陳之甘緩遠於大黃礞石之峻悍殆攻
中之平劑歟

金匱枳朮湯

治心下鞅如大盤邊旋如杯水飲所作

枳實

七枚

白朮

二兩

右二味以水五升煮取三升分溫三服腹中鞅即散

註

心下胃之上脘也上脘結鞅如盤邊旋如杯謂時大時小
水氣所作非有形食滯也用枳實以破結氣白朮以除水
濕溫服三服則腹鞅結開而鞅消矣李杲法仲景以此方
倍白朮是以補為主也此方君枳實是以瀉為主也然一
緩一急一補一瀉其用不同只此多寡轉換之間耳

桂苓甘術湯

怡心下有痰飲胸脇支滿目眩又曰短氣有微飲當從小便去之桂苓甘術湯主之腎氣丸亦主之

茯苓

四兩

桂枝

三兩

白朮

三兩

甘草

三兩

右四味以水六升煮取三升分溫三服小便則利

集註

趙良曰靈樞謂心胞絡之脈動則病胸脇支滿者謂痰飲

積於心胞其病則必若是也目眩者痰飲阻其胸中之陽

不能布精於上也茯苓淡滲逐飲出下竅因利而去故用

以爲君桂枝通陽輸水走皮毛從汗而解故以爲臣白朮

燥濕佐茯苓消痰以除支滿甘莖補中佐桂枝建土以制
水邪也夫短氣有微飲此水飲停呼吸不利而然也金
匱並出二方妙義益彰呼氣之短用苓桂朮甘湯之輕清
以通其陽陽化氣則小便能出矣吸氣之短用腎氣丸之
重降以通其陰腎氣通則關門自利矣

按

風水陽水也石水陰水也陽水多實陰水多虛陽水在上
故多喘陰水在下故多滿所以治陽水用散用攻治陰水
用溫用補然陰中必有陽此方治陰水之在陽而上者也
腎氣丸治陰水之在陰而下者也於此推之陽中亦必有
陰故有小青龍湯五苓散之治法也今舉世不分陰陽虛

實皆以金匱腎氣湯治之。不效終不改轍。每至吐血而死。良可嘆也。

蔬鑿飲子

治遍身水腫喘呼口渴大小便秘

羌活

秦艽

檳榔

大腹皮

商陸

茯苓皮

椒目

木通

澤瀉

赤小豆等分

加薑皮水煎服

註

經曰三焦者決瀆之官水道出焉若水飲阻於內風寒束
於外則三焦之氣化不行上焦之如霧中焦之如漚同爲
下焦之如瀆也以致水氣外泛皮膚作腫內停腹裏作脹
上攻喘咳嘔逆下蓄小便不利種種諸證而治法總不外
乎表裏也小青龍湯真武湯越婢湯五苓散疏鑿飲子五
方皆治有水氣兼表裏證之藥也小青龍湯治表裏寒實
中有水氣真武湯治裏有虛寒中兼水氣二證俱內不作
脹外不作腫故一以麻桂輩散寒以行水一以薑附輩溫
寒以制水也越婢湯治表裏實熱中有水氣五苓散治表
裏虛熱中有水氣故一以麻黃石膏散膚之水清肌之熱

以消腫也一以桂苓木澤解肌表熱利所停水以止吐也
疏鑿飲子治表裏俱實者偏寒熱而水濕過盛遍身水腫
喘脹便秘者故以商陸爲君專行諸水佐羌活秦艽腹皮
苓皮薑皮行在表之水從皮膚而散佐檳榔赤豆椒目澤
瀉木通行在裏之水從二便而出上下內外分消其勢亦
猶神禹疏鑿江河之意也至於越婢湯加半夏者因喘氣
上逆用之降逆也加附子者因汗出惡風散表固陽也小
青龍湯加石膏者因喘而煩燥用之兼清胃熱也五苓散
以朮桂易滑石阿膠名豬苓湯專清陰兼治水也真武湯
去生薑加人參名附子湯專溫陽不治水也由此可知仲

景用方於羣溫劑中加以大寒之品大寒劑中加以辛熱之品去桂枝加滑石則不走外去生薑加入參則不治水其轉換變化神妙如此拘拘之士不足語也

葶藶大棗瀉肺湯

治肺癰喘不得臥及水飲攻肺喘急者

葶藶

一兩

大棗

十枚

以水五鍾先煮棗三鍾去棗內葶藶煮取一鍾半頓服弱

者減服戒鹽醬

蘇葶定喘丸

治飲停上焦攻肺喘滿不得臥面身水腫小便不利者

苦葶藶子

研泥

南蘇子

研泥

各等分合均用棗肉爲小丸陰乾磁罐盛之恐滲去油性減去藥力每服三錢於夜三更時白湯下以利四五次爲度利多則減服之利少則加服之次日身軟則隔一日或隔二日服之形氣弱者先減半服之俟可漸加戒鹽醬服之卽奏奇功如不嚴戒一切鹹物卽對證用藥萬無一生

舟車神祐丸

又名淨府丸

治水腫水脹形氣俱實

黑壺牛

四兩炒

大黃

二兩酒浸

甘遂

一兩麴裹煨

大戟

一兩
麪裏服

芫花

一兩
醋炒

青皮

一兩
炒

橘紅

一兩

水香

五錢

檳榔

五錢

輕粉

一錢

右爲末水丸每服五分五更白滾水下大便利三次爲度

若一二次不通利次日仍服或六分七分漸加至一錢若

服後大便利四五次或形氣不支則減其服三分二分俱

可或隔一二三日服一次以愈爲度甚者忌鹽醬百日

註

葶藶大棗湯蘇葶定喘丸舟車神祐丸三方皆治腫脹之

劑然葶藶大棗湯治水停胸中肺滿喘急不得臥皮膚浮

腫中滿不急者故獨用葶藶之苦先瀉肺中之水氣佐大

棗恐苦甚傷胃也蘇葶定喘丸卽前方加蘇子以降氣氣
降則水降氣降則輸水之上源水降則開水之下流也舟
車神祐丸治水停諸裏上攻喘咳難臥下蓄小便不利外
薄作腫中停脹急者故備舉甘遂大戟芫花牽牛大黃直
攻水之巢穴使從大小二便而出佐青皮陳皮木香以行
氣使氣行則水行腫脹兩消其尤峻厲之處又在少加輕
粉使諸攻水行氣之藥迅烈莫當無微不入無窮不達用
之若當功效神奇百發百中然非形實或邪盛者不可輕
試苟徒利其有刳病之能消而旋腫用者慎之