

赤水玄珠全集

冊十

卷十一

婦科

胎前

卷十二

婦科

妊娠

卷十三

婦科

產後

赤水玄珠婦人門第二十一卷目錄

小便出血

陰腫

陰痒

陰挺下脫

陰瘡

交接輒血出痛

胎前惡阻痰逆

胎動不安

胎漏下血

胎氣上逼

妊娠心腹痛

妊娠腰背痛

妊娠小腹痛

妊娠心腹脹滿

妊娠數墮胎

胎不長

墮胎血下不止

未足月欲產

過期不產

妊娠欬嗽

妊娠吐血衄血

丁煩

赤水玄珠婦人門第二十二卷目錄

妊娠煩躁口乾

風痙子癇

妊娠癥癓

妊娠胎

妊娠不語

傷寒熱病防損胎

妊娠陽寒

妊娠時氣

過時熱病

熱病胎死腹中

妊娠癟疾

妊娠泄瀉

小便不通名曰轉脬

大小便不通

妊娠遺尿

子淋

胎水腫滿

妊娠尿血

孕癰

腹內鍾鳴

滑胎方法

十產論

產難方論

交骨不開產門不閉

下死胎方

產難生死脉訣

胞衣不出

狂言譖語

產後顛狂

產後血暈

產後不語

卷之三

赤水玄珠婦人門第二十三卷目錄

產後乍見鬼神

中風恍惚

虛汗不止

心神驚悸
虛極生風
汗多變症

產後中風
遍身疼痛

口噤腰背反張
四肢筋攣

產後腰痛

產後寒疝腹痛

產後腹痛兒枕痛
產後兩脇脹痛

產後血瘕

虛煩發熱

產後血渴

產後乍寒乍熱

產後瘧疾

嘔吐腹脹

氣急喘促

口鼻黑鼻衄
四肢浮腫

月水不通

赤白痢

腹痛泄瀉

大小便不通

大便秘滯

產後諸淋

產後遺糞

小便不禁

小便不閉

小便出血
乳少或止

玉門不閉

小便不出

婦人繭唇

赤水玄珠婦人門第二十一卷

小便出血

新安生生子孫一奎著輯

良方曰心主於血通行經絡循環臟腑得寒則凝滯得熱則妄行失其道則溢滲於脬則小便出血也

薛氏曰前症肝經血熱者加味逍遙散怒氣血傷者調送血餘丸若肝經風熱用前散送子芩丸氣血俱虛者八珍散送血餘丸嘗梁積熱者清胃散用槐花甘草風熱傷胃者四君子加防風枳殼胃虛不能攝血者補中益氣鬱結傷脾不能攝血者濟生歸脾湯

一婦小便出血服四物蒲黃之類更加發熱吐痰加芩連之類又飲食少思虛症蜂起肝脉弦而數脾脉弦而緩此因肝經風熱爲沉陰之劑脾傷不能統血發生諸臟而然也用補中益氣六味地黃丸而痊

蒲黃鹿茸散 治勞損尿血發熱內熱或寒熱往來口乾作渴 蒲黃炒鹿茸炙

當歸 生地 葵子炒續斷酒炒各等分 爲末每服二錢酒調日三服

髮灰散 起居所傷小便尿血或忍尿脬轉脅下急痛小便不通又治肺疽心胸內崩吐血舌上出血俱妙本草云能療瘀血通關利水道破癰瘕癰腫狐疝刺痛疽雜瘡療脬轉通大小便止咳嗽鼻衄 右每服二錢米醋湯調下

生地黃散 血熱尿血 生地二錢 黃芩炒五錢 阿膠炒側柏葉炒各一錢 右水煎食前服

當歸散 血分熱尿血 川歸 羚羊角屑 赤芍各五分 刺薊葉一錢 生地一錢

右水煎服

又方 治血分有熱生地黃搗汁每用一小盞日三服

又方 治血分熱尿血用炒蒲黃末每以二錢溫酒下

鹿角膠散 鹿角膠炒爲末二兩作二服長流水調妙

陰腫

良方曰陰腫因胞絡素虛風邪客之乘于陰部血氣相搏故也

薛氏曰氣血虛弱補中益氣湯肝經濕熱龍胆瀉肝湯又當與陰痒陰挺陰冷相參

而治

又云一婦陰中腫悶小便澁滯兩脇作腫內熱晡熱月經不調時或寒熱此因肝經鬱怒元氣下陷濕熱壅滯朝用歸脾湯加柴胡升麻解鬱結補脾氣升元氣夕用加味道遙散清肝火生肺血除濕熱各數劑諸症悉愈又用四君芎歸丹皮調補肝脾而經水如期

菖蒲散 治月水澁滯陰戶腫痛 菖蒲 當歸炒各一兩秦瓦二兩 右每服五錢

入葱白水煎服

白礬散 治陰腫堅痛 白礬五錢 甘草五分 大黃一兩 右爲末水調如棗大綿

裹內陰中一日兩換以愈爲度

陰痒

良方曰陰痒爲三虫在腸胃之間因臟虛而蝕經則陰中痒甚則陰中痛也
生生子曰前症亦有虛者古人有用人參一兩煎湯服之而愈予曾治一宦婦年廿
一疹出未彌月而犯房事熱因下陷陰中痒甚每一發神魂颺然兩手抓壁口中
咬物鮮血淋漓爪脫肉破而不遑顧七日肌肉如削諸洗插方歷試無功作虫治
尤劇欲懸梁求死予爲籌之乃虛熱陷入至陰當從陰引陽以黃芩六錢甘草二
錢防風一錢柴胡二錢水煎食前服之其疾頓止此引金伐木之法也

薛氏曰前症屬肝經所化當用龍胆瀉肝湯逍遙散以主其內外以桃仁研膏和雄
黃末或雞肝內陰中以制其虫

一婦胸膈不利內熱作渴飲食不甘肢體倦怠陰中悶痒小便赤澁此鬱怒傷肝脾
所致用歸脾湯加山梔而愈復因怒患處并小腹脹痛用小柴胡加芎歸山梔芍
藥痛止用山梔入逍遙散而痊又因勞役患處腫脹小便仍澁用補中益氣加山
梔茯苓丹皮而瘳

一方 新桃葉搗綿裹內陰中一日三易

大黃散

治陰痒 大黃微炒

黃芩

黃芩炙各五兩

赤芍

玄參

蛇床子

山茱萸

爲末酒調服二錢

又方

杏仁燒灰乘熱綿裹納陰中日二易之

又詩曰

玉戶生瘡時痛痒皆因房色損其元黃葱水洗一三次杏仁燒灰油調瘡

加麝香尤妙

又方 鯽魚胆擦之妙

陰挺下脫

良方曰婦人陰挺下脫或因胞絡傷損或因分娩用力所致

薛氏曰前症當升補元氣爲主若肝脾鬱結氣虛下陷用補中益氣湯若肝火濕熱

小便澀滯龍胆瀉肝湯

一婦陰中突出如菌四圍腫痛小便頻數內熱晡熱似痒似痛小便重墜此肝脾鬱結蓋肝火濕熱而腫痛脾虛下陷而重墜也先以補中益氣加山梔茯苓車前子青皮以清脾火升脾氣更以加味歸脾湯調理脾鬱外以生豬脂和藜蘆末塗之而收

一婦陰中挺出五寸許悶痛重墜水出淋漓小便澀滯夕與龍胆瀉肝湯分利濕熱朝與補中益氣湯升補脾氣諸症漸愈再與歸脾湯加山梔茯苓川芎黃柏間服調理而愈後因勞役或怒氣下部濕痒小水不利仍用前藥即愈

一方 治陰挺下脫 當歸 黃芩各二兩 牡蠣二兩半 蝦皮一兩炙

赤芍兩半

右爲末每以二錢食前溫酒調下米飲亦可

治陰挺長出玉戶數寸者疼痛不可忍飲食不進用前方治其內仍以 大黃

山茨姑 石羔 牡蠣 乳香 爲細末水調揣熟捏作條子如中指大陰乾

插入玉戶其痛即止

陰瘡

薛氏曰此症乃七情鬱火傷損肝脾濕熱下流其外症陰中突出如蛇如菌如雞冠或生虫溫痒或潰爛出水或腫悶墜痛其內症體倦內熱經候不調或飲食無味哺熱發熱或胸脇不利小便痞脹或赤白帶下小水淋漓其治法腫痛者四物加柴胡丹皮山梔胆草濕痒者歸脾湯加柴胡山梔丹皮淋漓者龍胆瀉肝湯加白朮丹皮潰腐者逍遙散山梔川芎腫悶墜痛者補中益氣湯加山梔丹皮佐以外治之法

一婦素性急陰內痛小便赤澀怒而益甚或發熱或寒熱此肝經濕熱所致用芎歸炒梔柴胡芍尤丹皮澤瀉炒芍車前炒連甘草數劑漸愈乃去黃連澤瀉又數劑全愈

一婦臍腹上下并玉戶遍生濕瘡狀如馬爪瘡他處並無熱痒而痛大小便澀出黃汁食減身面微腫衆作惡瘡治反劇愈痛急令洗去乃用馬齒莧四兩青黛一兩同搗爛敷瘡上即時痒止痛定而熱亦退仍服八政散日三服分散客熱每敷藥僅得一時久藥已乾燥再塗新濕藥又安凡如此二日僅減三之一五日減三之二自此二十日全安緣此婦嗜酒貪啗魚蟹發風之物而中下焦蓄風熱之毒氣當作腸癰內痔等疾后當禁酒及發毒之物

一方 治玉戶生瘡 杏仁燒存性 雄黃 明礬各五錢麝香一錢二分 又方 飛丹研極細生桐油調搽二三日効

交接輒血出痛

右爲末敷之

薛氏曰一婦每交接便血出作痛此肝火動脾而不能攝血用補中益氣濟生歸脾二湯而愈若出血過多而見他症但用前藥調補肝脾

千金方 療交接血出 伏龍肝 桂心等分 爲末每服一錢酒調下

胎前惡阻及痰逆不食

惡阻者謂嘔吐恶心頭眩惡食擇食是也脉息和順但覺肢體沉重頭目昏眩好食酸酸甚者或作寒熱心中憤悶嘔吐痰水不能支持古謂之子病由胃氣怯弱中脫停痰之所致也

薛氏曰脾胃虛弱嘔吐不食用茯苓半夏湯蓋半夏乃健脾化痰滯之主藥也痰涎壅滯飲食少思胎氣不安爲必用之藥須倍加白朮然半夏白朮陳皮砂仁善能安胎氣健脾胃也予嘗用之驗甚若兼氣惱更加柴胡因風寒須用參蘇飲

生生子曰前症亦有因火者故丹溪用抑青丸前人亦有用濟生竹茹湯者予歷歷見爲火症者多寒者間而有之亦有愈治而愈逆者便當勿藥待之俟胃氣和當自瘳矣

茯苓半夏湯 妊娠脾胃虛弱飲食不化嘔吐不止 半夏炮炒黃 陳皮各一錢

白茯苓二錢 砂仁炒一錢 炙甘草五分 姜棗烏梅水煎服二帖后用茯苓丸

茯苓丸 妊娠煩悶頭暈聞食吐逆或胸腹痞悶 赤茯苓 人參 桂心 炮姜

半夏泡炒黃 橘紅各一兩 白朮炒葛根 甘草炙枳殼炒各二兩 右蜜丸梧

子大每服五十丸米飲下日三服

白朮湯 胃虛惡阻吐水甚至十餘日粥湯不入 白朮炒一錢 人參五分 丁香

炙甘草各一分 右姜水煎服

保生湯 妊娠惡阻少食嘔吐或兼吐瀉作渴

人參一錢 炙甘草 白朮炒香附

烏梅 橘紅各五分 右姜水煎服

仲景乾姜人參半夏丸 治妊娠嘔吐不止 乾姜 人參 半夏等分

爲末姜

汁糊丸梧子大米飲下十日三服

歸原散

惡阻嘔吐不止頭痛全不入食諸藥無效 人參 甘草 川芎 當歸

芍藥

丁香各五錢 茯苓 白朮 陳皮各一兩半 桔梗炒枳殼炒各二兩半

半夏 泡炒黃一兩

右每服五錢加姜六片棗一枚水煎服 已上五方治寒痰

惡阻之劑也

竹茹湯

惡阻嘔吐不下食 青竹茹 橘紅各二兩生姜 茯苓各四兩 半夏五兩

右水六升煮取二升半分三服

人參橘皮湯

惡阻嘔吐痰水 人參 橘皮 白朮 麥冬各一兩 甘草二錢

厚朴製

白茯苓各五錢 右每服五錢加青竹茹一錢生姜三片水煎服

妊娠嘔吐痰水不食

生薑根一兩 橘紅七錢 生姜一兩 檳榔三錢 右作三次水

煎服

妊娠惡食心中煩憤熱悶嘔吐

竹茹 麥冬各二兩 前胡二兩 橘紅一兩蘆根一握

水一大升煮半升作二次食前服 已上四方治熱痰惡阻之劑也

羅太無半夏茯苓湯 惡阻心中憒悶頭目眩暈四肢怠倦百節煩痛胸膈痰逆嘔

吐惡心嫌聞食氣好噉酸鹹多臥少起全不進食先服此湯次服前茯苓丸

半夏泡炒黃一兩二錢

赤茯苓

熟地黃各七錢半

芍藥 橘紅

旋覆花千金方

無此而有細辛紫蘇人參各半兩

川芎 桔梗

甘草各五錢

右每服五錢姜七

片水煎空心服

若有潮熱煩渴口瘡去橘紅細辛加前胡知母七錢半

若胃中虛熱大便秘小便赤濇加大黃

腹冷下利去地黃加炒桂心五錢

七錢半

去地黃加黃芩二錢半

胎動不安

妊娠胎動或飲食起居不節或衝任經虛或因過酒房室擊觸跌撲損動臟腑或脾氣虛弱誤服藥餌或感冒風寒當各推其因而施治之有因母病而胎動者但治其母而胎自安有胎不堅固動及母疾但安其胎而母自愈面赤舌青其胎已死面青舌赤吐沫其母必死唇口色青兩邊沫出子母俱死也

薛氏曰前証胎氣鬱滯者紫蘇飲脾氣虛弱者六君子湯加紫蘇枳殼鬱結傷脾者歸脾湯加柴梔橘怒傷肝脾者四七湯加芎歸怒動肝火者加味小柴胡湯若胎已死急用平胃散加朴硝腐化之

丹溪曰產前當清熱養血因火動胎逆上喘急者以條芩香附之類爲末調下墮胎乃氣虛血虛血熱所致懷妊嗜物乃一臟之虛黃芩安胎妙藥乃上中二焦之劑能降火下行加白朮爲安胎聖藥也俗不知以爲寒而不取用殊不知產前宜清

熱令血循經而不妄行故能養胎

又曰將臨月胎熱以三補丸加炒香附白芍餅爲丸服抑熱以三補丸以地黃膏爲丸孕至八九個月必用順氣須枳殼紫蘇梗

固胎方法

川芎

地黃

黃芩各五分

歸身

人參

白芍

陳皮各一錢

白朮一錢半

甘草三分

黃柏

黃連俱少許

桑寄生一錢

右每服五六錢加

糯米五十粒水煎服

血虛不安者加阿膠

腹痛者加砂仁能止痛安胎行

氣故也一方加黃連名固孕丸

仲景云妊娠宜常服當歸散

當歸

黃芩

芍藥

芎藭各一兩

白朮半斤

右爲末酒調服方寸匕日二服常服之即易產胎無苦疾產後百病悉主之

肘後方治胎動不安

取苧根如足大指者一尺水煎服一方有生姜五片○丹溪云苧

根大能補陰血而行滯血

立效散

治胎動不安如重物所墜冷如冰即佛手散也

縮砂散

治胎動不安墮在須臾痛不可忍神效砂仁連壳炒黑爲末

每服二錢

酒下

鈎藤湯

妊娠胎動腹痛面青冷汗氣欲絕者鈎藤鈎當歸

茯神去皮

人參各一錢

苦梗一錢半

桑寄生一錢

右水煎服煩熱者加石膏

黃芪湯

氣虛胎動腹痛下水

糯米一合

炙黃芪

川芎各一兩

水煎分三服

順氣飲子

產前服之安胎

紫蘇葉

木香煨人參

草荳蔻

茯苓各一兩

炙甘草一錢 大腹子二兩氣虛者去之

右每服三五錢加苧根三寸糯米三十

粒水煎服

安胎寄生湯 妊娠下血或胎不安或腰腹痛

桑寄生 白朮各五分 茯苓四分

甘草一錢 水煎服

安胎飲 體倦惡食或胎動腹痛或下血發熱腰痛

炙甘草

茯苓

川歸

桂心

地榆

各五分

熟地

川芎

白朮

黃芪

白芍

炒半夏

泡

阿膠炒地榆

各五分

加姜棗

水煎服

又方 好銀煮取水入葱白作羹食之妙

生生子曰按良方云妊娠婦人倘氣血虛弱無以滋養其胎終不能成也宜下之以免其禍若胃氣壯實衝任榮和如魚之處淵得其所也宜必盡方技以補養之庶無所悞設因病而胎不能安者不得不下之藥劑亦須謹慎

桂心散

妊娠因病而胎不能安者以此下之 桂心 瓜蔞

牛膝

麴麥各五分

歸尾一錢

右水煎服

又方 牛膝一兩

酒煎食前空心服下

又方 生雞子一枚鹽三錢攪勻服之立下

佛手散更妙 凡胎死者即下生者即安

胎漏下血附卒然下血下如糞汁

良方曰妊娠經水時下由衝任氣虛不能約制蓋心小腸二經相爲表裏上爲乳汁