

仲景全書

上海千頃堂書局印行

金匱要畧方論卷中

仲景全書

漢長沙太守張仲景著

晉太醫令王叔和撰次

宋祠部郎中林億校正

明虞山人趙開美校刊

五臟風寒積聚病脈證并治第十一

論二首

脈證十七條

方二首

肺中風者口燥而喘身運而重冒而腫脹。肺中寒吐濁涕。肺死藏浮之虛按之弱如蔥葉下無根者死。

肝中風者頭目暈兩脇痛行常偃令人嗜甘。肝中寒者兩臂不舉古本燥喜

太息胸中痛不得轉側食則吐而汗出也。

脈經千金云時盜汗飲食已吐其汁。

肝死藏浮之弱

按之如索不來或曲如蛇行者死。肝着其人常欲蹈其胸上先未若時但欲

飲熱旋復花湯主之。

臣億等校諸本旋復花湯方皆同。

心中風者翕翕發熱不能起心中飢食即嘔吐。心中寒者其人苦病心如噉

蒜狀劇者心痛徹背背痛徹心譬如蠱注其脈浮者自吐乃愈。心傷者其人

勞倦即頭面赤而下重心中痛而自煩發熱當臍跳其脈弦此為心藏傷所致

也。心死藏浮之實如麻豆按之益躁疾者死。邪哭使魂魄不安者血氣少

也。血氣少者屬於心。心氣虛者其人則畏合目欲眠夢遠行而精神離散魂魄

妄行陰氣衰者為癰陽氣衰者為狂

脾中風者翕翕發熱形如醉人腹中煩重皮目瞶瞶而短氣○脾亢藏浮之大
堅按之如覆盂潔潔狀如搖者死臣德等詳五藏各有中風中寒俱不載有以古文簡亂極多
可以去既達無文跌陽脈浮而濇浮則胃氣強濇則小便數浮濇相搏大便則堅

其脾為約麻子仁丸主之

麻子仁丸方

麻子仁二升

芍藥半斤

枳實一斤

大黃一斤

厚朴一尺

杏仁一升

右六味末之煉蜜和丸梧子大飲服十九日三以知為度

腎著之病其人身體重腰中冷如坐水中形如水狀反不渴小便自利飲食如
故病屬下焦身勞汗出衣表一作裏冷濕久久得之腰以下冷痛腰重如帶五千

錢甘姜苓朮湯主之

甘草乾姜茯苓白朮湯方

甘草二兩

白朮二兩

乾姜四兩

茯苓四兩

右四味以水五升煮取三升分溫三服腰中即溫

腎元藏浮之堅按之亂如轉丸蓋下如尺中者死

問曰三焦竭部上焦竭善噫何謂也○師曰上焦受中焦氣未和不能消穀故能噫耳下焦竭即遺溺失便其氣不和不能自禁制不須治久則愈○師曰熱在上焦者因熱為肺痿熱在中焦者則為堅熱在下焦者則尿血亦令淋秘不通大腸有寒者多驚澹有熱者便腸垢小腸有寒者其人下重便血有熱者必問曰病有積有聚有榮氣何謂也○師曰積者藏病也終能移聚者府病也發作有時展轉痛移為可治榮氣者脇下痛按之則愈復發為榮氣諸積大法脈來細而附骨者乃積也寸口積在胸中微出寸口積在喉中關上積在臍旁上關上積在心下微下關積在少腹尺中積在氣衝脈出左積在左脈出右積在右脈兩出積在中央各以其部處之

痰飲欬嗽病脈證并治第十二

論一首

脈證二十一條

方十八首

問曰夫飲有四何謂也○師曰有痰飲有懸飲有溢飲有支飲○問曰四飲何以為異○師曰其人素盛今瘦水走腸間漉漉有聲謂之痰飲飲後水流在脇下欬唾引痛謂之懸飲飲水流行歸於四肢當汗出而不汗出身體疼重謂之溢飲飲逆倚息短氣不得卧其形如腫謂之支飲○水在心心下堅築短氣惡

水不欲飲。水在肺吐涎沫欲飲水。水在脾少氣身重。水在肝脇下支滿嘔而痛。水在腎心下悸。夫心下有留飲其人背寒冷如手大。留飲者脇下痛引缺盆欬則輒已轉難。胸中有留飲其人短氣而渴四肢歷節痛脈沉者有留飲。膈上病痰滿喘欬吐發則寒熱背痛腰疼目泣自出其人振振身瞤劇必有伏飲。夫病人飲水多必暴喘滿凡食少飲多水停心下甚者則悸微者短氣脈雙弦者寒也皆大下後善虛脈偏弦者飲也。肺飲不弦但苦喘短氣。支飲亦喘而不能卧加短氣其脈牢遲。病痰飲者當以溫藥和之心下有痰飲胸脇支滿目眩苓桂朮甘湯主之。

苓桂朮甘湯方

茯苓四兩

桂枝三兩

白朮三兩

甘草二兩

右四味以水六升煮取三升分溫三服小便則利

夫短氣有微飲當從小便去之苓桂朮甘湯主之

上方見腎氣丸亦主之方見肺氣中

病者脈伏其人欲自利利反快雖利心下續堅滿此為留飲飲去故也甘遂半夏湯主之

甘遂半夏湯方

甘遂

三枚

半夏

十二枚以水一升煮取半升去滓

芍藥

五枚

甘草

炙如指大一枚本一作無

右四味以水二升煮取半升去滓以蜜半升和藥汁煎取八合頓服之

脈浮而細滑傷飲。脈弦數有寒飲冬夏難治。脈沉而弦者懸飲內痛。病懸飲者十棗湯主之

十棗湯方

元花

煮

甘遂

大戟

各等分

右三味搗節以水一升五合先煮肥大棗十枚取九合去滓內藥末強人服一錢七分羸人服半錢平日溫服之不下者明日更加半錢得快下後糜粥自養

病熱飲者當發其汗大青龍湯主之。小青龍湯亦主之

大青龍湯方

麻黃

六兩去節

桂枝

三兩去皮

甘草

二兩炙

杏仁

四十個去皮尖

生姜

三兩切

大棗

十二枚

石膏

如雞子大碎

右七味以水九升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取三升去滓溫服一

升取微似汗汗多者溫粉撲之

小青龍湯方

麻黃

三兩

芍藥

三兩

五味子

半斤

乾姜

三兩

甘草

三兩

細辛

三兩

桂枝

二兩

半夏

半升

右八味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取三升去滓溫服

隔間支飲其人喘滿心下痞堅面色鰲黑其脈沉緊得之數十日醫吐下之不

愈木防己湯主之虛者即愈實者三日復發復與不愈者宜朮防己湯去石膏

加茯苓芒硝湯主之

木防己湯方

木防己

三兩

石膏

十二枚

桂枝

三兩

人參

四兩

右四味以水六升煮取二升分溫再服

木防己加茯苓芒硝湯方

木防己

三兩

桂枝

二兩

人參

四兩

芒硝

三合

茯苓

四兩

右五味以水六升煮取二升去滓內芒硝再微煎分溫再服微利則愈
心下有支飲其人苦冒眩澤瀉湯主之

澤瀉湯方

澤瀉五兩 白朮二兩

右二味以水二升煮取一升分溫再服

支飲胸滿者厚朴大黃湯主之

厚朴大黃湯方

厚朴一尺 大黃六兩 枳實四枚

右三味以水五升煮取二升分溫再服

支飲不得息葶藶大棗瀉肺湯主之

方見肺
癰中

嘔家本渴渴者為欲解今反不渴心下有支飲故也小半夏湯主之

千金云小半
夏加茯苓湯

小半夏湯方

半夏一兩 生姜半斤

右二味以水七升煮取一升半分溫再服

腹滿口舌乾燥此腸間有水氣已椒瀝黃丸主之

已椒瀝黃丸方

防己

椒目

葶藶熬

大黃各兩

右四味末之蜜丸如梧子大先食飲服一九日三服稍增口中有津液渴者加芒硝半兩

卒嘔吐心下痞膈間有水眩悸者半夏加茯苓湯主之
小半夏加茯苓湯方

半夏一升

生姜半斤

茯苓法三兩一兩

右三味以水七升煮取一升五合分溫再服

假令瘦人臍下有悸吐涎沫而癰眩此水也五苓散主之
五苓散方

澤瀉一兩

猪苓去分

茯苓三分

白朮三分

桂枝去分

右五味為末白飲服方寸匕日三服多飲暖水汗出愈

附方

外臺茯苓飲治心胃中有停痰宿水自吐出水後心胸間虛氣滿不能食消痰氣令能食

茯苓三兩

人參三兩

白朮三兩

枳實二兩

橘皮二兩

生薑四兩

右六味水六升煮取一升八合分溫三服如人行八九里進之
欬家其脈弦為有水十棗湯主之

夫有支飲家欬煩胸中痛者不卒死至一百日一歲宜十棗湯

久欬數歲其脈弱者可治實大數者死其脈虛者必苦冒其人本有支飲在胸
中故也治屬飲家

欬逆倚息不得卧小青龍湯主之

防癰中

青龍湯下已多唾口燥寸脈沉尺脈微手足厥逆氣從小腹上衝胸咽手足痺
其面翕熱如醉狀因腹下流陰股小便難時復冒者與茯苓桂枝五味甘草湯
治其氣衝

桂苓五味甘草湯方

茯苓四兩

桂枝四兩

甘草三兩

五味子半升

右四味以水八升煮取三升去滓分溫三服

衝氣即低而反更欬胸滿者用桂苓五味甘草湯去桂加乾姜細辛以治其
欬
苓甘五味姜辛湯

茯苓四兩 甘草三兩 乾姜三兩

細辛三兩 五味半升

右五味以水八升煮取三升去滓溫服半升日三服

欬滿即止而更復渴衝氣復發者以細辛乾姜為熱藥也服之當遂渴而渴反止者為支飲也支飲者法當冒冒者必嘔嘔者復內半夏以去其水

茯苓五味甘草去桂加姜辛夏湯方

茯苓四兩 甘草二兩 細辛二兩

乾姜二兩 五味子 半夏各半

右六味以水八升煮取三升去滓溫服半升日三服

水去嘔止其人形腫者加杏仁主之其證應內麻黃以其人遂痺故不內之若遂而內之者必厥所以然者以其人血虛麻黃發其陽故也

茯苓甘草五味姜辛湯方

茯苓四兩 甘草三兩 五味半升

乾姜三兩 細辛三兩 半夏半升

杏仁詳升

右七味以水一斗煮取三升去滓溫服半升日三服

若面熱如醉此為胃熱上衝重其面加大黃以利之

茯苓味甘味辛夏仁黃湯方

茯苓四兩 甘草三兩 五味半升

乾姜三兩 細辛三兩 半夏半升

杏仁半升 大黃三兩

右八味以水一斗煮取三升去滓溫服半升日三服

先渴後嘔為水停心下此屬飲家小半夏茯苓湯主之方見

消渴小便利淋病脈證并治第十三

脈證九條 方六首

厥陰之為病消渴氣上衝心中疼熱飢而不欲食食即吐下之不肯止○寸口脈浮而遲浮即為虛遲即為勞虛則衛氣不足勞則榮氣竭跌陽脈浮而數浮即為氣數即為消穀而大堅一作聚氣盛則溲數溲數即堅堅數相搏即為消渴

男子消渴小便反多以飲一斗小便一斗腎氣丸主之方見肺氣中

脈浮小便不利微熱消渴者宜利小便發汗五苓散主之

渴欲飲水水入則吐者名曰水逆五苓散主之方見

渴欲飲水不止者文蛤散主之

文蛤散方

文蛤五兩

右一味杵為散以沸湯五合和服方寸匕

淋之為病小便如粟狀小腹弦急痛引臍中。跌陽脈數胃中有熱即消穀引食大便必堅小便即數。淋家不可發汗發汗則必便血

小便不利者有水氣其人若渴用括婁瞿麥丸主之

括婁瞿麥丸方

括婁根二兩

茯苓三兩

薯蕷三兩

附子

一枚

瞿麥一兩

右五味末之煉蜜丸梧子大飲服三丸日三服不知增至七八丸以小便利腹中溫為知

小便不利蒲灰散主之滑石白魚散茯苓戎鹽湯並主之

蒲灰散方

蒲灰七分

滑石三分

右二味杵為散飲服方寸匕日三服

滑石白魚散方

滑石二分

亂髮燒二分

白魚二分

右三味杵為散飲服寸方七日三服

茯苓戎鹽湯方

茯苓半斤

白朮二兩

戎鹽彈丸大

右三味

渴欲飲水口乾舌燥者白虎加人參湯主之中方

脈浮發熱渴欲飲水小便不利者猪苓湯主之

猪苓湯方

猪苓去皮

茯苓

阿膠

滑石

澤瀉各

右五味以水四升先煮四味取二升去滓內膠烱消溫服七合日三服

水氣病脈證并治第十四

論七首

脈證五條

方八首

師曰病有風水有皮水有正水有石水有黃汗風水其脈自浮外證骨節疼痛惡風皮水其脈亦浮外證肘腫按之沒指不惡風其腹如鼓不渴當發其汗正

水其脈沉遲外證自喘石水其脈自沉腹滿不喘黃汗其脈沉遲身發熱胸滿四肢頭面腫久不愈必致癰膿。脈浮而洪浮則為風洪則為氣風氣相搏風強則為隱疹身體為癢癢為泄風久為痼氣強則為水難以俛仰風氣相擊身體洪腫汗出乃愈惡風則虛此為風水不惡風者小便通利上焦有寒其口多涎此為黃汗。寸口脈沉滑者中有水氣面目腫大有熱名曰風水其人之目裹上微擁如蚕新卧起狀其頸脈動時時欬按其手足上陷而不起者風水。太陽病脈浮而緊法當骨節疼痛反不疼身體反重而酸其人不渴汗出即愈此為風水惡寒者此為極虛發汗得之渴而不惡寒者此為皮水身腫而冷狀如周痺胸中窒不能食反聚痛著躁不得眠此為黃汗痛在骨節欬而喘不渴者此為脾脹其狀如腫發汗即愈然諸病此者渴而下利小便數者皆不可發汗。裏水者一身面目黃腫其脈沉小便不利故令病水假如小便自利此亡津液故令渴也越婢加朮湯主之。見○跌陽脈當伏今反緊本自有寒疝瘕腹中痛醫反下之下之即胸滿短氣。跌陽脈當伏今反數本自有熱消穀小便數今反不利此欲作水。寸口脈浮而遲浮脈則熱遲脈則潛熱潛相搏名曰沉跌陽脈浮而數浮脈即熱數脈即止熱止相搏名曰伏沉伏相搏名曰水沉則絡脈虛伏則小便難虛難相搏水走皮膚即為水矣。寸口脈弦而緊

強則衛氣不行即惡寒水不沾流走於腸間。少陰脈緊而沉緊則為痛沉則為水小便即難脈得諸沉當責有水身體腫重水病脈出者死。夫木病人目下有卧蚕面目鮮澤脈伏其人消渴病水腹大小便不利其脈沉絕者有水可下之。

問曰病下利後渴飲水小便不利腹滿因腫者何也答曰此法當病水若小便自利及汗出者自當愈。心水者其身重而少氣不得卧煩而躁其人陰腫。肝水者其腹大不能自轉側脇下腹痛時時津液微生小便續通。肺水者其身腫小便難時時鴨溇。脾水者其腹大四肢苦重津液不生但苦少氣小便難。腎水者其腹大臍腫腰痛不得溺陰下濕如牛鼻上汗其足逆冷面反瘦。師曰諸有水者腰以下腫當利小便腰以上腫當發汗乃愈。師曰寸口脈沉而遲沉則為水遲則為寒寒水相搏跌陽脈伏水穀不化脾氣衰則驚漉胃氣衰則身腫少陽脈卑少陰脈細男子則小便不利婦人則經水不通經為血血不利則為水名曰血分。

問曰病者苦水面目身體四肢皆腫小便不利脈之不言水反言胸中痛氣上衝咽狀如炙肉當微效喘審如師言其脈何類。師曰寸口脈沉而緊沉為水緊為寒沉緊相搏結在關元始時當微年盛不覺陽衰之後榮衛相干陽損陰

盛結寒微動腎氣上衝喉咽塞噎脇下急痛醫以為留飲而大下之氣繫不去其病不除後重吐之胃家虛煩咽燥欲飲水小便不利水穀不化面目手足浮腫又與葶蘆丸下水當時如小差食飲過度腫復如前胸脇苦痛象若奔豚其水揚溢則浮咳喘逆當先攻擊衝氣令止乃治效欬止其喘自差先治新病病當在後

風水脈浮身重汗出惡風者防己黃耆湯主之腹痛加芍藥

防己一兩

黃耆一分

白朮三分

甘草半兩

右剉每服五錢七生姜四片棗一枚水盪半煎取八分去滓溫服良久再服風水惡風一身悉腫脈浮不渴續無汗出無大熱越婢湯主之

越婢湯方

麻黃六兩

石膏半斤

生姜三兩

大棗桴五

甘草二兩

石五味以水六升先煮麻黃去上沫內諸藥煮取三升分溫三服惡風者加附子一枚炮風水加朮四兩

銚銚