

廣州中醫院

圖書館

圖

書

評琴書屋葉案括要目錄

卷三

汗

脫

脾胃

木乘土

腫脹

卷四

積聚

痞

噎膈反胃

噫噎

嘔吐

吐衄

不食

腸痺

便閉

肺痺

胸痺

哮

喘

呃

疸

風

寒

風溫

溫熱

暑

評琴書屋葉案牘要卷四

番禺潘名熊蘭坪纂

男

龍章雲臺
鸞章翅霓
校刊

積聚

脇突有形。

右脇

按之不痛。此屬痞瘕。蛤粉合用。萆橘梔薑。

芥鬱夏共。

痰凝脈絡

真蛤粉

製半夏

黑梔皮

化橘紅

白芥子

瓜萆皮

老薑皮

川鬱金

着而不移。陰邪聚絡。桂枝同歸鬚胡索。

血絡凝痺

當歸鬚

延胡索

老韭白

官肉桂

陳橘核

伏梁在絡脈數而堅分消氣血桃仁炒研鬱菟實樸通

草荅煎

伏梁

桃仁

三錢炒研

鬱金

一錢

枳實

七分

通草

五分

菟蔚子

一錢

茯苓

三錢

厚樸

一錢

附倣先生法

痞

治驗案一段

胸脇痺痞經脈病耳無關臟腑釣蒺橘桑菟鬱合以氣閉化熱

鈎藤

白蒺藜

川鬱金

桑葉

白蔻仁

化橘紅

痞悶宜通陽氣宜固枳橘連薑夏苓參護

濕熱傷胃

正川連

炒半夏

人參

枳實

生薑汁

雲茯苓

橘紅

案云濕熱非苦辛寒不解體豐陽氣不足論體攻病
爲是胸中痞悶不食議治在胃

舌白脘痛嘔惡腸鳴良薑夏橘藿藥香并

炒半夏

錢三

高良薑

錢一

製香附

錢一

化橘紅

錢一

台烏藥

錢一

藿香葉

錢一

案云此濕熱阻氣分胃痺成痛是不通之象

中脘不爽肢冷脈沉夏苓草果薑附人參

中陽不運

人參

分七

熟川附子

分七

淡乾薑

錢一

茯苓

錢三

炒半夏

半錢

草果仁

分八

脘痞不食氣短目垂參苓半夏伽楠同醫

人參

茯苓

炒半夏

伽楠香

磨汁冲服

案云太陰脾陽不運氣滯痰阻擬用大半夏湯

舌白脘悶中陽不宣

中焦陽氣不運

夏苓陳樸草果藿全

製半夏

炒陳皮

雲茯苓

草果仁

川厚樸

藿香梗

胃寒中痞。涎吐不止。薑橘夏苓。吳萸。楝子。

雲茯苓

橘紅

泡淡吳萸

製半夏

乾薑

川楝子肉

口乾痰上。脘痞不飢。肺氣不降。痺阻因之。枳杏。梔鼓。茹。

鬱蘘皮。

枇杷葉

山梔子

瓜蘘皮

竹茹

薑汁炒

北杏仁

淡豆豉

川鬱金

食進頗逸。胸覺不堪。未得清曠辛潤理氣。勿燥傷陰。杷杏梔
豉。蔓橘鬱金。

枇杷葉 黑梔子 橘紅 瓜蔓皮

大杏仁 香豆豉 鬱金 晨服五劑後接

服桑麻丸。

勞傷胃痛。必是陽傷。芩連枳夏。乾生二薑。寒熱客邪互結

川連薑汁炒 枳實 淡乾薑

黃芩水泡 半夏 生薑汁

案云。心下堅實。按之痛。舌白煩渴。二便瀉少。喘急不

得進食。從痞結論治。

上熱下寒。脘中故結。芩連枳寒。薑附參熱。溫清既殊。煎法亦別。

黃芩

川連

枳實

右三味

入滾水中煮五十沸即濾

人參

附子

乾薑

上三味

煎濃汁一杯和入前藥服

案云。古人用麻沸湯煮涼藥以解上。濃煎溫補以治下。使陽氣不脫。鬱熱自罷。今倣之。

鳳浦馮丹林翁之長子。兩生新娶兩月。忽患胸脘結痛。不能飲食。下咽即吐。兩頰赤咽乾。腹以上喜涼。臍

以下畏冷醫謂其新娶夾色進以苦寒悶吐不納更醫謂脈無力轉用參芪建中亦不納邀余診兩寸畧浮數兩尺沉弦而遲知其胸中有熱而丹田有寒上下格拒而結痛遵先生此方並煎法六味各用一錢加瓜蒌仁蒌皮各一錢半與芩連枳實同煎沖入生薑汁二匙服服之納下稍安晚下依法再服一帖可進飲食而漸愈一月後苦大便結旬日不更衣自服清甯丸二錢不便再服三錢亦不便增中膈冷痛黃大之寒氣寒氣腕悶寒氣復延余診寸關不應指尺沉候應逼腎經

指而蹇滯丹林曰脈寸關不見若何余曰無妨此有形之垢物阻壓氣機而脈不行亦沉寒之藥性凝滯經絡而脈不出耳按尺脈沉遲蹇滯可據溫潤下之去其壅塞而脈自出矣仍將先生方去芩連加入當歸八錢用朴硝三錢化水拌煮乾薑附枳實各用一錢人參改用麗參三錢一服便通而愈

噎膈反胃

不食不便氣衝湧涎症成關格進退黃連

用進退黃連湯夏苓

芍附。二薑參連。

川連

乾薑

附子

茯苓

人參

薑汁

半夏

白芍

此症多因血枯氣衰而成。香燥消瀉藥久在禁例。案中亦間用辛熱。先生必諦審其爲陽微濁踞者方用之耳。

清陽日結。便食俱難。

陰液漸涸

桂連薑汁。杏夏苓餐。

桂枝

半夏

北杏

川連

薑汁

茯苓

陰枯陽結。積勞使然。大半夏陽。加薑汁連。

半夏

人參

白蜜

薑汁

黃連

案云。此病乃積勞傷陽。古稱噎膈反胃。都因陰枯而陽結也。交早咽燥。晝日溺少。五液告涸。難任剛燥陽藥。

胃汁肝陰。枯槁不振。消渴不已。廢食不便。噎膈已成。柔潤當進。參

芍梅柔。

案云。參合烏梅。白芍柔肝。

膠地冬潤。

人參

大生地

烏梅肉

阿膠

大麥冬

生白芍

案云肝陰胃汁已竭。難任燥藥。胃屬陽土。宜涼宜潤。肝爲剛臟。宜柔則和。酸甘兩濟其陰。

陽明汁乾。隔食不入。南杏二冬。川貝芍合。胡麻柿霜。玉竹梨汁。

梨汁

玉竹

天冬

川貝

白芍

柿霜

南杏

麥冬

三角胡麻

三陽燔燥。胃汁受傷。

操持太過身中三陽燔燥燥津

地冬蘇柏麻杏松

漿。

煩勞陽亢肺胃津枯

南甜杏汁

麥冬汁

柏子汁

黑芝蔴汁

生地汁

蘇子汁

松子仁漿

水浸布絞汁濾清燉自然膏

余法先生此方改用五藥煎濃汁去渣加南杏黑蔴細末和白蜜收膏

案云老年氣血漸衰必得大便數日通爽然後脛中納食無阻此胃汁漸枯已少胃氣下行之旨噎症萌矣

食下欲噎咳逆痰多杷杏梔豉萸鬱同料肺胃氣不降

鮮杷葉

北杏仁

山梔子

瓜蒌皮

川鬱金

淡豆豉

凡病在上焦此六味藥先生案中最多用

脈濡反胃胃陽已傷吳萸理中梗米炒香

淡吳萸

人參

炙甘草

川乾薑

白朮

炒梗米

案云脈濡緩無力中年胸脇時痛繼以早食晚吐此屬反胃乃胃中無陽濁陰腐壅

朝食暮吐大便不通痰瘀爲患

初因勞傷胃痛痰瘀有形之阻

病在下

中黃桃夏枳韭白汁冲

陽衰脫痺血瘀

製大黃

桃仁

韭白汁

製半夏

枳實

脈緩關弦

右關

知飢惡食食嘔肢浮溏便少溺參附二薑

粳荅煎喫

附子

淡乾薑

生薑汁

人參

結雲苓

炒粳米

案云胃陽衰微開合之機已廢薑汁與乾薑附子並用三焦之陽皆可通老年噎膈反胃乃大症也肺病原無補法祇以老年積勞傷陽之質所服之劑非苦